

血虛有痰四肢偏枯攣拳者虎脰骨酒佳

石斛

去根

石南葉

防風

去蘆

虎脰骨

炙

川芎

當歸

去蘆

茵芋葉

杜仲

去粗皮

炒斷絲

川牛膝

去蘆

川續斷

金毛狗脊

燎去毛

川巴戟

去心

各一兩

右剉如豆大絹袋盛藥用無灰酒一斗漬之

十日後任飲

口眼喎勢緩者稀煮丸佳

換金丹 治風勢客于上焦口眼喎斜

荆芥穗

白僵蚕

甘草

防風

各兩

天麻

川烏頭

生用白附子用蝎梢炒去毒

羌活

去蘆

細辛

川芎

藿香

各半兩

薄荷

二兩

右爲細末蜜丸彈子大每服一丸細嚼茶酒
下如左咽再以此塗于右右咽塗左

三蛇散治諸風口眼喎邪

蜈蚣

三條用蜜炙一條酒浸一條紙裹煨熟

白芷

半兩

南星

三個每個作四個似蜈蚣法製

右爲末入麝少許熟酒調一錢食後服

牽正散

白附子

白殭蚕

全蝎

去毒并生用

右爲末每服二錢熟酒調下不拘時服

天僊膏

天南星

大一錢

白芨

二錢

大草烏頭

一個

殭蚕

七個

右爲末用生鱠魚調成膏塗喉處正則洗去

天南星膏

南星一味爲末生薑自然汁調右噙傳左

左噙傳右

擣爛傳亦可或生鱠血加麝亦効

口咽灸法以筆管五寸長挿入耳內外以麪塞
四圍勿使透氣一頭以艾灸二壯右灸左左
灸右耳痛亦効

又法耳垂下用麥粒大艾炷灸三壯左灸右右
灸左

有人麻木體軟痰湧口斜語澁蹇身痒白屑等
症其人臂麻體軟脾無用也痰涎自出脾不能
攝也口斜語澁脾傷也頭目暈重脾不升也痒
起白屑脾不管也補中益氣湯加神麯半夏茯

神三十劑乃愈

預防中風

張三錫曰、病之生也、其機甚微、其變甚速、達士知機思患而預防之、庶不至于膏肓、卽中風一證必有先兆、中年人但覺大拇指及次指時作麻木、或不仁、或手足少力、或肌肉微掣、三年內必有暴病、急屏除一切膏梁厚味、鵝肉麪酒肥甘生痰動火之物、卽以搜風順氣丸或滾痰丸、防風通聖散時間服之、及審氣血孰虛、因時培

養更遠色戒性清虛靜攝乃得有備無患之妙
肥人更宜加意慎口絕慾人參湯加竹瀝煎膏
日不輟口方是。○大抵中年以後多有此水弱
火盛熱極生風明矣治火爲先古方愈風湯四
白丹藥多辛散大非所宜故皆不錄

薛氏醫按載一人形體魁偉中滿吐痰勞則頭
眩所服皆清痰理氣立癒曰中滿者脾氣虧損
也痰盛者脾氣不運也頭暈者脾氣不能升也
指麻者脾氣不能周也遂以補中益氣湯加茯

苓半夏以補脾土用八味丸以補土母而後惑于乾坤生意不加補養祇服搜風丸致大便不禁而歿大抵預防之理當養氣血節飲食戒七情遠房幃可也若徒事風藥適足以招風取中也

搜風順氣丸治腸胃積熱以致膈間痞悶大便結燥小便赤澁腸風痔漏腰膝酸疼肢節頑麻手足癱瘓行步艱難語言蹇澁諸風諸氣膏梁之家中年宜常服之此藥宣通氣血清熱潤燥

通利大小便諸病自愈

車前子

兩半

白枳榔

大麻子

微

炒去
另研

牛膝

酒浸二宿

乾山藥

各二兩

枳殼

去穰炒

防風

去蘆

獨活

各一兩

郁李仁

泡皮研去

大黃

五兩生半熟

右爲末，煉蜜丸，桐子大。每服五十丸，茶酒任下。早辰臨臥，各一服。久之覺大便微瀉。以羊肚肺，羨補之。老年大腸無血，大便結燥。最宜。

防風通聖散。治熱極生風，皮膚風疹，燥痒，頭目。

沖注彙四卷
不淸痰涎阻滯、胸膈宜加減用之。

防風 大黃 硼硝 川芎 當歸

黃芩 滑石 石膏 薄荷 山梔

荆芥 桔梗 麻黃 白朮 甘草

連翹 菖蒲

加生薑煎服。體麻者加羌活、天麻、殼蠚、痰多加星半。如大便不實減硝黃。表虛自汗減麻。

黃加參芪。

古方牛黃清心丸中有犀角、乾薑皆辛散剽悍。

藥牛黃入肝主筋腦子入腎主骨麝香入脾主肉果真中風在骨者能引風出否則引邪入骨古人有如油入麪之說今閩廣嶺南視爲僥品以其地濕而多瘴氣也用之罔不獲効若于他處多不相宜按此方藥性一于攻邪挾虛類中妄用反增亦有暴厥藉其開竅亦是痰火盛而氣實乃可癲狂神昏言語蹇塞亦可酌用今人不深察藥性一槩謬謂服後則他藥不効又或不審寒熱虛實凡有不安卽亂投之多致不救

良可憫也。一廣中士夫有妾隨任京都，產後發
熱，自服四丸，大汗大喘而卒。此可爲輕信者之
戒。

牛黃清心丸治有餘痰火

白芍

麥冬去心

黃岑

當歸

防風

白术

各二兩半

柴胡

桔梗

芎藭

白茯

杏仁

錢五分

神曲

蒲黃

人參

羚羊角

麝香

一兩

龍腦

各兩

大豆黃卷

炒

兩半

肉桂

炒

阿膠

炒各一錢半

白欵

乾薑

各七錢半

七錢半

白欵

乾薑

各七錢半

半黃

研一兩
二錢

犀角屑

二兩

雄黃

飛八錢

甘草

炒五錢

乾山藥

七錢

金箔

千二百片內
四百片爲衣

大棗

蒸爛去皮核研

右除杏仁金箔二角屑牛黃雄黃腦麝外共
末和勻煉蜜與棗膏爲丸每兩作十九金箔
爲衣每服一丸食後溫水下

小續命湯 真中風有表証者可用

麻黃

去節

人參

去蘆

黃芩

去腐

芍藥

甘草

炙

川芎

杏仁

去尖皮炒

防風

肉桂

昉已

附子

炮去皮臍

沙海處
卷四
類中
劑隨輕重增損

麻黃續命湯 治中風無汗惡寒

麻黃 防風 杏仁

有汗惡風用桂枝續命湯

桂枝 芍藥 杏仁

大秦艽湯原爲中血脉之證而設方用四物加二活血防細辛、芩朮白芍石膏按秦艽乃陽明除濕聖藥濕痰盛而筋痿于前四物四君二陳方中加而用之大獲奇効第不可執定一方也

活絡丹治有餘痰火經絡鬱滯拘掣不能屈伸
大是捷藥第藥性辛散功在開通鬱結耳不可
妄用

三化湯 中風內有便溺阻隔是風熱內實也
宜此

大黃

瀉熱

厚朴

枳實

化痰消滯除痞

羌活

祛風

右等分水煎服

稀荳草 一名火炊草葉似蒼耳對節而生春生
苗葉秋初開花秋末結實法于五月五六月六

七月七八月八九月九採其葉去根莖花實洗淨曝乾入甌中用酒蜜蒸之九遍焙乾搗篩細末煉蜜丸如桐子大空心用酒或米湯下四五十九百服後耳目聰明千服鬚鬢變黑筋骨強健大益氣血四肢不遂大有功

風熱膏梁厚味飲酒無度積熱生風或遍身癢疹頭痒白屑生痰氣促氣實人宜防風通聖散宣之或搜風順氣丸久久涼血養血蒼耳丸苦參丸俱佳蒼耳丸○五月五日採蒼耳葉洗淨

晒乾爲末，煉蜜丸，桐子大。每服四五十九日三
服。若身體有風處，逐出如麻豆粒，乃風毒出也。
以針刺出黃水愈。

