

醫宗金鑑外科目錄

第一冊

卷一 外科心法要訣

人身經絡圖歌起至經絡板

法歌止

卷二 外科心法要訣

腫瘍主治類方

腫瘍敷貼類方

潰瘍主治類方

洗滌類方

膏藥類方

麻藥類方

去腐類方

生肌類方

校正醫宗金鑑

外科

百會疽圖



百會穴在頂中央自面側觀之正對耳尖

百會疽在顛頂結經屬督脈百會穴初如粟米

漸如錢甚似葡萄堅似鐵高腫熱實清毒火平塌陽虛溫補

怯腫連耳項動痰殺七日不潰命必絕此百會疽又名王

頂發生在巔頂正中屬督脈經百會穴由膏梁太過火毒凝

結而成初起形如粟米漸腫根大如錢甚則形似葡萄堅硬

如鐵高共紅腫焮熱疼痛瘡根收束憎寒壯熱大渴隨飲隨

乾口苦唇焦便秘煩燥脈見洪數者此屬氣實宜服黃連消

散惡寒便瀉見細數者此氣陽虛宜服十全大補湯以溫

易正學之宜服挂付也黃九引大歸原更用生付子并置兩

黃靈為太一膏蓋此膏靈丹易生肌之藥治之若重墮耳頂

十月朔至十月三十日全用之無誤之方用此方

五  
五  
三  
五  
五  
五  
四

黃芩分 黃蘗分 人參分 薯蕷分 防風分

黃耆錢 澤瀉分 齒麝尾如 水煎食遠溫服

桔 芩 藥 人 參 藥 二 防 知 母 羌 活 獨 活 等 連 翹 黃 連 生 地 黃 黃

黃靈藥 太乙膏 桂附地黄丸 附子餅

---

---

琥珀膏

俱見腫瘍門

俱見清  
瘍門

見前  
灸法

透腦侵腦疽圖

透腦疽生在百會穴前額會穴前



侵腦疽生在透腦疽前側下五處穴

透腦疽 透腦疽生百會前形如雞子痛而堅軟漫膿稀  
虛塌陷紅硬膿稠實腫共註此證生於百會穴之前額門之  
際亦由督脈經火毒而成初如粟米漸如雞子堅硬疼痛瘡  
頂塌陷根脚漫腫色暗者屬虛若色紅腫硬頂共膿稠者屬  
實速潰者順遲潰透腦髓者逆其腫潰內外治法俱按百會  
疽

侵腦疽

侵腦疽生透腦旁濕火攻發屬太陽穴名五處知其位紅順紫逆要審詳註此疽生於透腦疽側下由太陽

膀胱經濕火而成穴名五處紅腫高起焮熱疼痛膿色如蒼蠅者屬氣血俱實順而易治若紫陷無膿根脚散大者屬

氣血兩虛逆而難治初起宜服荆防敗毒散汗之次服內疏黃連湯下之將潰服託裏透膿湯已潰服託裏排膿湯外

貼琥珀膏圍敷冲和膏其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

託裏透膿湯

人參

白朮

穿山甲

白芷

升麻

甘草

節

當歸

皂角刺

生黃耆

錢三

青皮

水三

鍾煎

一鍾病在上部先飲煮酒

一鍾後熱服此藥病在下部先服藥後飲酒瘡在中部藥內

先酒半鍾熱服

方託裏透膿治癰疽已成未潰服之宜參朮甲芷升麻草當歸黃耆刺青皮

荆防敗毒散

見項部

內疎黃連湯

冲和膏

見項部

佛頂疽

佛頂疽屬督上星陰陽不調毒熱成不論虛實皆險證潰爛

黑陷必死

此證一名頂門疽生於頭頂顙門之前屬督

脈經上星穴由臟腑陰陽不調熱毒上壅而成色紫堅硬腫

痛脈洪大而數者為實脈微細而數者為虛皆屬險證若爛

潰黑陷六脈散大神昏譫語二便閉結者為逆首尾內外治

法俱按百會疽

佛頂疽

佛頂疽屬督上星陰陽不調毒熱成不論虛實皆險證潰爛

黑陷必死

此證一名頂門疽生於頭頂顙門之前屬督

脈經上星穴由臟腑陰陽不調熱毒上壅而成色紫堅硬腫

痛脈洪大而數者為實脈微細而數者為虛皆屬險證若爛

潰黑陷六脈散大神昏譫語二便閉結者為逆首尾內外治

法俱按百會疽

佛頂疽圖

佛頂疽生在透腦疽之前上星穴



佛頂疽屬督上星陰陽不調毒熱成不論虛實皆險證潰爛  
黑陷必死 此證一名頂門疽生於頭頂顙門之前屬督  
脈經上星穴由臟腑陰陽不調熱毒上壅而成色紫堅硬腫  
痛脈洪大而數者為實脈微細而數者為虛皆屬險證若爛  
潰黑陷六脈散大神昏譫語二便閉結者為逆首尾內外治  
法俱按百會疽



額疽



傍額疽

傍額疽

荆防敗毒散

見項部

仙方活命飲

見腫瘍門

託裏透膿湯

見前侵

透膿散

沖和膏

俱見腫瘍門

託裏排膿湯

見項部

琥珀膏

見髮際

勇疽



勇疽生在眼角後五分童子膠穴又名太陽穴

仙方活命飲

內疎黃連湯

二味拔毒散

俱見腫瘍門

額疽 額疽生額火毒成左右膀胱正督經頂陷焦紫無膿

重高聳根收紅腫輕註此證生前額正中者屬腎脉經或生

左右額角者屬膀胱經總由火毒而成初起瘡頂塌陷乾焦

色紫不生大膿者其勢重而屬險也若紅腫高聳瘡根收束

者其勢輕而屬順也初服荆防敗毒散汗之次服仙方活命

飲消之將潰氣虛者宜服託裏透膿湯氣實者宜服透膿散

外敷沖和膏已潰宜服託裏排膿湯外貼琥珀膏其餘內外

治法俱按癰疽潰瘍門

見前侵

透膿散

沖和膏

俱見腫瘍門

託裏排膿湯

見項部

勇疽 勇疽皆後太陽穴膽經怒火伏獸形七日不潰毒攻

眼黃膿為吉黑血凶註此證一名勇疽又名腦發疽屬足少

陽膽經怒火而成生於目小眥之後五分生在太陽穴者無

論左右皆可以生初起如粟漸腫疼痛形如伏獸面目浮腫

七日信膿不潰火毒攻睛腐爛損目若十一日鍼出黃膿毒

從膿解為順易治若出紫黑血者係氣虛不能化毒為逆難

治初服仙方活命飲清解之毒甚宜服內疎黃連湯外敷二

味拔毒散其將潰已潰內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門潰

後避風忌水

鬚疽 鬚疽三焦膽二經證由慾怒火凝成此經氣多而血

鬢疽圖



鬢疽生在左右鬢角

少潰腐惟宜少見膿註此證發於鬢角屬手少陽三焦足少陽膽二經由於相火妄動外受風熱更因性情急怒忿念火生凝結而成此二經俱屬氣多血少最難潰腐更兼鬢角肌肉澆薄不宜針灸候其自潰潰後不宜多見膿膿多者過耗血液難斂初起宜服柴胡清肝湯解之膿成者宜託裏消毒散托之外敷二味拔毒散已潰內外治法俱按癰疽潰瘍門

柴胡清肝湯

柴胡 生地 各一錢 當歸 二錢 赤芍 五錢 川芎 一錢 連翹 二錢 牛蒡子 一錢 黃芩 一錢 生

梔子 研

天花粉

甘草節

防風 各一錢

水二鍾煎八分食遠服

方歌

柴胡清肝治怒證宣血疎通解毒良四物

生用紫翹黃芩梔子粉草節防

託裏消毒散

二味拔毒散 俱見腫瘍門

天疽銳毒圖



天疽生在耳後一寸三分高骨後

銳毒生在耳後一寸三分高骨後

天疽 銳毒 天疽居左銳毒右經屬膽膽生耳後謀慮太過鬱火成此處肉薄當急救註此二證左為天疽右為銳毒俱生耳後一寸三分高骨之後天者不盡天年謂之天銳者如鋒刃之銳利言毒甚也得此二證愈者甚少初起俱如黍粒漸腫如瓜堅硬平塌紫暗不澤較諸瘡疼痛倍增各雖各異而左右耳後俱屬足少陽膽經由謀慮不決鬱火凝結而成此處皮肉澆薄氣多血少終屬險證急當治之遲則熱氣下入淵液前傷任脈內熏肝肺惡證悉添必致不救若紅腫

連潰者順堅硬黑陷者逆如果投方應證亦只十全四五也初宜服柴胡清肝湯消解之膿將成宜託裏消毒散虛者十全大補湯託補之外俱敷烏龍膏其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

柴胡清肝湯

見前  
託裏消毒散

烏龍膏

見前  
傷門

十全大補湯

耳後疽圖



耳後疽生耳上稍之後角孫穴開口有空陷下之處左右相同

耳竅出者名為內潰屬虛多服十全大補湯大抵少年得此證者其愈最緩老年得此證者易於成漏

十全大補湯

見潰瘍門

耳發圖



耳發生耳指間連耳輪通腫甚則膿串耳竅左右相同

耳發

耳發三焦風熱成初椒漸若蜂房形赤腫疼痛生輪後黃膿屬吉紫血山 註此證生於耳後屬三焦經風熱相搏而成初如椒粒漸腫若蜂房將腐亦多眼孔焮赤疼痛腫連耳輪蓋發者乃癰証之毒甚者也不可聽其自潰恐潰邊膿通耳竅當在十一日後剪破瘡頂出黃白膿者屬吉為順出紫鮮血者屬凶為逆初起俱宜服仙方活命飲消之外敷二味拔毒

散其餘內外治法俱按癰疽潰瘍門

仙方活命飲

見腫

二味拔毒散

見腫

耳根毒

耳根毒初發核形腫如伏鼠焮赤疼三焦風火膽怒氣暴腫

耳根毒圖



耳根毒生在耳垂後偏中縫上左右相同

仙方活命飲

見腫瘍門

荊防敗毒散

見腫瘍門

透膿散

見腫瘍門

託裏透膿湯

見前侵

紅靈藥

生肌玉紅膏

太乙膏

俱見腫瘍門

香貝養榮湯

見項部石疽

玉枕疽圖



玉枕疽生腦後在玉枕骨尖上腦戶穴在百會穴之後四寸半

神授衛生湯

託裏消毒散

中和膏

俱見腫瘍門

腦後發圖



腦後發在玉枕骨之下

潰速非癰疽註此證生於耳後初起形如痰核漸增腫勢狀如伏鼠嫩赤疼痛由三焦風火膽經怒氣上冲凝結而成但此證暴腫潰速根淺易愈非若癰疽之勢大毒甚也初起寒熱往來宜服荊防敗毒散汗之發熱痛甚者仙方活命飲消之膿成者服透膿散虛者服託裏透膿湯清後外撒紅靈藥貼太乙膏膿盡換搽生肌玉紅膏生肌斂口若遇虛者膿水清稀或瘡口斂遲即服香貝養榮湯補之自斂

玉枕疽 玉枕疽屬督脈經證由積熱風邪乘枕骨微上腦戶穴高腫為順紫陷山註此證由督脈經積熱外受風邪凝結而成生在玉枕骨尖微上腦戶穴初起如粟麻癢相兼寒熱往來口渴便秘漸增堅硬大者如茄小如鵝卵紅活高腫潰出稠膿者屬吉而順也若紫暗塌陷潰出血水者屬凶險也初則俱服神授衛生湯消解之虛者宜服託裏消毒散外敷中和膏其餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門

腦後發 腦後發生在督經熱結風府粟腫疼紅活易潰稠膿順紫暗難潰血水山註此證屬督脈經枕骨之下風府穴由積熱外受風邪凝結而成初如粟米掀腫作疼痛引頭頂肩項氣粗鼻塞漸大如盤如盤紅活速潰出稠膿者順紫暗

難潰時津血水者逆初起內外治法按玉枕疽其餘內外治法俱按癰疽腫潰瘍門

# 腦鑠圖



腦鑠生在腦後入髮際一寸風府穴二大筋之中宛宛中央勢如橫木

方活命飲以舒解其毒七日之後不發長不生大膿者宜服十全大補湯救之投補藥不應者難治若初起熱如火燎刺痛屬陽證速服黃連消毒散外敷回陽玉龍膏此證若首尾純見五善之證者屬順見七惡之證者屬逆也其餘內

外治法俱按癰疽腫潰瘍門

桑柴烘法

艾壯灸法

俱見前卷

仙方活命飲

見腫瘍門

十全大補湯

見潰瘍門

黃連消毒飲

見前百會症

回陽玉龍丹

見腫瘍門

# 油風圖



油風生頭髮內毛髮脫落成片皮屑色紅光亮甚痒亦生鬚眉間及面部

神應養真丹

羌活

木瓜

天麻

白芍

當歸

菟絲子

熟地

酒蒸

川芎

等分

為末

入地黃膏

加蜜

九桐

子大每服百丸溫煮酒或鹽湯任下

散方

神應養真油風養血消風髮復生羌歸木瓜天麻芍菟絲熟地與川芎

海艾湯

海艾

菊花

藁本

蔓荊子

防風

薄荷

荊穗

藿香

甘松

各二錢

水五六碗

同煎

數滾

連湯

醫

宗

金

鑑

卷三

外科要訣

頭部

頭部

頭部

頭部

頭部

頭部

頭部

頭部

頭部

頭部



共入瓶口鉢內先將熱氣薰面候湯少溫用布蘸洗日洗二三次洗後避風忌魚腥發物  
方海艾湯治油風瘡先  
薰後洗善消風藥蔓荊風薄荷藿香海艾與甘松

白屑風圖



白屑風生於頭面作痒抓起白屑脫去起其燥痒增

白屑風 白屑風生頭面燥癢日久白屑見肌熱風侵成燥化換肌潤肌醫此患  
此證初生髮內延及面目耳項燥  
癢日久飛起白屑脫去又生由肌熱當風風邪侵入毛孔鬱久燥血肌膚失養化成燥證也宜多服祛風換肌丸若肌膚燥裂者用潤肌膏擦之甚效

祛風換肌丸 大胡麻 蒼朮 牛膝 石菖蒲 苦參 何首烏 花粉 葳靈仙 當歸身  
酒洗 各二

川芎 甘草 右為細末陳煮酒跌丸菜豆大每服二錢白滾水送下忌魚腥發物火酒  
各一 雨生 方換肌丸治白屑

風燥癢日增若蟲行風燥血益失潤養疊起白屑落復生歸芎胡麻蒼朮膝菖蒲花粉草葳靈苦參何首烏為末煮酒跌丸菜豆形

潤肌膏 香油 奶酥油 當歸 紫草 將當歸紫草入二油內浸二日文火煤焦去渣加黃蠟五錢溶

化盡用布濾傾盆內不時用柳枝攪冷成膏每用少許日擦二次  
方潤肌膏擦白屑風肌膚燥癢用更靈酥香二

油歸紫草煤焦加蠟濾攪凝

禿瘡圖



禿瘡生頭皮癢痒抓破滴水結白膿加多生此頭上

禿瘡 禿瘡風熱化生蟲驗癢難堪却不疼白如如錢生髮內宜服通聖擦膏靈  
此證頭生白如小者如豆大者如錢  
俗名錢癬又名肥瘡多生小兒頭上驗癢難堪却不疼痛日久延漫成片髮焦脫落成禿瘡又名爛頭瘡由胃經熱生風而成宜用防風通聖散料醃酒浸焙為細末每服一錢或二錢量其壯弱用之食後白滾湯調下服至頭上多汗為驗初起肥瘡宜擦肥油膏久則效已成禿瘡者先宜艾葉湯薰前

湯洗淨瘡痂再用猪肉湯洗之隨擦躑躅花油以殺蟲散風蟲死則瘡止風散則髮生血潮則肌膚潤久擦其效

防風通聖散 防風 當歸 白芍 芒硝 大黃 連翹 桔梗 川芎 石膏 黃芩 薄荷 麻黃

滑石 荆芥 白木 山梔子 甘草 共為末 防風通聖治疔瘡胃經積熱致風傷連

肥油膏 番木鱉 當歸 藜蘆 黃藥 苦參 杏仁 狼毒 白附子 鯉魚膽 用香油十兩

將煎藥入油內熬至黑黃色去渣加黃蠟一兩二錢溶化盡用布濾過罐收每用少許用藍布裹於手指蘸油擦瘡

歌方肥油膏能治肥瘡散風殺蟲長髮強黃藥苦參白附子番鱉狼毒杏仁良藜蘆當歸鯉魚胆煤焦入蠟實奇方

躑躅花油方 躑躅花根四兩搗爛用菜油一盞煤枯去渣加黃蠟少許布濾候冷青布蘸擦日用三次既瘡戴之勿

令見風 歌方躑躅花油瘡疔瘡驅蟲止癢擦之良躑躅花根研極爛菜油煤枯入蠟強

# 蜈蚣瘡圖



蜈蚣瘡 蜈蚣瘡即蟬拱頭勢小勢大各有由胎毒堅小多

衣膜著熱形大功易收 此證多生小兒頭上俗名貉腦未

破如曲蟬拱頭破後形似蜈蚣串穴有因胎中受毒者其瘡

腫勢雖小而根劍堅硬潰破雖出膿水而堅硬不退瘡口收

斂越時復發本毒未罷他處又生甚屬纏綿難斂宜用三品

一條槍插於孔內化盡堅硬衣膜換散生肌散貼玉紅膏以

收斂之不致再發也亦有暑熱成毒者大如梅李相聯三五

枚潰破膿出其口不斂日久頭皮串空亦如蜈蚣串穴之狀宜貼紺珠膏拔盡膿毒將所串之空皮剪通使無藏膿之

處用米泔水日洗一次乾撒生肌散貼萬應膏其效有因瘡口開張日久風邪襲入以致瘡口周圍作癢抓破津水相

延成片形類黃水瘡者宜用敗銅散搽之忌魚腥發物

三品一條槍 白砒 明礬 砒礬二味共研細末入小罐內加炭火煨紅俟青烟已盡疊起白烟片時約上下

紅微住火取罐安地上一宿取出約有砒礬淨末一兩加雄黃二錢四分乳香一錢二分共研極細厚糊搗成線條

陰乾瘡有孔者插入孔內無孔者先用針連孔竅早晚插為二條插至三日後孔大者每插十餘條插至七日孔內  
藥條滿足方住患處四邊自然裂開大縫共至十四日前後其堅硬衣膜及疔核瘰癧痔漏諸管自然落下隨用湯  
洗搽玉紅膏虛者兼服健脾補劑自然收斂

搓條良

敗銅散 化銅舊罐子一個研為細末用香油調敷自能滲濕祛瘡瘡口易斂

方敗銅散治潰風傷癰瘡破津脂水

瘡化銅舊罐研細末香油調敷滲濕良

紺珠膏 萬應膏 生肌散 玉紅膏 俱見清

髮際瘡圖



髮際瘡生項後髮際內人多生此瘡

兼受風寒凝結形如卧爪破爛津水時破時斂俗名謂之肉龜經年不愈亦無傷害常用琥珀膏貼之可稍輕也

琥珀膏 定粉 血餘 輕粉 銀珠 花柳 黃蠟 琥珀 麻油 將血餘花柳

麻油燻焦撈去渣下黃蠟溶化盡用夏布濾淨傾入磁盤內預將定粉銀珠輕粉琥珀四味各研極細共合一處徐

徐下入油內用柳枝不時攪之以冷為度綿燕脂攤貼或紅綿紙亦可

方琥珀膏能治諸瘡活瘀解毒化腐良定血

輕朱椒蠟珀麻油熬膏亦療瘡

紺珠丹 凡腫瘍門 防風通聖散 凡瘡 黃連膏 凡鼻部

頭風傷目 頭風引目眉稜痛風火寒痰有四因或因楊梅毒攻項或因產後被風侵 此證畏風惡寒其痛走注不

定得緩少減者風痛也寒熱口苦大渴二便秘不眠者火痛也手足厥冷面青唇白氣逆不渴小水白者寒痛也身重

肢痠心煩作嘔口吐痰沫者痰痛也以上四證舊有古方羌活沖和湯倍川芎加菊花隨經形證加引治之倘若因

循失治風攻眉稜痠痛眼皮跳動漸攻睛珠起藍雲遮睛多致損目若只眉稜痠痛以碧雲散常吸之甚效

羌活中和湯 防風 白芷 錢各一 細辛 甘草 生各五分 生地 蒼朮 黃芩 錢各一 羌活 錢五分 川芎 錢二 引加

葱頭三根生薑一片紅棗肉二枚水煎食遠服 痛由頂後起屬膀胱經倍加薑本 痛由耳後起屬膽經加柴胡

痛由太陽牽引頭額兩目屬胃經倍白芷加葛根煨石膏 頭痛兼有腹痛身重屬脾經倍蒼朮 頭痛兼有足冷

氣逆屬腎經倍細辛甚者加麻黃生附子減黃芩 頭痛兼有嘔涎沫者手足厥冷屬肝經加吳茱萸 頭痛有火

熱渴倍酒洗黃芩加生石膏 便秘者加生大黃 頭痛吐痰涎四肢不冷者加半夏 歌方 冲和頭風風傷目風火

寒痰四因生日久眉稜痠痛跳遮睛損目此能清防風白芷細辛草生地蒼朮羌活芎詳在隨加引經為蔥薑紅棗

水煎成

碧雲散 川芎 鵝不食草 各一 細辛 辛荑 錢各二 青黛 錢一 共為細末患者口噤凉水令人以蘆筒吹入左右

鼻孔內取嚏為效每用少許鼻常吸之其效緩 歌方 碧雲散去頭風證眉稜痠痛更堪醫鵝不食草辛荑青黛芎細同

研不時吸

貼兩太陽穴法 治頭痛如破 雀腦川芎 白附子 各等 研末蔥汁調稠紙攤貼左右太陽穴效 產後風寒侵

腦頭痛不可發汗宜用四物湯倍川芎加荊芥穗服之其效緩 楊梅毒入腦髓以致頭痛者 治在 四物湯 見清

面部

額瘍宮腫色赤左右同



額疽堅硬色紫左右同

額瘍額疽 額瘍額疽漸榴形風熱積熱小腸經瘍起嫩紅浮腫痛疽

紫漫硬木麻疼 註 此二證發於額骨尖處屬小腸經不論左右初小漸

大如榴發陽分者由風熱而生初起嫩紅浮腫疼痛七日即潰名為額

瘍毒輕根淺易愈發陰分者由積熱而生色紫漫腫堅硬麻木疼痛三

七方潰名為額疽毒甚根深難愈瘍證初宜仙方活命飲疽證初宜內

疏黃連湯或麥靈丹其餘內外治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

仙方活命飲 內疏黃連湯 麥靈丹 俱見腫



顧疔圖

顧疔色赤堅硬形小根深左右相向



攻心令人昏憤謔語惡證悉添多致不救

蟾酥丸

見疔瘡門

麥靈丹

見腫痛門

黃連消毒飲

見頭部百會疽

面發毒圖

面發毒形如豆粒色紅堅硬



面發毒 面發毒在頰車生初少漸多赤豆形腫硬焮痛津黃水證屬風熱客陽明此證生面上頰車骨間初生一個漸發數枚形如赤豆色紅焮痛堅硬似疔時津黃水由風熱客於陽明上攻而成初宜服荆防敗毒散汗之若胃火成則唇焦口渴便燥者即服涼膈散下之外以清涼消毒散敷之即愈

涼膈散

黃芩 薄荷

梔子

連翹

石膏

甘草

芒硝

大黃

水二鍾

苦竹葉二十片煎八

分加蜂蜜三匙和服

方涼膈散醫肺胃熱口渴唇焦便燥結冬薄荷翹石膏草芒硝大黃苦竹葉

清涼消毒散

白及 乳香

雄黃

天花粉

麝香

烏藥

山慈姑

黃蘗

各等分共研細末雞子清和蜜水

調敷

方清涼消毒去風熱及乳雄黃花粉麝香烏藥慈姑黃蘗研雜清蜜調毒即滅

防風敗毒散

見頭部腦疽

面遊風像面上起白皮形似細色鱗

面遊風圖



面遊風 面遊風燥熱濕成面目浮腫癢蟲行膚起白屑而癢極破津黃水津血疼此證生於面上初發面目浮腫癢若蟲行肌膚乾燥時起白屑次後極癢抓破熱濕感者津黃水風燥感者津血痛楚難堪由平素血燥感者年庚庚未火秋易月

消風散痛甚者宜服黃連消毒飲外抹摩風膏緩緩取效

摩風膏 麻黃錢五 羌活兩 白檀香錢一 升麻錢二 白及錢一 防風錢二 當歸身錢一 用香油五兩將藥浸五日大

火燂黃即搗去渣加黃蠟五錢溶化盡用絹濾過攪冷塗抹瘡上 方摩風膏抹遊風証麻黃羌活白檀升及防歸

身香油泡燂黃去渣加蠟凝

消風散 見項部 紐扣風 黃連消毒飲 見頭部 百會疽

# 疔腮圖



疔腮 疔腮胃熱是其端初起喉痛熱復寒高腫焮紅風與熱平腫色淡熱濕原 註此證一名髭發一名含腮瘡生於兩腮肌肉不著骨之處無論左右總發端於陽明胃經也初起喉痛寒熱往來若高腫色紅焮熱者係胃經風熱所發若平腫色淡不鮮者由胃經濕熱所生始則俱以柴胡葛根湯表之若口渴便秘宜四順清涼飲解之表裏證俱解腫痛仍作者勢必成膿宜託裏消毒散託之膿熟者鍼之體虛者宜平補

之其餘治法按癰疽潰瘍門此證初起若過服涼藥今毒攻喉者險

柴胡葛根湯 柴胡 葛根 石膏 花粉 黃芩 甘草 牛蒡子 連翹 桔梗 升麻

分三 水二鍾煎八分不拘時服 方柴胡葛根發表證疔腮疼痛或平形石膏花粉黃芩牛蒡連翹桔梗升

四順清涼飲 防風 梔子 連翹 甘草 當歸 赤芍 羌活 大黃 水二鍾燈心五十寸煎

八分食遠服 方四順清涼攻裏強口乾便秘疔腮瘡防風梔子連翹草歸芍燈心羌大黃

託裏消毒散 見腫瘍門

# 癰瘍圖



癰瘍生頸車骨

癰瘍 癰瘍胃經積熱生初如紅粟漸榴形膿出腫消易斂愈膿稀難斂漏因成 註此證生于耳下頸車骨間由陽明胃經積熱而生始發如粟色紅漸大如榴初起宜犀角升麻湯清解之若失治或過敷寒藥以致肌冷凝結堅硬難消難潰者宜升陽散火湯宣發之將潰宜託裏消

毒散膿熟鐵之膿出腫退瘡口易斂者則愈或牙關緊急不開或旁腫不消膿水清稀因而成漏復被寒侵瘡孔致生多骨經年纏綿難愈者服桂附地黃丸外用豆豉餅墊炙壯初用九壯以知熱瘡為止每日灸之以朽骨脫出膿漸少而肌漸平為度兼用紅升丹撒入瘡口內萬靈膏蓋貼每日一易患者當慎起居戒腥發等物漸漸收功

犀角生麻湯 犀角五分 升麻五分 黃芩八分 白附子八分 生甘草五分 白芷八分 川芎八分 羌活二分

防風八分 水三鍾煎一鍾食遠熱服 歌方犀角升麻醫頰瘍色紅初起服之良黃芩白附生甘草白芷川芎羌活防

升陽散火湯 撫芎六分 蔓荊子 白芍酒炒 防風 羌活 獨活 甘草半生 人參錢各一 柴胡 香附各五分

葛根錢一 升麻錢一 礬蚕錢一 生薑一片 紅棗肉一枚 水三鍾煎一鍾食遠溫服 歌方升陽散火過數寒牙又

拘急木痛堅撫蔓芎防羌獨草參柴香附葛升蚕

託裏消毒散見腫瘍門 豆豉餅見法內 紅升丹 萬應膏俱見腫瘍門

骨槽風圖



骨槽風腮頰浮腫牙關緊急

骨槽風 骨槽風火三焦胃耳前顯頰隱隱痛腐潰筋骨仍硬痛牙關

拘急夾邪風 註此證一名牙又發一名穿顯發乃手少陽三焦足陽明

胃二經風火也起於耳前連及顯頰筋骨隱痛日久腐潰腮之裏外筋

骨仍然漫腫硬痛牙關拘急皆由邪風深襲筋骨故也此證屬在筋骨陰

分故初起腫硬難消潰後瘡口難合多致不救初起熱不盛者內宜服

清陽散火湯外以清胃散擦牙真君妙貼散敷腮如初起發表之後人

壯火盛者用皂刺大黃甘草節白芷礬蚕下之後減大黃加生石膏以清之然亦不可過用寒涼之藥恐其凝結也有

硬腫日久失治不能盡消者膿勢將成宜用沖和湯託之已潰按癰疽潰瘍門治法亦有過服寒涼以致肌肉堅凝腐

臭非理中湯佐以附子不能回陽非礬蚕不能搜風如法治之諸證俱減惟牙關拘緊不開宜用生薑片熱炙頰車穴

二七壯其穴在耳垂下五分陷中處日灸之兼用鍼刺口內牙盡處出血其牙關即開若寒熱不退形焦體削痰盛不

食或口內腐爛甚則穿腮落齒者俱為逆證當腐爛之初治法即同牙疳亦不過稍盡人事耳

清胃散 薑黃 白芷 細辛 川芎 各等分共研細末先以鹽湯漱口擦牙痛處 防清胃散擦牙腫痰薑黃白

正細辛等同研先以鹽湯漱後擦此藥有奇功

中和湯 白芷 桔梗 人參 黃耆 各一錢 霍香 分五 肉桂 分五 甘草 白木 分五 川芎 當歸 白芍 各一錢

麥門冬 五分 水二鍾薑三片棗二枚煎八分加酒一杯食遠服 方中 和湯治骨槽風日久不消欲潰膿芷桔參

香薷香草木芍歸芍麥門冬

理中湯 見潰瘍門 真君妙貼散 見腫 升陽散火湯 方見 類傷

### 發頭圖



發頭

癰疽潰瘍門治法若此證失於調治或誤投寒涼起伐之藥毒必內陷腫至咽喉痰湧氣堵湯水難咽者逆

荊防敗毒散 見項部 二味拔毒散 見腫 託裏透膿湯 見頭部 侵微疽

### 時毒圖



時毒在於項領之間左右同

### 時毒

時毒初發類傷寒漫腫無頭在項間因感四時不正氣治分壯弱疎解  
症 此證初起狀類傷寒憎寒發熱令人恍惚不寧肢體痠痛或兼咽  
痛一二日間發於項腮頤頤作腫無頭漸漸焮赤疼痛或似結核有根  
漫腫色赤俱由感冒四時不正邪氣客於經絡釀結而成非發於病後  
之頭毒也惟在醫者精察瘡色辨別虛實治法須宜疎解不可驟用寒

涼致毒不外發而內攻咽喉者險矣初服荊防敗毒散汗之其腫不消者宜服連翹消毒散飲腫仍不消膿勢將成壯者  
宜服透膿散弱者宜服託裏透膿湯外敷二味拔毒散膿熟針之潰按癰疽潰瘍門治法

荊防敗毒散 見頭部 連翹消毒散 見背脊 透膿散 見腫 託裏透膿湯 見頭部 二味拔毒散 見腫



鳳眉疽



鳳眉疽生眉棱骨左右同

湯速潰為妙遲則恐攻眼損睛矣其餘內外治法按癰疽潰瘍門

仙方活命飲見腫門託裏透膿湯見頭部

眉心疽



眉心疽

龍泉疽



龍泉疽在人中之正中

鳳眉疽 鳳眉疽生兩眉棱形長如瓜漫腫紅勝脫小腸肝膽熱煩悶嘔逆不食凶此疽亦名眉發生於眉棱無論左右俱屬足太陽膀胱手太陽小腸足厥陰肝足少陽膽四經積熱所致形長如瓜疼痛引腦二目合腫堅硬赤色按之有根六日內刺之得膿則吉無膿則險甚則十四日不潰煩悶嘔逆不食者凶初宜服仙方活命飲次服託裏透膿

眉心疽 眉心疽生在印堂硬腫為疽浮腫癢經風熱氣凝滯根堅木痛當疔防此證生于兩眉中間疽名曰印堂疽毒初起色暗根平腫硬疼痛至二十一日腐潰出稠膿者順無膿黑陷者逆瘍名曰面風毒瘍毒初起色赤浮腫癢痛易治七日潰膿若色黑木痛麻癢太過根硬如鉄釘之狀寒熱並作即眉心疔也俱由督脈經風熱壅結氣滯所成疽瘍二證俱按百會疽眉心疔治法同疔

龍泉疽 龍泉疽起在人中麻癢堅痛赤豆形上焦風熱攻督脈憎寒壯熱治同疔此證生于水溝穴即人中是也屬督脈經形如赤豆勢小根深堅硬木痛色紫頂焦寒熱交作不時麻癢由上焦風熱攻於督脈而成宜按疔門急速治之遲則毒氣內攻令人煩悶惡心乾嘔神亂昏憤腮項俱腫多致不救

虎鬚毒

虎鬚毒在頰下生胃腎積熱入任經癰癤腫痛速潰易疽堅硬痛麻癢疔此毒一名頰癰疽腫痛赤速潰易治一名承漿疽堅硬痛腫連