


醫學心悟二



傷寒門

傷寒類傷寒辨

傷寒六經見症

太陽經症

頭痛 惡風寒 項脊強

身痛 脈浮 四肢拘急

發熱

陽明經症

目痛鼻乾 唇焦漱水不欲飲 脈長

少陽經症

天都普明子楚國彭鍾齡著



耳聾 胸滿 脇痛 目眩 口苦 咽干 汗出 脈弦
寒熱往來 頭汗 盜汗 活胎 滑胎 脈弦

太陰經症

腹滿痛 下利 脈沉

少陰經症

口燥咽乾 咽痛 下利清水 目不見

厥陰經症

少腹滿 舌卷 囊縮 厥逆 消渴

太陽腑病

口渴 瀉赤

陽明腑病



潮熱 譫語 手足心厥下有汗 不得眠 轉失氣

論裏中之裏

陽明本症用藥 陽明兼症用藥法

合病併病

直中三陰諸症

腹中冷痛 嘔吐清涎沫 下利清穀 但欲寐
脾臥 四肢厥冷 身痛如被杖 衄衄而渴
脈沉細無力 吐瀉

兩感

傷寒兼症

咳嗽 咽痛 鼻衄 鼻鳴 鼻血 鼻翳 便膿血 畜血
動陰血 鼻翳 不能言及語言難出 溫瘡



傷寒論方目錄

太陽經症

桂枝湯

麻黃湯

陽明經症

葛根湯

柴葛解肌湯

少陽經症

小柴胡湯

太陰經症

大柴胡湯

少陰經症

小承氣湯

大承氣湯

太陽腑病

五苓散

陽明臍痛

白虎湯

調胃承氣湯

直中三陰諸症

附子理中湯

白通加豬膽汁湯

四逆湯

理中安蛔湯

咳嗽

止咳散

小半夏加茯苓湯



吐血 犀角地黄湯

畜血 桃仁承氣湯
抵當湯

語言難出 萎蕤湯

發黃 梔子柏皮湯
茵陳五苓散

瀉 加減小續命湯
三乙承氣湯

斑疹 三黃解毒湯
犀角大青湯

結胸痞氣 小陷胸湯
白散

筋惕肉瞤 真武湯

呃逆 扁鵲丁香散

瘕瘕 梔子豉湯

茵陳蒿湯
茵陳朮附湯

大陷胸湯
枳實理中丸

半夏瀉心湯



翻胃 赤散

勞復 人參三白湯

狐惑 雄黃丸

湯毒 梔子湯

百合病 百合知母湯

壞病 羊肉湯

氣上衝心 瓜蒂散

諸方補遺

姜附湯

桂枝附子湯

保和湯

二陳湯

香薷散

香正氣湯

補中益氣湯

栝榔散



北京中醫藥大學圖書館版權所有

四物湯
甘草附子湯
六味丸
桂枝加芍藥湯
六味地黃湯
酸棗仁湯
逍遙散
歸脾湯
桂枝甘草湯

澤蘭湯
麻黃附子細辛湯
子棗湯
人參膏
富婦補血湯
小青尤湯
五味異功散
十全大補湯
代抵當湯

傷寒者冬令感寒之正病也。類傷寒者與傷寒相類而實不也。世人一見發熱輒曰傷寒。率爾發表。七之不去。則以和涼諸法繼之。其間有對症而即愈。醫有不對症而不愈者。有愈而垂危復生者。皆由施治之初。辨症未明也。夫有一病。即有一症。初時錯治。則輕者轉重。重者轉危。自幸安全。性命已如懸綫。大可懼耳。予因著六氣相雜須辨論。是醒斯世。茲更反覆可呼。條列於左。俾人門診視。先取而明辨之。初劑不差。勝於救逆良多矣。學者其致思焉。

一霜降以後。天令嚴寒。感之而即病者。正傷寒也。其症發熱。是



寒頭項痛。腰脊強。身體痛。但脈浮。其無汗為傷寒。麻黃湯
并為傷風。寒用麻黃湯。風用桂枝湯。予以加味香蘇散
隨手而愈。

冬時感寒。不即發。伏藏於內。至春因溫氣感觸而發者。
溫病。春猶不發。至夏因熱氣感觸而後發者。曰熱病。其症頭
痛發熱。與正傷寒同。但不惡寒。而口渴。與正傷寒異。其要者
解肌湯主之。

四時之中。有不頭痛發熱。卒然惡寒。厥冷。口鼻氣冷。嘔吐瀉
瀉。面青脈遲者。中寒也。姜附湯主之。

冬時當寒不寒。乃更溫暖。因氣單薄。以致感寒而病。



冬溫也。冬溫之症，表寒內熱，宜加清藥主之。

一、夏秋之間，天時暴寒，人感之而節病者，時行寒疫也。亦有

非寒疫而其人乘風取冷，遂至頭痛發熱者，名曰感冒。其

症與正傷寒略同，但較輕耳。香蘇散主之。

一、夏月有頭痛身熱，自汗煩渴者，傷暑也。加減香薷飲以主之。

暑症與熱病相似，但熱病初起無汗，暑病初起自汗。熱病脈

盛，暑病脈虛。此為異耳。然有傷暑中暑閉暑之別。治法詳本

門。

一、夏月有病，頭痛發熱，身重腹痛，譫語自汗，兩脛逆冷者，濕溫

也。其人常傷於濕，因而中暑。七。證相搏，名曰濕溫。切忌發汗。



內傷之異有三陰三陽之別詳見本門

一發熱似傷寒。但身不痛。石手氣。口脈紫中。脫痞間。愛腐者。此傷食也。保和湯主之。

病人煩熱似傷寒。而脈來虛軟。無力頭痛。時止時作。肢體倦怠。語言懶怯者。虛煩也。補中益氣湯主之。

一病痰喘似傷寒。但胸滿氣急。脈弦滑者。痰也。二陳湯主之。亦有挾風寒而發者。宜加散劑。

一惡寒發熱。與傷寒相似。而病起自腳。兩脛腫滿者。腳氣也。腳氣不離乎濕。栝榔散主之。然亦有兩足忽然枯細者。俗名乾脚氣。此為風燥之症。四物加牛膝。木瓜主之。



一病人脈浮數發熱惡寒而痛偏着一處飲食如常者畜積有膿也。外癰內癰皆見此候。何爲內癰？大抵口內咳胸中隱痛吐涎腥臭者肺癰也。腹皮膨急按之則痛便數如側作水聲者腸癰也。胃脘隱隱而痛手不可近時吐膿者胃脘癰也。書云嘔家有膿不須治。嘔盡膿自愈不可誤也。發熱似傷寒而其人或從高墜下跌仆損傷或盛怒吐唾狂情過度或過於作勞以致胸腹脇間有痛處着而不移手不可按者畜血也。澤蘭湯主之。此與癰腫有別也。

以上諸症有與傷寒相類而治法不同者有與傷寒相似而實不同類者亦有傷寒與雜症相兼而互至者務在臨病之初辨



明投刺度一七回春實實虛虛之兩可免矣

傷寒六經見症法

六經者太陽陽明少陽太陰少陰厥陰也。三陽有經有腑。有傳有申有太陽之經。即有太陽之腑膀胱是也。有陽明之經。即有陽明之腑胃是也。有少陽之經。即有少陽之腑膽是也。然膽為清淨之腑。無出入之路。故治法如經也。三陰有傳經者。由三陽而傳入三陰。此熱邪也。有直中者。初起不由陽經傳入。而直中三陰。此寒邪也。茲數者。乃傷寒見症之綱領也。

太陽經症

太陽經病。頭痛發熱。項脊強。身體痛。鼻鳴乾嘔。惡風。自汗。脈浮。



緩者名曰中風宜解肌。桂枝湯主之。若前証悉具惡寒無汗。脈浮緊或喘嗽者名曰傷寒宜發表。麻黃湯主之。

桂枝湯

桂枝

一錢五分
去皮

芍藥

一錢五分

甘草

一錢五分

生姜

一錢五分

天棗

四枚
去核

若五味、咳嗽、以水四大鍾、微火煮取二鍾半、去渣、溫服、服後

須臾、啜稀粥數升、以助藥力、溫覆令一時許、徧身漿漿微汗

者、汗者益佳、不可令如水流、滴病必不除、若一服汗出、病瘥

得後服、若不汗、更服、依前法、若病重者、一日一夜、周時觀之

若病症猶在者、乃服至三劑、病愈、冷粘滑肉、麩五辛酒、

