

傷寒真方歌括卷二

副長樂陳念祖修園著

治南林壽萱校訂

陽明上篇方法

邪初傳陽明兼見頭痛惡寒是太陽表症未罷自汗脈緩宜桂枝

湯項背凡凡者凡音殊凡凡者鳥飛羽短伸頭之貌項背與頸也

也桂枝加葛根湯主之無汗脈浮宜麻黃湯項背凡凡者葛根湯

主之或兼見下利若不下利而嘔宜葛根加半夏湯主之若誤下

脈促利不止喘而汗出宜葛根連岑湯主之

有陽明中風兼見寒熱往來脈弦大胸滿及面目悉黃小便難糊

熱時噦與小柴胡湯如脈雙弦心下硬與大柴胡湯



如太陽之邪已罷。悉傳陽明。虛煩。虛熱。咽乾。口燥。舌上白胎。腹滿。煩燥。懊憹。不得安卧。以梔子豉等湯吐之。急除胃外之熱。不使胃家之實。此以吐法為陽明解表之法也。如邪傳陽明。如前兩文。渴大熱。大汗脈洪而長。為陽明經之本症。以白虎湯。白虎加人參湯。主之。汗脈具不。其當病少氣。其與而散色不。

陽明症煩熱不卧。小使不利。宜猪苓湯主之。若出汗過多。小便

不利者。不可用。此陽明病在經之方法也。熱太過則色

利不桂枝加葛根湯不狀。而非水病。故其色不澤。腫脾氣

太陽合病。項比几。汗出傷風。桂葛芍薑棗芍甘不受粥。陽明纔見

即攻驅。病少血。至今不復也。腰者腎之府。腰傷

故腎脈盛也。易於



葛根四錢桂枝芍藥生薑各二錢炙草一錢五分大棗三枚先煎葛根去沫

人諸藥同煎服覆微似汗不須啜粥。按此即桂枝症漸深將及

陽明故加葛根以斷其前路仍用桂枝以截其後路尚書云去

莫如盡此方得之。何如曰病在心亦少腹當

葛根湯以言之曰心為牡臟小腸為之使故曰

太陽項背病凡凡桂葛麻黃因汗無炙草棗薑監制用陽明合病

亦何慮連陰陽相應是以脈見於脈而形見於

葛根四錢麻黃二錢芍藥二錢生薑二錢炙草一錢桂枝各二錢大棗四枚先煮麻黃

葛根去沫入諸藥煎服不須啜粥。此太陽將入陽明若下利則

為太陽與陽明合病蓋以風邪入胃主下利也。脾氣實則



桂枝葛根湯治將入陽明之有汗此治將入陽明之無汗

葛根加半夏湯

合病應利不下利驗之於嘔還分額葛根湯內半夏加開胃

升降治 即前方加半夏二錢

葛如湯升劑也半夏芍藥降劑也太陽陽明兩經皆病開胃

機故以升降法治之

葛根黃芩黃連湯

誤下脉促利不止外邪內陷熱傳裏葛根甘草並芩連提出太陽

喘汗已

葛根 四錢 炙草 黃芩 各三錢

黃連 一錢

先煎葛根去沫後入諸藥同煎



小柴胡湯 大柴胡湯 俱見少陽

梔子豉湯

治後打吐下虛煩不得眠。虛為正氣虛煩為邪氣擾懊憹心不安

身不得寧實堪隣山梔香豉煎溫服胸腹餘邪一切獨

梔子五七枚替豉四錢先煮梔子後入香豉煮服得吐止後服

梔子苦能涌泄寒能勝熱梔象心而大心豆象腎而入腎煩燥不
寧是心腎之病故以苦寒之梔子得豆豉之藹氣作吐凡一切煩

燥煥懷之結於心腹者一吐而具解矣

梔子甘草豉湯 卽梔豉湯加炙草二錢煎服法梔子生薑

豉湯 卽梔豉湯加生薑五錢煎服法無物為嘔有物為吐



欲止其嘔。反令其吐。吐之而嘔。反止。真匪夷所思也。

外邪內陷。熱傷風。梔子湯中甘草。二嘔逆去。草用生薑。薑能散逆。

精神粹。

梔子厚朴枳實湯

腹滿心煩卧不安。正虛邪熾。上中搏。苦寒。梔子快胸膈。枳實能

厚朴寬。

厚朴 薑汁炙四錢 枳實 二錢 梔子 五六枚 水煎服。

梔子乾薑湯

誤下陰陽兩受傷。乾薑梔子合成湯。若能泄熱解煩。蒲幸以驅寒。

並復陽。



中醫藥大學圖書館版權所有

梔子五枚 乾薑二錢五分 水煎服得吐止後服

梔子蘘皮湯

身黃梔子蘘皮湯苦藉甘和甘草長熱達膚開勢外出散邪湯

兩無妨

梔子六七枚 蘘皮二錢 甘草一錢 水煎服

附梔子湯解

按柯韻伯云陽明表症不特發熱惡熱目痛鼻乾等症一切虛煩咽乾口燥舌胎腹滿煩躁懊憹不得卧凡在胃之外者悉是陽明表症仲景製汗劑是開太

陽表邪之出路製梔子湯吐劑是引陽明表邪之出



路。但使心腹之濁邪。上出於口。一吐而心腹得舒。表裏之煩熱悉除矣。熱傷氣者。少加甘草以益氣。虛熱相搏者。多嘔。如生薑以散邪。若下後而心腹滿起。卧不安。是熱已入胃。便不當吐。故去香豉。加枳朴以泄滿。合梔子兩解心腹之妙。又小承氣之輕劑也。若以丸藥下之。身熱不去。知表未解也。心下結痛。知寒結於中也。故任梔子之苦以除熱。倍乾薑之辛以逐寒。然非吐不能以達表。故用此以探吐之。此又寒熱並用。爲和中解表之劑矣。內外熱熾。肌肉發黃。必須苦甘之劑以調之。藳皮甘草色黃而潤。助梔子以除內煩。外熱形色之病。仍假形色以通之。此皆用梔鼓加減。以禦陽明表症之變幻也。韻伯此論。誠千古之特



見學者宜熟讀之。

白虎湯。白虎加人參湯。俱見太陽土救誤篇。猪苓湯。

少陰不眠煩嘔逆陽明熱渴欲飲小便赤利水菜中厲有陰阿膠

猪茯苓滑石宜夏而分別邪正之在外在內也

猪苓去皮茯苓澤瀉滑石阿膠各小二杯煎一杯去滓入膠烱

化溫服。

此與五苓散有天淵之別彼治太陽入本太陽同寒水故以

桂溫之此治陽明少陰結熱二經兩關津液故以甘涼之藥

滋之二症若汗多胃燥即此方亦不可與恐利水傷其液津

也。



陽明中篇


有太陽陽明因汗吐下利小便亡津液胃中乾燥太陽之邪乘胃燥而轉屬陽明致小便數大便鞭論謂為脾約以麻仁丸主之有少陽陽明病已到少陽法當和解而反發汗利小便亡其津液胃中燥熱轉屬陽明以致大便燥結論謂大便難以蜜煎猪膽汁

導之

有正陽陽明陽氣素盛或有宿食太陽之邪一傳陽明遂入胃腑致大便不通論謂實以三承氣湯隨輕重下之此陽明病在腑之

麻仁丸

素常脾約感風寒須用麻仁潤下丸杏仁大黃兼枳朴脾陰得潤



胃腸寬

麻仁二兩

芍藥枳實

各五錢

大黃厚朴杏仁

各一兩

煉蜜丸如梧

桐子大飲服十九漸加以知為度

脾燥宜用緩法以遂脾欲非比胃實當急下也

蜜一杯於銅器內微火煎凝如飴狀取紙撚作挺子以線

扎之外以蜜厚包之如指許長二寸微熱納穀道中以手急

抱欲大便時乃去之時法醃些皂角末

猪膽汁方 猪膽一枚和醋少許以竹管灌入穀道中如一

食頃當大便出宿食惡寒甚效

津液內潤不宜攻須得欲便以法通蜜生潤腸膽泄熱兩方引導



有冊以

大承氣湯

大黃

酒洗二錢

厚朴四錢枳實二錢

五分

芒硝

二錢

杯先煎枳實厚朴至一杯半去滓內大黃煎取一杯去滓內

硝更上微火一兩沸溫服得下勿再服

生者氣銳而先行

熟者氣純而和緩仲景欲芒硝先化燥屎大黃繼通地道而

後枳朴去其痞滿此本方之煎法也若小承氣湯則三味同

煎即寓微和之意

小承氣湯

大黃

四錢

厚朴

二錢

枳實

二錢

水

二杯煎八分溫服初

服當更衣不爾者再服若更衣勿服

大承氣厚朴倍大黃

是氣藥為君分煎取其後來居上欲急下燥屎也小承氣大

黃倍厚朴是氣藥為臣同煎取其氣味渾勻欲微利胃氣也

燥堅痞滿大承氣枳朴硝黃共四味硬未去硝先探試邪輕小實

小承氣

調胃承氣湯

溫溫欲吐心下痛鬱鬱微煩胃氣傷甘草硝黃調胃劑心煩腹脹

熱蒸良

大黃

四錢 去皮 清酒洗

甘草

三錢

芒硝

三錢

水二杯先煮大黃甘草

取一杯去滓內芒硝更上微火煮令沸少少溫服之

熱淫於內治以鹹寒芒硝也火淫於內治以苦寒大黃也更

佐以甘草緩硝黃留中泄熱非煎硝黃傷胃而用之也少少



服之不使其速下而利也。芒硝解結熱之邪。大承氣用之以解已結之熱。此用之以解將結之熱。

附解

按張憲公云承者以卑承尊而無專成之義。天尊地卑。一形氣也。形統於氣。故地統於天。形以承氣。故地以承天。胃土也。坤之類也。氣陽也。乾之屬也。胃為十二經之長。化糟粕運精微。轉味出入而成傳化之府。豈專以塊然之形亦惟承此乾行不息之氣耳。湯名承氣。確有取義。非取順氣之義也。憲公此解超出前人。惜其所著傷寒類疏未刊行。世豈公諱孝。皆古吳人也。



陽明下篇

腑症雖有三而陽明之辨所尤重在能食爲胃強不能食爲胃弱
大都能食者皆可攻下但有緩急之殊惟是不能食者乃有扶虛
寒挾結熱之不同虛寒則食穀欲嘔及乾嘔吐涎沫之症宜吳茱
萸湯溫之結熱則腹滿不大便譫語而脉濇者當用蜜煎膽導
得拘於肺病爲陽槩用寒下而禁用濇劑也又有下利後心下
痞腸鳴乾嘔者用甘草瀉心湯以藥甘爲泄滿法寒厥熱發黃用
茵陳蒿湯從小便以逐穢法不可不知也

吳茱萸湯

陽明吐穀喜茱萸薑棗人參却並驅吐利膝煩手足冷吐涎頭痛

立殊功

吳黃泡人參各二錢生薑四錢大棗三枚水煎服

此方降濁陰扶生氣俾震坤合德土木不害

甘草瀉心湯

下利腹鳴乾嘔痞大棗三枚連薑夏使甘草瀉心湯合宜泄滿降逆

斯為美

炙草二錢黃芩乾薑各一錢五分半夏一錢黃連五分大棗三枚水煎服

茵陳蒿湯

黃如橘色腹微滿頭汗劑餘處無汗小便短三倍茵陳梔大糞內

外厥熱如洗盥



北京中醫藥大學圖書館版權所有