

癰疽

瘰癧

疔瘡

便毒

楊梅

臁瘡

疥瘡

癬瘡

疣瘡

癰瘡

諸瘡

杖瘡

折傷

金瘡

破傷

湯火

虫獸

中毒

骨鯁

膏藥

通治

救荒

# 古今醫鑑

木

新刊增補古今醫鑑卷之八

太醫院醫官金容纂 信編

男 廷賢續編

書林蘊古堂今元聲重刻

癰疽 附陽癰肚癰

此凡諸脉浮數應當發熱其不發熱而反洒淅惡寒若有痛處必發癰疽脉微而遲反發熱弱而數反振發寒當發癰疽○脉浮而數身體無熱形默亡胸中微燒不知痛之所任其人必發癰疽

醫內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火又云膏粱之變足生大丁盖心主血而行氣氣凝滯而為癰疽也癰者壅也大而高起屬平陽六腑之氣所生也其脉數浮疽者沮也平而內發屬乎陰五臟之氣所成也其脉沉數

凡人物生瘡之時便覺壯熱惡寒切急頭痛精神不寧煩燥欬冷者其患瘡疽

必深也若人須患瘡疽起居平常飲食如故其瘡浮淺也

凡外敷貼藥亦發表之意一方謂貼冷藥有神效夫氣得熱則散得冷則斂何謂神効經曰發表不遠熱是也

凡腫易用手按之熱則有膿不熱則無膿重按乃痛膿之深也輕按即痛膿之淺也按之不甚痛者未成膿也若按之即復者有膿也不復者無膿也非也必是水也

凡癰疽未破毒攻臟腑一毫熱藥不敢用若已破潰臟腑既虧飲食少進一毫冷藥不敢用也

凡膿出而反痛者此爲虛也宜補之亦有穢氣所觸而作痛有宜和解之風冷所逼者宜溫養之

凡疽發深而不痛者胃氣大虛必死肉多而不知痛也

凡腫瘍時嘔者當作毒氣上攻治之潰後當作陰虛補之若年老潰後發嘔不

食宜參芪白朮膏峻補河間謂痞瘍嘔者溫氣侵於胃宜倍白朮

凡癰疽發渴乃血氣兩虛用參芪以補氣當歸地黃以養血

凡癰疽有實熱者易發虛寒和熱者難治腫起堅硬膿稠者為實腫下軟慢膿稀者為虛敗膿不去加白芷則去不可用白朮蓋白朮能生膿

凡癰疽始發即以艾多灸之可使輕或騎竹馬灸法最妙蓋火暢達拔引鬱毒此從治之意惟頭為諸陽所聚艾炷宜小而少若其身必痛灸至不痛不痛灸至痛

方連翹散毒散

治癰疽發背疔瘡乳癰一切無名腫毒初起增寒壯熱甚

者頭痛拘急狀似傷寒一日至四五日者二三劑以解其毒輕者則內自消散若至六七日不消宜服真人活命飲後服托裏消毒散調理

柴胡

桔梗

羌活

川芎

茯苓

枳殼

前胡

獨活

連翹

金銀花

防風

荊芥

薄荷

甘草

右劉生薑煎瘡在上食後服在下食前如熱甚并痛甚加黃連黃芩○大便不通加大黃芒硝下之

真人活命飲

治一切癰疽疔腫不問陰陽虛實善惡腫潰太痛或不痛然

當服於未潰之先與初潰之時望瘡已大潰更不宜服初用此劑大勢已退然後隨証調治其功甚捷誠仙方也

穿山甲

三大片切碎以輪粉炒過

甘草節

乳香

白芷

赤芍

貝母各二

防風七分

沒藥

當歸尾

酒洗

陳皮

二升金銀花三升

皂角刺

五分

右剉一劑用好酒一鍾半以紙密封罐口勿令泄氣煎至一鍾隨瘡上下以分飢飽溫服能飲酒者服後再飲三五鍾忌酸薄酒鐵器服後側臥覺痛定回生神功浩大不可億度再看症加減○在背俞倍皂角刺○在腹臍倍白芷○在胸次加瓜蒌仁二升○在四肢倍金銀花

槐花酒

治發背一切疔瘡腫毒未問已成未成但嫩痛者

槐花四五兩微炒黃乘熱入酒二鍾煎半餘沸去滓熱却去成者一二門即消已成者三五服即愈

金銀花酒

治一切癰疽發背疔瘡乳癰便毒及喉明乳癰不問已潰未潰

金銀花連葉搗爛取汁半鍾和熟酒半鍾溫服甚者不過三五服可俟無虞如秋冬無鮮者以收下乾者用水煎和酒服

○按右方治癰疽初起已成未成未潰之先宜之

追風通氣散

治癰疽發背流注腫毒腦疽打破傷折損氣血疳脚氣諸氣

疔瘡理痛腰痛一切痰飲爲患此藥大能順氣活血扶植胃本不傷元氣湯滌邪穢自然通順不生變証真仙劑也

氣血逆於腠理

故令壅結癰疽

調和榮衛實堪宜

赤芍木通白芷

何首烏同枳殼

茴香烏藥當歸

更加國老等無疑

酒水同煎濟世

一癰疽生瘡有二一胃寒生痰加半夏健脾化痰二乃鬱熱而成風痰加桔梗並用生薑水酒煎○一發背因服寒涼之劑過傷脾胃飲食少進顏色憔悴肌肉不生去木通少用當歸倍厚朴陳皮○流注加獨活○腦發背發去木通○打破傷折在頭上者去木通加川芎陳皮○經年腰痛加萆薢酒煎山玄胡索○脚氣加枳櫛本瓜穿山甲煎○痰飲為患或喘或咳或暈頭痛睛疼遍身拘急骨節痠疼胸背頭項肢體腰腿手足聚結腫硬或痛或不痛按之無血潮雖或有微紅亦淡薄不熱堅如石破之無膿或有薄血或清水或如乳汁又有壞肉如破絮或又如癰疽在皮肉之間江鵝卵可移動軟活不硬破之亦無膿血針口贅肉突出惟竟咽喉結塞作寒作熱加南星半真○腫毒堅硬不穿加川芎獨活麻黃連翹煎熱服

托裏消毒散

治一切癰疽六七日未消者服此藥瘡未成即消已成即潰

能壯氣血固脾胃使毒氣不得內攻膿毒易潰肌肉易生切不可早用生肌之藥恐毒氣未盡反增潰爛如有瘡口便貼膏藥以御風入至瘡口閉闔如不用貼此守成之方也

黃芪鹽水炒

天花粉各二

防風

當歸酒洗

川芎

白芷

桔梗炒

厚朴姜制

穿山甲炙

皂角刺炒各

陳皮

金銀花各三

右用水酒各一盞煎至七分瘡在上食後在下空心二服後只用水煎服

千金內托散

治難疽瘰癧未成者速散已成者速潰膿自出無用手術

惡肉自去不用針刀服藥後疼痛頓減此藥活血勻氣調胃破虛祛風和辟穢氣王道之劑宜多服之神效

黃芪蜜炙

人參去芦

當歸酒洗各

防風去芦

白芷

桔梗去芦

薄荷

甘草

生用各厚朴姜炒

如金銀花亦可

右為末每服三錢無炭酒調下不飲酒木香湯調下亦可或都作一劑用酒

煎服尤佳○癰疽腫毒用白芷不腫用官桂○不進飲食加砂仁香附○痛加乳香沒藥○水不乾加知母貝母○瘡不穿加皂角刺○咳加陳皮半夏湯泡七次杏仁姜五片煎○大便閉加大黃枳殼○小便澀加麥門冬車前子木通

神仙蠟礬丸

治癰疽及腸癰消毒固臟腑止疼痛護膜止瀉化膿癰疽潰

後宜服

黃蠟二兩生白礬三兩為末溶蠟為丸如梧桐子大每服三三

十丸酒下不飲酒者漿水下○一日服三次肺癰蜜湯下咳嗽姜湯下

○按右方治癰疽已潰托裏消毒散膿之劑

二仙散

黃真江傳

治癰疽癰疽已成未成已潰未潰疼痛不可忍者

白芷

未潰者用一兩已潰者用五兩

貝母

未潰者用五兩已潰者用一兩

右用好酒煎服

排膿散

治諸癰瘡及貼骨癰不破者不用針刀一服不侈時而自透

神效

蛾口南

用出了套蛾口南一

箇燒灰存性用酒調服即透切不可用三兩箇服之即

生三兩个口

○按石方治諸腫瘰癧疼痛及不破者宜之

芙蓉膏

張秀峯傳

治發背癰疽疼痛如錐刺不可忍登時痛止如神

芙蓉葉

黃荆子

為未各

右二味入石臼內搗極爛用鷄子清調搽患處留頂如烟霧起立瘡此方用

在末消之先或將潰之跡

三神膏

張貢士傳

治癰疽發背

五麻子

去壳日

陳醋

一碗

好塩一撮

右三味置鍋中用文武火熬之槐枝攪成膏先將米泔水洗淨瘡搽上藥留

頂未成膿者即散已成膿即出膿忌一切發物并酒

神妙生肌散敏所見傳

治癰疽發背諸般瘡毒潰爛疼痛

乳香一斤

沒藥二斤一味用研

孩兒茶一斤

血竭一斤

赤石脂一斤

海漂消一斤

輕粉三分

龜板炒一

鱉甲炒一

硃砂二斤生肌

水銀一斤

黑鉛一斤

初起加黃柏一斤

作痒加白芷一斤

右將銀鉛同煎化將煎藥各為末入銀鉛于內研極細參瘡上神効

鐵桶膏

澤州西府傳

治癰疽發背疔瘡癰癰痔瘡粉痛

蕎麥稈灰淋汁二碗熬至一碗下

血竭

乳香

藥各三分

為末入汁內再熬去半碗取下待冷入黃丹八分雄黃八分

硃砂八分好石灰八斤為極細末共一處熬藥汁內攪勻成膏磁器收貯

用三稜針刺破將藥入內直送深入到底不三四次全愈

玉露膏秘傳

治發背癰疽潰爛用此生肌止痛外護

香油二兩黃蠟一兩二味火化開入黃丹末一錢寒水石火煨一兩為綱夫溶化為膏紙攤貼患處

水雪膏開傳

治發背

乾姜炒

川芎

皂角炙去

五倍子炒各一兩

孩兒茶

乳香

沒藥各三 枯礬

槐花各一

右為末苦膽水調塗神效○又方諸灸五倍子入猪腦髓同搗如膏貼之如瘡在右用左邊腦○按石方治癰疽外治之劑

附賜癰疽

千金內消散

治腸癰便毒癰疽初起即消已腫即潰血從大便中出

歸尾酒洗

赤芍

白芷

木鱉子去壳

乳香

沒藥

皂角刺

白殭蚕

瓜蒌仁

天花粉各一

大黃

金銀花各三

穿山甲三大片

甘草節五分

右剉一剉水酒煎空心服紅點加芒硝

內消沃雪湯陳恕軒傳

治肚內生癰及癰疽神効

當歸身

白芍

黃芪

甘草節

麝香

連翹

香白芷

貝母

陳皮

皂角刺

乳香

沒藥

穿山甲

木香

天花粉

金銀花

青皮

甚者加大黃

右剉酒水煎服秘方是世所奇服之立消

一應瘡

痲瘋癰癰者頸腋之間而生結核也或在耳後連及頤頤下至缺盆在鎖骨將陷中皆為瘰癧手少陽三焦經主之或在胸及腋之側皆為馬刀瘡手少陽膽經主之二經多氣少血其初生如豆粒梅李累累相連歷三三五枚久不消漸長大按之則動而微痛不增寒此核惟干後微有熱或夜間口乾飲食少思四肢倦怠是以堅而不能潰也而不能合有風毒者得之於風熱

毒著得之於熱氣毒有得之於氣乃風熱邪氣蘊結乃成皆由氣血不足註  
往亦為勞者經云此不整骨榮丹石之變因虛勞氣鬱所致神宜形氣謂經  
脈則未成者自消已成者自潰若不詳經絡血氣多少脈証受病之異幸用  
摩牛璣猶及流氣飲十宣散則血氣已損而突上患上之禍如指諸掌

治治之當以益志養榮湯主之

五益氣芥湯

治懷抱抑鬱癰瘰流注或四肢患痛肉色不變或目瞽

發熱或清而不斂

黃芪蜜炙

人參

白朮

炒各一  
手半

當歸

酒洗

川芎

白芍

酒炒

生地黄

陳皮

香附

貝母

各

柴胡

地骨皮

桔梗

炒

甘草

炙各  
五斤

右到一劑水煎食遠服○如有痰加橘紅○刺痛加青皮或木香○午後有  
熱或頭微眩加酒炒黃柏○膿水清倍參芪歸○久有鬱氣胸膈不利倍  
曾南石全左益

香附貝母○月經不調加牡丹反芻歸

○按右方治癰癰半攻半補之劑

散腫潰堅湯

治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆中或至肩或于

腕下皆手足少陽經中及癰癰漏於頰或在頰重堅而不潰在陽明足經所

出或二瘡已破乃流膿水并治及生癰癰大如升久不潰者

升麻六分

白芍

黃連各二

歸尾五分

連翹

三棱酒炒

義末

酒炒各

黃芩稍

酒洗

黃柏酒洗

知母酒浸

植梗

昆布

洗

海藻炒

大花粉

酒浸各

龍膽草

酒洗

甘草

炙五

右剉每二兩用水三盞先浸半旦煎至一盞去渣熱服於臥處仰足在高處  
頭微低每噉一口作十次噉服畢依常法計取藥在胸中宜與男搗半  
料作細末煉蜜為丸如豆大每百丸或一百五十丸此藥湯留一口送下

內消散在中尚傳

治癰癰宜先用益氣養榮湯效十服後服此

硃砂一兩

血竭二兩

斑貓去翅足二

右為細末每服

一分空心燒酒調服未破者三五日立消已破者內服此藥

外用金頭蜈蚣

一條研極細末用豚油一小鍾浸二日一夕搽患處其瘡即

腫潰過一二日

腫消可貼膏藥瘡大者二十日瘡小者十餘日平復

天花散

京師傳

治癰癰潰爛疼痛

天花粉

一兩

穿山甲

炒黃色一兩二分

赤芍

一兩七分

白芷

一兩

乳香

二分

沒藥

五分

貝母

七分

歸尾

一兩

金銀花

二兩

右剉一劑好酒一鍾半煎服

○按石方治癰癰專攻之劑

烏龍膏周排山傳

治癰癰潰爛久不愈者

木鱉子

帶壳燒存性去壳

側柏葉

焙

人中血

即髮燒灰

青龍背

即田螺上第膜

紙錢灰

飛羅麵各一升

右為未用好醋調成膏塗瘡上外用紙貼效

仁炙散

治瘰癧潰爛臭不可聞久不能愈

官粉一升

雄黃一升

銀硃五分

麝香二分

右為細末用槐皮一片將針密七刺孔置瘡上上搽藥二撮以炭火炙其

藥氣自然透入瘡中痛熱微止甚者換三次輕者二次全愈

紫雲膏

治瘰癧及一切頑瘡潰爛久不愈并核瘡腫瘡小兒頭瘡

黃蠟一兩

松香五升

黃丹三升

香油四兩

右四味共入鐵鍋內用柳條去皮搗之文武火熬至半炷香為度攤油紙

貼之或搽塗患處效

地龍骨

李杲齋傳

治瘰癧未破者貼之立消

雄黃

地龍糞

小麥麵

各等分研末醋調塗之