

醫學心悟
卷三



醫 學 心 悟 卷三

脫肛	熱淋	腹脹	癰風	小腹痛	中風
小便不禁	小便不通	積聚	噎膈	身痛	類中風
便血	關格	疝氣	痢疾	肩背臂膊痛	傷暑霍亂
尿血	孕婦轉胎	瘦飲	泄瀉	將痛	攪腸痧疫癘
					胸痛
					虛勞
					咳嗽
					喘
					痰
					胃脘痛
					腹脹
					水腫
					遺尿
					三消



醫學心悟第三卷

中風門

天都普明子程國彭鍾齡著

中風者。真中風也。有中。腦中。臟中。血脈之殊。中腑者。中在表也。外有六經之形症。與傷寒六經傳變之症。無異也。中太陽。用桂枝湯。中陽明。葛根湯加桂枝。中少陽。小柴胡湯加桂枝。其法悉具。傷寒門。茲不贅。中臟者。中在裏也。其人眩仆昏冒。不醒人事。或痰聲如曳鋸。宜分臟腑寒熱而治之。假如其人素挾虛寒。或



暴中新寒。則風水相遭。寒水徹骨。而風爲寒風矣。假如其人素有積熱。或鬱火暴發。則風乘火勢。火借風威。而風爲熱風矣。爲熱風。多見閉症。其症牙關緊急。兩手握固。法當疏風開竅。先用搐鼻散吹之。次用牛黃丸灌之。若大便閉結。腹滿脹悶。火勢極盛者。以三化湯攻之。爲寒風多見脫症。其症手撒脾絕。眼合肝絕。口張心絕。聲如鼬肺絕。遺尿腎絕。更有兩目直視。搖頭上竄。髮直如粧。汗出如珠。皆脫絕之症。法當溫補元氣。急用大劑附子理中湯灌之。若痰涎壅盛。以三生飲加人參灌之。間亦有寒

痰壅塞介乎閉脫之間。不便驟補者。用半夏橘紅各一兩。濃煎至一杯。以生薑自然汁對沖。頻頻灌之。其人卽甦。然後按其虛而調之。然予自揣生平。用附子理中治愈者甚多。其用牛黃丸治愈者亦恒有之。惟三化湯一方。並未舉用。此必天時地土人事之不同。然寒熱之劑。屹然並立。古方具在。法不可泯。故兩存之。以脩參酌。中血脉者。中在經絡之中也。其症口眼歪斜。半身不遂是也。大秦芩湯主之。偏在左。倍用四物湯。偏在右。佐以四君子湯。左右俱病。佐以八珍湯。並虎骨膠丸。此治真中之大法。

也。

口噤角弓反張。痙病也。但口噤而兼反張者。是已成痙也。小續命湯。口噤而不反張者。是未成痙也。大秦苳湯。其痙病俱見。前傷寒兼症中。宜細加查核。

不語有心脾腎三經之異。又有風寒客于會厭。卒然無音者。大法。若因痰迷心竅。當清心火。牛黃丸。神仙解語丹。若因風痰聚于脾經。當導痰涎。二陳湯加竹瀝薑汁。並用解語丹。若因腎經虛火上炎。當壯水之主。六味湯加遠志石菖蒲。若因腎經虛寒。

厥逆當益火之源。劉河間地黃飲子。或用虎骨膠丸。加鹿茸。若風寒客于會厭。聲音不揚者。用甘桔湯加疎散藥。

遺尿謂之腎絕。多難救。然反目遺尿者。為腎絕。若不反目。遺

尿者。多屬氣虛。重用參耆等藥補之。則愈。

桂枝湯 葛根湯 小柴胡湯 俱見傷寒

搐鼻散 治一切中症。不醒人事。用此吹鼻中。有嚏者生。無嚏

者難治。

細辛 去葉

皂角 去皮弦 各一兩

半夏 生用 五錢



為極細末、磁瓶收注、勿泄氣、臨用吹一二分入鼻孔中取嚏

牛黃丸

治中風痰火閉結、或癱瘓癰癩、語言蹇澁、恍惚眩暈

精神昏憤、不省人事、或喘嗽痰壅、煩心等症、

牛黃 六錢

射香

龍腦 以上三味另研 羚羊角

當歸 酒洗

防風

黃芩

柴胡

白朮

麥冬 去心 白芍 各七錢五分

桔梗

白茯苓

杏仁 去皮 川芎

大豆黃卷

阿膠 各八錢五分

蒲黃

人參 去蘆

神曲 各一兩二錢五分



雄黃另研 甘草二兩 白斂 肉桂去皮

乾薑各三錢 犀角一兩 乾山藥三兩 大棗五十枚 爛去皮核

金箔六伯五十片內 存二伯片為衣

為細末、煉蜜同棗膏丸、每兩作十丸、用金箔為衣、每服一丸

溫水化下

三化湯 治中風入臟、熱勢極盛、閉結不通、便溺阻隔、不行、乃

風火相搏、而為熱風者、本方主之。設內有寒氣、大便反鞭、名曰陰結、陰結者、得和氣、煖口、寒水自化、不可誤用攻藥、誤即



不能復救。慎之慎之。

厚朴 姜汁炒

大黃 酒蒸

枳實 麩炒

羌活 各一錢五分

水煎服

附子理中湯 見中寒

治寒風中臟陰冷極盛脫症隨見此風

水相遭而為寒風者急服此藥猶可得生夫病屬脫症設誤用疏通開竅之藥如人既入井而又加之以石也必須參附大劑飲之方為合法

三生飲 治寒風中臟六脈沉細痰壅喉響不省人事乃寒痰



厥逆之候

生南星

生烏頭

去皮尖

生附子

各一錢五分

生薑

五片

生木香

五分

水煎服○薛立齋云三生飲乃行經絡治寒痰之涼藥斬關

奪旗之神劑每服必用人參兩許駕馭而行庶可驅外邪而補真氣否則不惟無益適以取敗觀先哲用芪附朮參附等湯其義可見

大秦芩湯 治風中經絡口眼歪斜半身不遂或語言蹇澁乃



血弱不能養於筋宜用養血疏風之劑經云治風先治血血行風自滅是也

秦艽

一錢五分

甘草

炙

川芎

當歸

芍藥

生地

熟地

自製

茯苓

羌活

獨活

白朮

防風

白芷

黃芩

酒炒各八分

細辛

水煎服如或煩躁口渴加石膏一錢五分陰雨加生薑三片

春夏加母八分



竊謂本方初時宜用若日久則以四物四君為主而以風藥

佐之庶收全功

四物湯 四君子湯

八珍湯

俱見虛症

虎骨膠丸

見痺症

小續命湯

見傷寒發瘧

六味湯

見後類中門

甘桔梗湯

見傷寒咽痛

神仙解語丹

白附子

炮

石菖蒲

去毛

遠志

去心甘草水炮炒

天麻



1964
中醫藥大學圖書館藏

全蝎

去尾甘
草水洗

羌法

南星

牛膽製多次
更佳各一兩

木香

錢五

右為末麵湖丸龍眼大每服一九薄荷湯下

二陳湯

陳皮

茯苓

半夏

薑汁炒

炙草

各一錢
五分

加入大棗二枚水煎服

地黃飲子

熟地

九蒸晒
二錢

巴戟

去心

黃肉

去核

肉蓯蓉

酒浸
焙

石斛

附子

炮

五味

杵炒

白茯苓

各一錢



石菖蒲

去毛

桂心

麥冬

去心

遠志

心甘草水
炒各五分

入薄荷少許薑一片棗二枚水煎服。氣虛加入參二錢

甘桔湯

見傷寒咽痛

類中風

類中風者謂火中虛中濕中寒中暑中氣中食中惡中也共有

八種與真中相類而實不同也然類中有與真中相兼者須細

察其形症而辨之凡真中之症必連經絡多見歪斜偏廢之候

與類中之專氣致病者自是不同然而風乘火勢邪乘虛入寒



風相搏。暑風相炫。飲食招風。種種變症。所在多有。務在詳辨。清細。果其為真中也。則用前驅風法。果其為類中也。則照本門施治。果其為真中類中相兼也。則以兩門醫法合治之。斯無弊耳。茲舉類中諸症。詳列於左。俾學者觸目洞然也。

一曰火中火之自外來者名曰賊火。火之自內出者名曰

子虛火也。中火之症。良由將息失宜。心火暴盛。腎水虛衰。不能制之。故卒然昏倒。不可作寔火論。假如怒動肝火。逍遙散。心火鬱結。牛黃清心丸。肺火壅遏。貝母瓜蒌散。思慮傷脾。加



味歸脾湯。腎水枯涸。虛火上炎者。六味地黃湯。若腎經陽虛。
火不歸原者。八味地黃湯。劉河間地黃飲子並主之。此治火
中之法也。或問火中而用桂附者何也。答曰。腎陽飛越。則丹
田虛冷。其痰涎上壅者。水不歸原也。面赤煩躁者。火不歸原
也。惟桂附入味。能引火歸原。火歸水中。則水能生木。木不生
風。而風自熄矣。

一曰。虛中凡人體質虛弱。過于作勞。傷損元氣。以致痰壅氣滯。
卒然昏倒。宜用六君子湯。主之中氣下陷者。補中益氣湯。主