

卷三

六科準繩



證治準繩卷四目錄

諸痛門

頭痛

偏頭風

雷頭風

真頭痛

大頭痛

眉稜骨痛

頭風屑

頭重

頭搖

面痛

心痛胃脘痛

膈痛
心差

腹痛少腹痛

脇痛

腰痛

腎著
腰軟

腰膀痛

脊痛脊強

肩背痛

臂痛手氣手腫痛

身體痛

身體拘急

瘻癰門

癰

痛癰

卽痛風

行癰

卽走注疼痛

瘻癰

卽麻木



脚氣



南京中医药大学图书馆版权所有

證治準繩卷四

金壇王肯堂輯 潘樵程永培校

頭痛 偏頭風
眉稜骨痛
頭風屑
頭重
頭搖

大頭痛

醫書多分頭痛頭風爲二門然一病也但有新久去留之分耳淺而近者名頭痛其痛卒然而至易於解散速安也深而遠者爲頭風其痛作止不常愈後遇觸復發也皆當驗其邪所從來而治之世俗治頭痛不從風則從寒安知其有不一之邪乎試考內經論頭痛所因以明之如風從外入振寒汗出頭痛新沐中風爲首風當先風一日頭痛不可以出內大寒內至骨髓體以腦爲主腦逆故頭痛齒亦痛少陽司天之政初之氣風勝乃搖候乃大濕其病氣怫於上頭痛二之氣火反鬱白埃四起其病熱鬱於上頭痛少陽司天火溼所勝民病頭痛發熱惡寒如瘧歲金不及炎火乃行復則陰厥且格陽反上行頭腦戶痛延及腦頂發熱太陽之勝熱反上行頭項頂巔腦戶中痛目如脫太陽之復心痛痞滿頭痛太陰司天濕溼所勝腰脊頭項痛時眩太陰在泉濕溼所勝病衝頭痛自似脫項似拔太陰之復頭項痛重而掉憇尤甚陽明之復亥噦煩心病在膈中頭痛傷寒一日巨陽受之頭項痛腰脊強靈樞謂風痹股脛爍足如履冰時如入湯煩心頭痛時眩悲恐短氣不出三年死凡此皆六氣相侵與清陽之真氣相薄而痛者也至

於頭痛甚則腦盡痛手足寒至節死頭痛蟯病下虛上實注以腎虛不能引膀胱之氣故爾心煩頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生心熱病者卒心痛煩悶頭痛面赤刺手少陰太陽肺熱病者頭痛不堪汗出而寒刺手太陰陽明腎熱病者項痛員員澹澹然刺足少陰太陽靈樞謂厥頭痛面若腫起而煩心取足陽明太陰厥頭痛頭脉痛心悲善泣取血與厥陰厥頭痛貞貞頭重而痛取手足少陰厥頭痛意善忘按之不得取頭面左右動脈後取足太陰厥頭痛項先痛腰脊爲應先取天柱後取足太陽厥頭痛頭痛甚耳前後脉湧有熱瀉出其血後取足少陽頭痛不可取於肺者有所擊墮惡血在於內若肉傷痛未已可側取不可遠取也頭痛不可刺者大癆爲惡日作者可令少愈不可已頭半寒痛先取手少陽陽明後取足少陽陽明膀胱足太陽所生病頭顙頂腦戶中痛膽足少陽所生病頭痛凡此皆藏府經脈之氣逆上亂於頭之清道致其不得運行壅遏經隧而痛者也蓋頭象天三陽六府清陽之氣皆會於此三陰五藏精華之血亦皆注於此於是天氣所發六淫之邪人氣所變五賊之逆皆能相害或蔽覆其清明或淤塞其經絡因與其氣相薄鬱而成熱則脈滿滿則痛若邪氣稽留則脈亦滿而氣血亂故痛甚是痛皆爲實也若寒濕所侵雖真氣虛不與相薄成熱然其邪客於脈外則血滯脈寒寒則脈縮卷緊急外引小絡而痛得溫則痛止是痛爲虛也如因風木痛者則抽掣惡風或有汗而痛因暑熱痛者或有汗或無汗則皆惡

熱而痛因濕而痛者則頭重而痛遇天陰尤甚因痰飲而痛者亦頭昏重而痛憤憤欲吐因寒而痛者絀急惡寒而痛各與本藏所屬風寒濕熱之氣兼爲之狀而痛更有氣虛而痛者遇勞則痛甚其脈大有血虛而痛者善驚惕其脈芤用是病形分之更兼所見證察之無不得之矣 東垣曰金匱真言論云東風生於春病在肝俞在頸項故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脈起於目內眥上額交顛直入絡腦還出別下項病則衝頭痛又足少陽膽之脈起於目銳皆上抵頭角病則頭角顙痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則渴汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也如氣上不下頭痛顛疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭痛也有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓以腦爲主腦逆故令頭痛齒亦痛有心煩頭痛者病在膈中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也 凡頭痛皆以風藥治之者總其大體而言之也高顛之上惟風可到故味之薄者陰中之陽自地升天者也然亦有三陰三陽之異 太陽經頭痛惡風寒脈浮緊川芎獨活之類爲主 少陽經頭痛脈弦細往來寒熱用柴胡黃芩主之 陽明經頭痛自汗發熱不惡寒脈浮緩長實者升麻葛根石膏白芷主之 太陰經頭痛必有痰體重或腹痛爲痰癖脈沉緩者蒼朮半夏南星主之 少陰經頭痛三陰三陽經不流行而足寒

氣逆爲寒厥其脈沉細麻黃附子細辛湯主之 厥陰經頭疼項痛或吐痰沫冷厥其脈浮緩吳茱萸湯

主之 三陽頭痛藥羌活防風荆芥升麻葛根白芷柴胡川芎芍藥細辛葱白

連鬚

陰證頭痛只用溫中

藥如理中薑附之類 風濕熱頭痛上壅損目及腦痛偏正頭痛年深不愈並以清空膏主之如苦頭痛

每料中加細辛二錢如太陰脈緩有痰名曰痰厥頭痛去羌活防風川芎甘草加半夏一兩半如偏頭痛

服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一倍如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加白芷

丹溪云東垣清空膏諸般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚尾相連痛者不治又云治少陽頭痛如痛在太陽厥陰者勿用蓋謂頭顱痛也

頭旋眼黑頭痛宜安神散川芎散 热厥

頭痛雖嚴寒猶喜風寒微來暖處或見煙火其痛復作宜清上瀉火湯後用補氣湯 風熱頭疼石膏散

荆芥散 冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰厥逆出奇病論中宜羌活附子湯 頭痛胸中痛食減

少咽嗌不利寒冷脈左寸弦急宜麻黃吳茱萸湯 濕熱在頭而頭痛者必以苦吐之輕者用透頂散搐

鼻取涎 新沐中風爲首風頭面多汗惡風當先風一日則病甚至其風日則少愈大川芎丸主之 風

氣循風府而上則爲腦風項背怯寒腦戶極冷神聖散主之 凡治頭痛皆用芎芷羌防等辛溫氣藥升散者由風木虛不能升散而土寡於畏得以壅塞而痛故用此助肝木散其壅塞也若風盛疎散太過而痛服辛散藥反甚者則宜用酸澀收而降之乃愈乳香薑落散之類是也

以上外因

頭痛耳鳴九竅不利腸

冒之所生東垣以爲此氣虛頭痛也用人參黃耆主之 羅謙甫治柏參謀六十一歲先患頭昏悶微痛
醫作傷寒解之汗出後痛轉加復汗解病轉加而頭愈痛每召醫用藥雷同到今痛甚不得安臥惡風寒
不喜飲食脈弦細而微氣短促嬾言語經曰春氣病在頭今年高氣弱清氣不能上升頭面故昏悶此病
本無表邪因發汗數四清陽之氣愈虧損不能上榮亦不能外固所以病增甚宜升陽補氣頭痛自愈製
順氣和中湯經曰陽氣者衛外而爲固也誤汗之衛外之氣損故黃耆甘溫補衛實表爲君人參甘溫補
氣當歸辛溫補血芍藥味酸收衛氣爲臣白朮陳皮炙甘草苦甘溫養衛氣生發陽氣上實皮毛腠理爲
佐柴胡升麻苦辛引少陽陽明之氣上升通百脈灌溉周身者也川芎蔓荆子細辛辛溫體輕浮清利空
竅爲使一服減半再服全愈 血虛頭痛自魚尾眉尖後近髮際曰魚尾上攻頭痛當歸川芎主之 當歸一兩酒
一升煮取六合飲至醉效 當歸川芎連翹熟芍各二錢水煎去渣入龍腦薄荷末二錢乘沸泡之鼻吸
其氣候溫卽服服卽安臥效 氣血俱虛頭痛者於調中益氣湯加川芎蔓荆子細辛其效如神 痰厥
頭痛眼黑頭旋惡心煩亂半夏白朮天麻湯主之痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻
不能解天麻苗謂之定風草獨不爲風所搖以治內風之神藥內風者虛風是也黃耆甘溫瀉火補元氣
實表虛止自汗人參甘溫調中補氣瀉火一朮甘溫除濕補中益氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益

氣調中而升陽炒麪消食蕩胃中滯氣麥芽寬中助胃氣乾薑辛熱以滌中寒黃藥苦寒用酒洗以療冬日少火在泉而發躁也 東垣壯歲病頭痛每發時兩頰盡黃眩運目不欲開嬾於言語身體沉重兀兀欲吐數日方過潔老人曰此厥陰太陰合而爲病名曰風痰宜以局方玉壺丸治之可加雄黃白朮以治風濕更有水煮金花丸灸俠溪二穴各二七壯不旬日愈 鼻鼽腹腫頭痛病在胃經云陽明所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者陽明并於上上者則其孫絡太陰也故頭痛鼻鼽腹腫也 動作頭重痛熱氣潮者屬胃 丹溪云頭痛如破酒炒大黃半兩茶煎服 婁全善云病在胃而頭痛者必下之方愈也如孫兆以利膈藥下張學士傷食頭痛郭茂恂以黑龍丹下其嫂產後污血頭痛皆下咽卽安是也 心煩頭痛病在膈中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也東垣清空膏之類治之 頭痛嶺病下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎許學士謂之腎厥頭痛也其脈舉之則弦按之則堅用玉真丸治之戴復菴用正元散或大三五七散入鹽煎服或於正元散內入炒椒十五粒下來復丹間進黑錫丹有服諸藥不效其痛愈甚宜草硃丹 素問曰頭疼嶺疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入腎狗蒙招尤目眩耳聾下實上虛過在足少陽厥陰甚則入肝下虛者腎虛也故腎虛則頭暉上虛者肝虛也故肝虛則頭暉狗蒙者如以物蒙其首招搖不定目眩耳聾皆暉之狀也故肝厥頭暉腎厥嶺痛不同如此肝厥宜釣藤散 傷食

頭痛胸膈痞塞嘔酸嘔敗卵臭畏食雖發熱而身不痛宜治中湯加砂仁一錢或紅丸子 傷酒頭痛惡心嘔吐出宿酒昏冒眩暈宜葛花解醒湯 怒氣傷肝及肝氣不順上衝於腦令人頭痛宜沉香降氣散
并蘇子降氣湯下養正丹 上熱頭目赤腫而痛脅膈煩悶不得安臥身半已下皆寒足骭尤甚大便微祕宜既濟解毒湯 外有臭毒頭痛一味喫炒香附愈 頭痛連睛痛石膏鼠粘子炒爲末茶清食前調
下 頭風搐鼻白芷散川芎散如金散瓜蒂神妙散火筒散鬱金散

(偏頭風)頭半邊痛者是也丹溪云有疾者多 左屬風荆芥薄荷 左屬血虛川芎當歸 右屬痰蒼朮半夏 右屬熱黃芩 川芎散 細辛散 藁撥猪膽搐鼻中 草麻子半兩去皮大棗十五枚去核右共搗令熟塗紙上用筋一隻捲之去筋納鼻中良久取下清涕卽止 生蘿蔔汁仰臥注鼻中左痛注右右痛注左 一婦人患偏頭痛一邊鼻塞不聞香臭常流清涕時作臭氣服徧治頭痛藥如芎藷等皆不效後一醫人教服局方芎犀丸不十數服忽作嚏突出一鋌稠膿其疾遂愈

(雷頭風)頭痛而起核塊者是也或云頭如雷之鳴也爲風邪所客風動則作聲也 夫治雷頭風諸藥不效者證與藥不相對也夫雷者震也震仰盂故東垣製藥用荷葉者象震之形其色又青乃述類象形當煎局方中升麻湯主之名曰清震湯 張子和用茶調散吐之次用神芎丸下之然後服烏荊丸及愈

風餅子之類衰者用涼膈散消風散熱 頭上赤腫結核或如酸棗狀用排針出血則愈 亦有因痰火
者痰生熱熱生風故也痰火上升壅於氣道兼乎風化則自然有聲輕如蟬鳴重如雷聲故名雷頭風也
用半夏牙皂薑汁酒浸透濕紙包煨再煮一兩 大黃酒浸透濕紙包煨再浸再煨三次二兩 白僵蠶連翹橘紅桔梗天麻各五
錢 青礞石粉草各一 末之水浸蒸餅丸如棗莖大食後臨臥茶吞一錢以痰利爲度然後用清痰降火煎藥
調理

〔真頭痛〕天門真痛上引泥丸夕發旦死旦發夕死爲腦爲髓海真氣之所聚卒不受邪受邪則死不可
治古方云與黑錫丹灸百會猛進參沉烏附或可生然天柱折者亦難爲力矣

〔大頭痛〕頭腫大如斗是也是天行時疫病 東垣監濟源稅時長夏多疫癘初覺憎寒體重次傳面目
腫盛目不能閉上喘咽喉不利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問如染之多不救張縣丞亦患此
醫以承氣湯加藍根下之稍緩翼日其病如故下之又緩終莫能愈漸至危篤東垣診視具說其由曰夫
身半已上天之氣也身半已下地之氣也此雖邪熱客於心肺之間上攻頭而爲腫盛以承氣下之瀉胃
中之實熱是誅罰無過殊不知適其病所爲故遂處方用黃連黃芩味苦寒瀉心肺間熱以爲君橘紅元
參苦寒生甘草甘寒瀉火補氣以爲臣連翹鼠粘子薄荷葉苦辛平板藍根味甘寒馬屁勃白僵蠶味苦

平散腫消毒定喘以爲佐新升麻柴胡苦平行少陽陽明二經不得伸桔梗味辛溫爲舟楫不令下行共

爲細末用湯調時時服之拌蜜爲丸噙化服盡良愈乃施其方全活甚衆名普濟消毒飲子

海藏云太

頭病者雖在身半以上熱伏於經以感天地四時非節瘟疫之氣所著以成此疾至於潰裂膿出而又染
他人所以謂之疫癘也大抵足陽明邪熱太甚實資少陽相火爲之熾多在少陽或在陽明甚則逆傳視
其腫勢在何部分隨其經而取之濕熱爲腫木盛爲痛此邪發於首多在兩耳前後所先見出者爲主爲
根治之宜早藥不宜速恐過其病所謂上熱未除中寒已作有傷人命矣此疾是自外而之內者是爲血
病況頭部分受邪見於無形之處至高之分當先緩而後急先緩者謂邪氣在上著無形之部分既著無
形所傳無定若用重劑大瀉之則其邪不去反過其病矣雖用緩藥若又急服之或食前或頓服咸失緩
體則藥不能除病矣當徐徐瀆無形之邪或藥性味形體據象服餌皆須不離緩體及寒藥或酒炒浸之
類皆是也後急者謂前緩劑已經高分瀉邪氣入於中是到陰部染於有形質之所若不速去反損陰也
此却爲客邪當急去之是治客以急也且治主當緩者謂陽邪在上陰邪在下各爲本家病也若急治之
不惟不能解其紛而反致其亂矣此所以治主當緩也治客當急者謂陽分受陽邪陰分受陰邪主也陰
分受陽邪陽分受陰邪客也凡所謂客者當急去之此治客以急也 假令少陽陽明之爲病少陽爲邪

者出於耳前後也陽明者首面大腫也先以黃芩黃連甘草通炒過剉煎少少不住服呷之或服畢再用大黃或酒浸或煨又以鼠粘子新瓦上炒香咬咀煎去查納芒硝各等分亦細細呷之當食後用徐得微利及邪氣已只服前藥如不已再服後藥依前次第用之取大便利邪已卽止如陽明渴者加石膏少陽渴者加瓜蔞根湯陽明行經加升麻葛根芍藥之類太陽行經加羌活防風荆芥之類選而加之並與上藥均合不可獨用散也 黑白散 甘桔湯加鼠粘子連翹大黃元明粉白僵蠶荆芥 僵蠶一兩錦紋大黃二兩薑汁丸彈子大新汲泉水和生蜜調服 外用井底泥調大黃芒硝末敷之

(眉棱骨痛)眉骨者目系之所過上抵於腦爲目屬於腦也若諸陽經或挾外邪鬱成風熱毒上攻於頭腦下注於目睛遂從目系過眉骨相併而痛若心肝壅熱上攻目睛而痛則亦目系與眉骨牽連併痛若智腑風痰上攻者亦然若太陰之勝濕氣內鬱寒迫下焦痛留項互引眉間其痛有酸者有抽掣者有重者有昏悶者便可審是孰氣之勝也 東垣選奇湯治眉骨痛不可忍神效 丹溪云屬風熱與痰治類頭風風熱者宜祛風清上散因痰者二陳湯加酒黃芩白芷因風寒者羌烏散 戴云眼眶痛有二證皆屬肝 有肝虛而痛纔見光明則眼眶骨痛甚宜生熟地黃丸 有肝經停飲發則眉棱骨痛不可開晝

靜夜劇宜導痰湯或小芎辛湯加半夏橘紅南星茯苓

(頭風屑)

羅謙甫云肝經風盛木自搖動尙晝夜滿招損老子云物壯則老故木陵脾土金來剋之是

子來爲母復仇也使梳頭有雪皮見肺之證也肺主皮毛大便實者瀉青丸主之虛者人參消風散主之萬病紫苑丸治頭多白屑每服三丸至五七丸薑湯下按上治法必有風熱上攻頭目眩痛諸證而後用之若止是白屑但宜白芷零陵香之屬外治而已

(頭重)何因得之曰因天之濕溼外著也因人之濕痰上蒸也因在下之陰氣逆於上也皆得而頭重何以言之頭象於天其氣極清地氣重濁地者陰也土濕也若外著內蒸必壅蔽清道致氣血不利沉滯於經隧脈絡故重內經曰陽氣者因於濕首如裹是外濕蔽著者也又曰脾熱病者先頭重是胃脈引其熱上於頭也太陰之復飲發於中濕氣內逆太陽上留而重痛脅中掉憇尤甚太陽之勝濕氣內鬱亦頭重巨陽之厥腫首頭重發爲徇行靈樞謂督脈之別名曰長強挾膂上項散頭上下當肩胛左右別走太陽虛則頭重高搖之俠脊之有過者取之所別也東垣云頭重如山此濕氣在頭也紅豆散鼻內搐之又方羌活根燒連翹各三錢紅豆半錢右爲末搐鼻爲飲除濕藥則過病所誅罰無過故於鼻取之猶物在高顴之上必射而取之也丹溪云壯實人氣實有痰或頭痛或眩暈大黃酒浸三次爲末茶調服

(頭搖)風也火也二者皆主動會之於顴乃爲搖也內經曰徇蒙招尤目瞑耳聾下實上虛過在足少

陽厥陰註謂徇疾也蒙目不明招掉搖不定也尤甚也目疾不明首掉尤甚又太陰之復頭項痛重掉癲尤甚註謂濕氣內逆太陽上留督中而掉癲也靈樞謂督脈之別長強虛則頭重高搖之然病機有謂諸風掉眩皆屬肝木夫頭之顛足太陽之所過督脈與厥陰之所會是故三經所逆之火留聚於此者皆從風木而爲掉搖也張仲景又言心絕者亦直視搖頭也

(診) 寸口之脈中手短者曰頭痛 推而下之下而不上頭頂痛 寸口緊急或短或弦或浮皆頭痛
浮滑爲風痰易治 短濇難治 浮緊爲太陽 弦細少陽 浮緩長陽明 沉緩太陰 沉細太陰
浮緩厥陰 浮弦爲風 浮洪爲火 右寸滑或大或弦而有力皆痰火積熱 細或緩兼體重者濕
左脈不足血虛 右脈不足氣虛 左右俱不足氣血俱虛 右寸緊盛食積 右關洪大爲胃熱上
攻 寸口弦細爲膈上有風涎冷痰或嘔吐 沉細爲陰毒傷寒但頭痛身不熱也 診頭痛目痛久視
無所見者死 痘苦頭痛目痛脈急短濇死

面痛

面痛皆屬火蓋諸陽之會皆在於面而火陽類也心者生之本神之變其華在面而心君火也暴痛多實久痛多虛者抑之鬱者開之血熱者涼血氣虛者補氣不可專以苦寒瀉火爲事 許學士醫檢正患

鼻頰間痛或麻痺不仁如是數年忽一日連口唇頰車髮際皆痛不開口言語飲食皆妨在頰與頰上常如糊手觸之則痛此足陽明經絡受風毒傳入經絡血凝滯而不行故有此證成以排風小續命透髓丹之類與之皆不效製犀角升麻湯贈之數日愈夫足陽明胃也經云腸胃爲市又云陽明多血多氣胃之中腥羶五味無所不納如市塵無所不有也以其腐熟飲食之毒聚於胃此方以犀角爲主解飲食之毒也陽明經脈環唇挾舌起於鼻合頰中循頰車上耳前過客主人循髮際至頭顱今所患皆一經絡也故以升麻佐之餘藥皆滌除風熱升麻黃芩專入胃經 老母年七十餘累歲患頰車痛每多言傷氣不寐傷神則大發發之劇則上連頭下至喉內及牙齦皆如針刺火灼不可手觸乃至口不得開言語飲食並廢自覺火光如閃電尋常涎唾稠粘如絲不斷每勞與餓則甚得臥與食則稍安知其虛也始以清胃散犀角升麻湯人參白虎湯羌活勝濕湯加黃芩甘桔皆不效後改用參耆白朮芎歸升柴甘桔之類稍佐以芩梔連翹黍粘空腹進之而食遠則服加減甘露飲始漸安第老人性躁不耐閒勞與多言時有之不能除去病根然發亦稀少卽發亦不如往歲之劇矣 從子鍇因喪子鬱結復多餌鹿角膠諸種子藥或於食後臨臥輒進之以至積成胃熱遂患而痛如老母證服清胃散甘露飲大加石膏過當面見虛證又服參耆等補藥過當而復見火證門人施生以越鞠加山梔連翹貝母橘紅之屬開其鬱結而始得安

諸方書無面痛門今補之且具載上三條以見用藥不可執一耳非三條之足以盡是病也

頸項強痛

經云東風生於春病在肝肺在頸項 諸瘡項強皆屬於濕 缺益之中任脈也名曰天突

當缺益中
夾動脈是

一次任脈側之動脈足陽明也名曰人迎

挾喉兩
旁動脈

二次脈手陽明也名曰扶突

挾喉動脈之後曲

頰之前一寸後是

三次

脈手太陽也名曰天聰

手陽明之後
當曲頰之下

四次脈足少陽也名曰天容

曲頰之後
當耳之下

五次脈手少陽也名

曰天牖

耳後當完骨上

六次脈足太陽也名曰天柱

挾項大筋中

七次脈頸中央之脈督脈也名曰風府

足陽

明挾喉之動脈也其脈在膺中 手陽明次在其肺外不至曲頰一寸 太陽當曲頰 足少陽在耳下

曲頰之後 手少陽出耳後上加完骨之上 足太陽挾項大筋之中 然則頸項強急之證多由邪客

三陽經也寒搏則筋急風搏則筋弛左多屬血右多屬痰 頸項強急發熱惡寒脈浮而緊此風寒客三

陽經也宜驅邪湯 頸項強急動則微痛脈弦而數實右爲甚作痰熱客三陽經治宜疏風滋血湯 頸項強急寒熱往來

或嘔吐或脇痛宜小柴胡湯升麻防荆湯 頸項強急腰似折項似拔加味勝濕湯 精神短少不得睡

項筋腫急難伸禁甘溫宜苦寒養神湯主之 本事方椒附散治腎氣上攻項背不能轉側於虛寒者爲