

卷二

發熱論

惡寒

寒熱往來

四時感冒

內外寒熱

咳嗽

嗽血

卒中暴厥

中風

中寒

中風

中濕

中氣

中食惡

傷暑

傷濕

傷燥

傷飲食

金匱啟鑰

第二冊

濂江黃朝坊

妙山輯著

明萬應同人

傷暑

傷濕 傷燥 皆為濕熱傷寒中之一症也

五症今不分傷寒與濕熱兩大法門似黃朝坊

妙山

尚在乾嘉以前絕少手眼至伏氣新感久

要乃門外漢矣 白雲下工王素臧識

辛酉年

發熱論

漉江黃朝坊妙山輯著

熱者如火之炎熱也。凡發無兩相別。其有不同者。特內傷外感之辨耳。何以辨之。從脈辨之。如人迎脈大於氣口爲外感。氣口脈大於人迎爲內傷。外感則寒熱齊作而無間。內傷則寒熱間作而不齊。外感惡寒雖近烈火不能除。內傷惡寒得溫煖而必解。外感惡風見風便畏。內傷惡風不畏甚風。反畏隙風。外感頭痛不休。內傷頭痛乍痛乍止。外感証顯在鼻。故鼻氣不通。或流清涕。內傷証顯在口。故口不知

味而惡食。外感手背熱。手心不熱。內傷手心熱。手背不熱。外感者宜發散。內傷則宜溫補。又有內傷外感兼病者。內傷重者溫補爲先。外感重者發散爲主。且熱有各臟之異。肺熱者輕手乃得。微按全無熱。在皮毛上爲肺熱。蓋肺主皮毛。日西尤甚。其証必見喘咳。灑淅寒熱。輕者瀉白散。重者涼膈散。白虎湯之類。及地骨皮散。心熱者。心主血脉。微按至皮膚之下。肌肉之上。輕手乃得其熱。少加力按之。則不熱。是熱在血脈也。日中大甚。乃心之熱。其証煩心而燥渴。心痛。掌中熱。而噦。以黃連瀉心湯導赤散安神丸。及千金地黃丸。門冬丸。主之。脾熱者。輕手捫之不熱。重按至筋骨。又不熱。不輕不重之間則熱。此熱

調胃承氣湯治實熱補中益氣湯人參黃耆散虛中有熱者用之
熱者按之肌肉之下骨之上乃肝之熱寅卯時尤甚其脈弦其症四
肢拘攣便難轉筋多怒多驚四肢困熱筋痿不能起於床瀉青丸柴
胡飲之類兩手脈弦者或寅申而發皆肝熱也俱宜用之或當歸蘆
薈丸左金丸隨用之腎熱者輕按不熱重按至骨其熱蒸手如火如
灸其人舌酥酥然如虫蝕困倦炙熱亦不能起於床此以滋腎丸六
味地黃丸主之五心煩熱是火鬱於地中四肢率於脾脾生於火心
火下陷在脾土之中故宜升發火鬱以火鬱湯主之手足心熱須用

枝子香附蒼朮白芷半夏川芎爲末神曲丸有肌熱燥熱目赤面紅
煩渴惡飲切其脈浮大而虛証似白虎惟脈不長寔誤服白虎必危
宜當歸補血湯有腎虛火不歸經發熱煩渴面目俱赤徧舌生刺兩
脣黑發喉間如烟火上衝足心如烙痰涎喘急脈洪大而數無倫次
按之微弱宜十全大補湯吞八味丸有夜發多而晝發少是邪氣下
陷之深也此雜症當從熱入血室論渴血湯主之熱病之作有內外
之辨如感風寒傳化爲熱或因時氣火盛爲熱者皆外來之熱有因
飲食勞倦酒色七情藥餌過煖陰虛而致者皆內生之熱然五臟之
熱証有可據如肺氣上通於鼻下主於皮毛心氣上通於舌而下主

肌肉。肝氣上通於目。下至於筋節。腎氣上通於喉耳。下至於二陰。凡有諸中者。必形諸外。故必有熱症可據。方可以熱論治。醫中關係。惟此爲最。如心經微熱者。二陰煎安神丸。天王補心丹。導赤散之類。熱甚者。瀉心湯。黃連解毒湯。八正散。及犀角地黄湯。肺經微熱者。宜加減一陰煎。麥門冬湯。瀉白散。熱甚。黃芩清肺飲。黃芩知母湯。肝經微熱。宜化肝煎。保陰煎。熱甚者。加味龍膽瀉肝湯。芍藥清肝散。七正散。脾胃微熱者。清化飲。黃芩芍藥湯。陽明熱甚者。白虎湯。瀉黃散。或大清飲玉泉散。腎經微熱者。一陰煎。滋陰八味丸。熱甚。正氣湯。丹溪大

補陰丸。兼胃火者。玉女煎。膀胱微熱者。五淋散。熱甚者。大分清飲。化陰煎。三焦微熱者。徒薪飲。熱甚者。抽薪飲。涼膈散。三補丸。大金花丸。大連翹飲之類。腎虛火不歸經而發熱者。用八味丸。必用重劑。或十全大補湯。加附片。五味。麥冬。山藥。芡皮。丹皮。澤瀉。如陰中之陰虛發熱。則宜用至陰之藥。如熟地。當歸。龜膠之類。畧爲類指。切宜詳之。

証治歌

病名發熱最須分。外感內傷兩不同。看証却無甚分曉。切脈乃能內外明。人迎大於氣口。爲外感。氣口大於人迎。內傷成。外感寒熱一齊作。內傷寒熱間相乘。內傷惡寒得溫解。外感近火亦如水。外感惡風。

鼻塞流涕。口無味惡食內傷人。外感。手背熱。手心不熱。內手心熱。

手背不烘。內外審察証辨的。須精用藥。後先行內宜溫補。外發散。內

外相兼。別要真。內重須先溫補。劑外重須以發先攻。熱分臟腑。毋相

混。肺熱輕知喘咳。因輕宜瀉白。散重涼膈。散白虎湯。地骨皮散。類相。

陳心熱。皮下肌肉上。心中煩痛。燥渴循掌熱。而臑須明辨。藥用黃連

以瀉心。更有安神。九兼導赤。散千金。地黃丸。不買麥門冬。九脾熱按。

宜不輕。不重。熱在肌肉。夜如焚。四肢不收。無氣動。怠惰嗜臥。沒精神。

藥宜瀉黃調。胃承氣。虛熱人參。黃芩散。及補中。益氣。肝熱。骨上肌肉。

金匱要略卷之八
二
癰疽
四

下寅卯時甚脈弦分筋痿肢滿難旋轉四肢困熱多怒驚治宜瀉青

九

柴胡飲當歸蘆薈酌左金腎熱輕輕按不得重按至骨如火蒸其

骨酥酥如虫蝕困倦不起快滋陰九宜滋腎

六味

地黃至五心煩熱

火宜升蓋因心火下陷土火鬱湯投效最工手足心熱梔

子香

附蒼

朮

自芷半

下川芎

爲末

神曲九

功面紅目赤肌燥熱煩渴思飲脈虛

烘此宜當歸補血至悞投白虎以危論抑有煩熱面目赤舌刺唇黑

喉火衝足心如烙痰喘急脈洪大數數無倫次按微熱此何証証爲

腎火不歸經急用十全吞八味庶幾調養保長生又有夜熱多於晝

此爲邪氣下陷深此從熱入血室論瀉血湯投病自輕總之熱病分

食傷勞倦。酒色七情自相侵。肺氣通鼻皮毛並。心氣通舌血脈營。脾

氣通口四肢主。胃通頭牙面肌肉。鄰肝上通目下筋節腎通喉耳下

二陰。病中形外方爲的。此中關係要詳明。心經微熱天王補心丹。二

陰煎導赤散。好安神。熱甚瀉心湯黃連解毒八正散。犀角地黃湯靈

肺熱微宜散。瀉白加減一陰煎。和麥門熱甚黃芩清肺飲。黃芩知母

湯用亦工。肝經微熱化肝煎。進保陰煎進亦良。臣熱甚龍膽瀉肝湯

宜加味。芍藥清肝七正同。脾胃熱須清化飲。黃芩芍藥亦相因。白虎

獨噬陽明熱。玉泉亦解甚熱烘。更進瀉黃散。大分清飲。脾胃之病免

憂驚腎經微熱如何治一陰^煎八味奏奇勳大補陰丸兼正氣湯獨

醫熱甚要知真若兼胃火和玉女^煎膀胱微熱五淋^散仁熱甚化陰

大分^{清飲}三焦微熱治徒薪熱甚抽薪涼膈散^{大連喬飲}三補^丸及

大金^{花丸}腎火不歸而發熱重投八味^丸以滋陰十全大補湯原好

此中加味要融通五味丹皮和澤瀉^藥附片^{及麥}門冬陰中

之陰虛發熱至陰之藥早開陳熟地當歸以類聚龜膠等分細推尋

門多類別詳分曉囑咐時師要酌斟

脈

浮大無力爲虛沉細有力爲實沉細或數者死心脈洪者生浮而瀼

四肢厥不欲見人食不入利不止者死

方

瀉白散

治肺火皮膚蒸熱洒淅寒熱日晡尤甚喘嗽氣急

桑白皮

地骨皮

甘草

分五粳米

一

方加黃連

涼膈散

治心火上盛中焦燥實煩燥口渴目赤頭眩口瘡唇裂吐

血衄血大小便秘諸風癱瘓胃熱發斑發狂及小兒驚急痘瘡

黑陷

連翹

四

大黃

酒

芒硝

甘草

二

梔子

炒

黃芩

酒

薄荷

一

右爲末加竹葉生蜜煎 每服三

白虎湯 治傷寒脈浮滑表有熱裏有寒及三陽合病脈浮大腹滿

身重難以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則

頭上生汗手足逆冷自汗出者通治陽明病脈洪大而長不惡

寒反惡熱頭痛自汗口渴胎目痛鼻乾不得卧心煩燥亂日

晡潮熱或陽毒發斑胃熱諸病

石膏 知母 甘草 粳米 飴

右先煮石膏數十沸再投藥米米熟湯成溫服

地骨皮散 治壯熱作渴

瀉心湯 治心熱

黃連

水煎服

導赤散 治小腸有火便赤淋痛面赤狂燥口糜舌瘡咬牙口渴

生地黃 木通 甘草稍 淡竹葉 等分煎服

硃砂安神丸

硃砂

研水飛

黃連

酒炒

炙甘草

生地

當歸

右蒸餅爲丸

千金地黃丸

黃連

生地

研取汁連渣拌黃連末和勻曬乾用

右蜜丸梧子大麥冬湯下

門冬丸

治心熱

麥冬

去心

黃連

右蜜丸食後熱水下

渴黃散

治脾胃伏火口燥唇乾口瘡口臭煩渴易飢熱在肌肉

防丰

藿香

山梔

炒黑

石膏

甘草

右爲末微炒香蜜酒調服

調胃承氣湯

治傷寒陽明症不惡寒反惡熱口渴便閉譫語腹滿

中焦燄實及傷寒吐後腹脹滿者陽明病也

治渴症中消善食而洩

大黃酒浸

芒硝炙草

少少溫服

補中益氣湯

治煩勞內傷身熱心煩頭痛惡寒惡食脈洪大

而虛或喘或渴或陽虛自汗或氣虛不能攝血或瘡痢脾虛久不能愈一切清陽下陷中氣不足之症

黃耆蜜炙

人參甘草炙

白朮土炒

陳皮

當歸

升麻

柴胡

右姜三片棗二枚煎服