

本草綱要

一草部

二木部

三果部

四穀部

五部

六菜部

二金石水土部

三禽獸部

四鱗介魚蟲部

五人部



宣除風熱
定驚

宣去風濕

補血潤燥
滑腸

釣藤 鈎苗 茄芋 番薯



甘微苦寒除心熱。平肝風治大人頭旋目眩。小兒等治風癇。有苗芋丸治風癇。有苗芋酒
俗謂之搖客。忤胎風發斑疹。主肝風相火之病。風補以秦膠頭圓尾多肥潤氣香者。有
刺類釣鈎細而多鈎者良。概用鈎其父煎則無力。

功加倍
苗芋丹風濕諸証多用之。苗芋石南
方風濕諸酒多用之。令人取葉煎湯熟食治牙蟲喉痺甚效。蘇頌曰古方治風癇有苗芋酒
斧草皆治風妙品。近世罕知。斧草辛溫有毒。治頭風癇乳癰疝瘕。蘇頌曰古方風濕諸酒多用之。苗芋石南

辛苦微溫有小毒。治風濕拘攣痙攣。時珍曰古方治風癇有苗芋丸治風癇有苗芋酒
和氣風癇無汗。痘音擎上聲。肩強項直角弓反張。曰痘無汗為剛症。有汗為柔症。當歸
血中之氣藥。治虛勞寒熱。放逆上氣。氣降溫。瘧肝和脾。瘧陰陰瘧。便血頭痛腰痛。心腹諸痛。寒
石榴而短厚並炙用。

甘溫和血。辛溫散內寒。苦溫助心散寒。諸血屬心。凡通脈者必入心肝脾。心生血。肝藏血。
先補心。當歸苦溫助心。心肝脾血。脾統血。為氣聚。筋骨緩。鐵足不任地。曰痿。風寒濕客於肌肉。血脈曰痙。血凝。癥瘕。疽瘡瘍。衝脈氣病。氣
癥瘕。筋骨緩。鐵足不任地。曰痿。雖堅硬而柔軟無常。曰瘕。尚未至癥也。瘀。尚未至癆也。瘧。當歸
足湊三陰。灌諸絡為十二經脈之海。主血。帶脈橫圍於腰如束帶。總約諸脈。血旺則排腰止痛。血和則然滑大腸。漏者忌。

逆裏急帶脈為病。腹痛腰溶溶如坐水中。衝脈起於腎下出於氣街。挾腰上行於胸中。上頸頸涉諸陽。灌諸經下行入足湊三陰。灌諸絡為十二經脈之海。主血。帶脈橫圍於腰如束帶。總約諸脈。血旺則排腰止痛。血和則然滑大腸。漏者忌。及婦人諸不足。一切血証陰虛而陽無所附者。潤腸胃澤皮膚養血生肌。血旺則排腰止痛。血和則然滑大腸。漏者忌。
用。當歸為君。白芍為臣。地黃為佐。芎藭為使。名四物湯。治血之總制。血虛佐以人參。黃耆血熱佐以徐芩。梔連。血積佐生陰血之義。多有通經四物能養陰陰得其養。則血自生。北四物能生血也。若氣虛血弱之人。當用用人參。取陽旺物陰滯之藥而反致害者。使氣血各有所歸。故名氣調而血和也。東垣曰。頭止血。而上行身養血。而中守尾。破血而不流全活血而不走。雷敷海藏並云。頭破血時珍曰。治上用頭治中用身治下用尾。通治全用一定之理也。川產力剛。善攻秦產力柔。善補。以秦膠頭圓尾多肥潤氣香者。良。名馬尾當歸。尾粗堅枯者。名鏡頭當歸。只宜發散用治血酒製。有瘀血製藥。並製亦勝說耳。畏菖蒲海藻生薑惡瀉。麵。

補血潤肝
濡飲陰

白芍



辛溫升浮為少陽引經。膽入手足厥陰氣分。肝乃血中氣轉助清陽而開諸藥。丹溪曰。鬱自降為通陰。潤肝燥而補肝虛。肝以濁為補。所謂辛上行頭目。下行血海。銜搜風散瘀。止痛調經治風濕在頭。血頭痛。能引血下行頭痛。必用之加各引經药。太陽羌活陽明亦能頭痛。腹痛腸風。氣鬱血鬱。濕血痢。寒瘲筋掣。目淚多涕。肝風木為病。諸風眩掉。則陽血氣之使。從五臟生皆陰陽相滯而成氣為陽血為陰血行脈中氣行脈外相並。周流寒濕搏之則滯於陰致生惡毒。然百病皆由此。男婦一切血証。然香瀉辛散能走泄真氣。單服久服令人暴亡。服則過劑生邪故有此矣。若有配合節制則不至此矣。昂按芍地酸寒為陰。芍鍊辛溫為陽。故四物取其相制。以行血药之滯耳。川芎散豈能生血者乎。治法云。驗胎法婦人過經三月。用川芎末空心熱湯調一匙。腹中微動者是胎不動者是經。聞蜀產為川芎。秦產為西芎。江南為撫芎。以川產大塊。裏白不油。辛甘者勝。白芷為使。畏黃連。硝石。滑石。惡黃者山茱萸。

苦酸微寒。入肝脾血分。為手足太陰。行經藥。肺濁肝火。酸斂肝肝以斂。安肺脾固腠理。主皮毛。脾主肌肉。肝木不赴土則脾安。土旺能生金。則肺安。脾和肺安。則腠理固矣。

生津小便自利。緩中止痛。東垣曰。經曰。損其肝益氣除煩。斂汗安胎。補勞道熱。治濁痢。後非通行之謂也。緩其中即調血也。益氣除煩。斂汗安胎。補勞道熱。治濁痢。後

重能除胃脾虛腹痛。濁痢俱太陰病不可缺此。寒濁冷痛。忌用虞天氏曰。白芍不惟治血。

中濕熱脾虛腹痛。虛大能行氣。古方治腹痛用白芍四錢。甘草二錢。芍藥甘艸湯。蓋橫行則兩脇痛。肺脹喘噫。嗳氣能理中。濁肝。肺脹喘噫。同。癰腫疝瘕。其收降之體又能入血海。衝脈為血海。而至厥陰。經治鼻衄。音女六切。目脫痛。因營氣不從逆於皮裡。白芍能理中。濁肝。肺脹喘噫。同。

澁肝血不足。退火益陰。婦人胎產。及一切血病。又曰。產後忌用。丹溪曰。以其酸寒伐生發之氣也。必不得已。酒炒用之。約以避中寒。微寒如芍药。古人猶諱。告戒。况大苦大寒可肆行。口莫之忌耶。同白朮。補脾同參。者補氣同歸。地補血同。芎。窮。濁。肝。同。甘。艸。止。腹。痛。同。黃。連。止。濁。痢。同。防。風。發。痘。証。同。蓋。棗。溫。經。散。濕。同。尤。能。濁。肝。火。散。惡。血。治。腹。痛。堅。積。血。痺。疝。瘕。邪。聚。外。腎。為。癥。經。閉。腸。風。雍。腫。目。赤。皆。散。濁。而。散。白。益。脾。能。於。土。中。濁。水。赤。散。邪。能。行。血。中。之。滯。產。後。俱。忌。用。赤。白。各。隨。花。色。單。瓣。者。入。藥。酒。炒。用。制。其。婦。人。血。分。醋。炒。下。痢。後。重。不。炒。惡。坐。硝。石。斛。畏。蠶。甲。小。箭。反。藜。蘆。

大安

補陰涼血

平補肝腎
養血滋陰

熟地黃



乾地黃



生地黃

都用浙產長細
者為鮮生地

甘苦而寒沈陰而降入手足少陰心厥陰心包及手太陽經

腎陰退陽生血涼血治血虛發熱

陽生內熱

勞傷咳嗽

吐衄崩中

唾血者血從垂出咯血者通瘻咯出或帶血然出臂經及肺經自兩脇逆上吐

出嘔出者成盃成碗屬胃經經漏不止曰崩血熱

則妄行宜以此涼之虛人忌用用乾地黃可也

損胃生掘鮮者搗汁飲之或用酒製則不傷胃生則寒乾則涼熱則溫故分為三條以

吐衄崩中。唾血者血從垂出咯血者通瘻咯出或帶血然出臂經及肺經自兩脇逆上吐出嘔出者成盃成碗屬胃經經漏不止曰崩血熱則妄行宜以此涼之虛人忌用用乾地黃可也。傷寒陽強痘症大熱痘症用之甚多本艸未見多服

者加桂附所謂益火之原以消陰翳也。尺脈旺者加知柏所謂壯水之主以制陽光也。

海上方搗汁和麵作飴餉食能利出蟲忌用鹽本草惟曰丹溪云氣病補血雖不中病亦無害也不知血病屬陰其性氣而氣虛亦不可徒補其血也。凡勞病陽虛宜四君補氣陰虛以四物補血陰陽俱虛者宜合用名八珍湯。江浙生者南方陽氣力微北方生者純陰力大以懷慶肥大苟花心者良酒製則上行外行薑製則下行。甘而微溫入手足少陰厥陰經滋腎水補真陰填骨髓生精血聰耳明日耳為腎目為能視耳得血而能聰耳。髮烏匙治勞傷風痺胎座百病為補血之上劑。丹溪曰產前當清熱養血為有雜症從末治之。昂按丹溪後大補氣血一語誠至當不易之論後人不善用之多其風寒未解瘀血未盡妄施峻補反致大害者不可不慎王碩云男子多陰虛宜熟地女子多血熱宜生地以好酒拌砂仁末浸蒸晒九次用地黃性寒得酒與火與日則溫性泥得砂仁則和氣且能引入丹田六味丸用之為君尺脈弱則

補陰涼血。火上升津液生痰不生血宜補血以制相火其痰自除。痿痺驚悸有觸而心動曰驚無驚有因心虛火動者有因肝虛膽怯者有因水停心下者火除心下者火除。吐衄承血由心腎氣結或憂思房勞所致多屬虛寒不可專作熱治。血運崩中搏謂之崩足下熱痛折跌絕筋生地一斤瓜薑糟一斤處冷則易之又生地汁三升酒升半煮服下摸捐瘀血填骨髓長肌肉利大小便調經安胎又能殺蟲治心腹急痛。生蓋四兩炒熟暴傷折變証百出至死不悟豈不惜哉大抵血虛固不可專補其性。丹溪曰產前當清熱養血為主。後宜大補氣血為主。雖肝竅目得血而主產後宜大補氣血為主。雖其

平補肝腎
濡精

補肺腎理筋骨

何首烏



如考扶服之成地仙。凡使赤白各半牛泔浸竹刀刮皮切片用黑豆與首烏拌勻鋪柳甄入砂鍋九蒸九晒用茯苓為使。

忌諸血無鱗魚萊菔峻蒜鐵器。唐時有何首烏者祖名能嗣父名延秀能嗣五十八尚無妻子服此藥七日而恩人立何首烏傳然流傳雖久服者尙少明嘉靖初方士邵應節造七寶美髯丹世宗服之連生皇子遂盛行於世方用赤白首烏各一斤黑豆拌九蒸晒挾苓半斤乳拌當歸杞菟絲各半斤俱酒浸牛膝半斤酒浸同首烏第七次蒸至第九次破故紙四兩黑芝麻炒蜜九並忌鐵器昂櫈地黃何首烏皆君藥也故六味丸以地黃為君七寶丹以何首烏為君各配合未可同類而共施也即有加減當各依本方隨病而施損益今人多以何首烏加入地黃丸中合兩方而為一方是一方二君安所適從乎失製方之本義也地黃功重補腎首烏功兼滋肝故並以治風濕。

漏伏火而

牡丹皮



辛甘微寒入手足少陰心厥陰心包濁血中伏火。

心厥陰心包濁血中伏火。色丹故入血分時珍曰伏火即陰火也世人多以黃柏治相火。

不知丹皮之功更勝和血涼血而生血。

血熱則枯破積血。積瘀不去則通經脈為吐衄必。

故仲景腎氣丸用之。

用之藥所逼故越出上竅。

火治中風五勞驚癇癲癥口眼喎斜卒然眩仆吐涎身軟時發

時止為痛皆陰虛血熱風火相搏痰隨火湧所致。

除煩熱療癰瘍血下包胎退無汗之骨蒸汗之骨蒸汗之骨蒸地骨皮治無

有汗之骨蒸神不足者手少陽志不足者足少陰故仲景腎氣丸用丹皮治神氣不足也按內經云水之精為志故腎藏志火之精為神故心藏神貝母茺蔚大黃忌蒜胡荽伏硫川利人所罕悟宜分別之。

苦溫補腎辛溫補肝能宣通血脉而理筋骨主傷中補不足。

經疏云味暖子宮縮小便破甘故然。

瘀血治腰痛胎漏崩帶遺精腸風血痢。

是舊方平胃散一兩川續斷二錢米飲下治時痢亦驗癰痔腫毒。

又主金瘡折跌止痛生肌女科外科需為上劑。

川座良狀如雞脚皮黃敏節即斷者真去向裏硬筋酒浸用地黃為使。

斷續



苦堅腎溫補肝甘益血濡收斂精益髓養血祛風治風先治血活則風散強筋骨烏髮髮名烏令人有子為滋補良藥氣血太和則勞瘦風虛崩帶瘡痔癰瘍腫諸病自己營血調消赤者外科止惡瘡益陰補肝瘡疾要藥而本草不言治瘡時呼為瘡帝珍曰不寒不燥功在地黃天冬諸藥之上。

有赤白二種夜則藤交



一名羌活
通行瘀血
生新血

骨碎補

辛微苦寒。入手足厥陰。心包消水行血。去瘀生新。調經解毒。瘀血去。則經調。治血風。血運血痛。血淋。胎痛。產難。崩中。帶下。崩於腰間病生於此故名為帶赤屬血。白屬氣。氣虛者為經產良藥。消腫乳癰。瘀解毒通。

益母草



六日採益母根葉花實為末。塞九治胎產百病。近效方。搗汁熬膏亦良。

血順氣逐風。氣行則血行者有補。治心煩頭痛。熱之候。胎產帶崩。令人有子。有補陰之益。母根葉花實皆可同用。若治瘡腫胎產。消水行血則宜並用。若治血分風熱。明日調經用子為良。蓋根葉花實專於行子。則行中有補也。產醫濟陰。近魏丹小暑端午或六月。

益母子。主治略同。調經益精明目。血漏病目。活大小便。然辛散之藥。瞳子散大者忌服。

忌鐵子微炒用。

通行血消水

蘭



苦泄熱。甘和血。辛散鬱。香舒脾。入手太陰厥陰。肝通九竅利關節。養血氣。長肌肉。破宿血。調月經。消癰痕。散水腫。防已。治產後血滯。腰痛。瘀行。止吐血。鼻血。目痛。頭風。癰毒。撲損。補而不滯。行而不峻。為女科要藥。古方澤時珍曰。蘭草澤蘭一類二種。俱生下濕紫莖。素枝。赤節綠葉。葉對節生。有細齒。但以莖圓節長葉光有歧者為蘭草。並微。方節短葉有毛者為澤蘭。嫩時並可接。而佩之。楚詞所謂紵秋蘭。以為佩是也。朱文公離騷辨註云。必花葉俱香。燥溫不雙方可佩。吳人佩今之蘭蕙花雖香。而葉無氣。庸弱易萎。不可佩。佩。則蘭蕙花雖香。而葉無氣。庸弱易萎。不可佩。陳氏謂之蘭或以為都梁香。或以為澤蘭。或以為脩蘭。當以澤蘭為正。今之所種如麥門冬者。名幽蘭非真蘭也。故陳止齋著益蘭說以訊之。既名幽蘭。正合。

善溫補腎。故治耳鳴。耳鳴由腎虛。又渴。研末入猪腎煨熟空心食之。腎主二腎。腎主骨。故治折傷。以功命名。粥和傷處。經曰。腎主牙痛。炒黑為末。擦入血行傷故治折。入血行傷。故治折。根似薑而扁長。去毛用。或蜜拌蒸。傷粥和末。裹傷處。根似薑而扁長。去毛用。或蜜拌蒸。

葉

艾

山茱萸



小

微白



苦鹹而寒。陽明衝任之藥。利陰氣。下水氣。王中風。身熱。支滿。忽不知人。陰虛火旺則內

均故身熱支喘。痰血吸汗出過多。血少陽氣獨上氣塞不行而厥婦人尤多此證。熟。淋。溫。隨火湧故不知人。寒熱作則營氣不婦人傷中淋露。不知時白微引藥等分酒調服。丹溪曰。

此即河間所謂熱甚延孔機結神無所產虛煩嘔。仲景安中益氣竹皮丸用之經說曰。依不能收禁之意也。延孔女人漏孔也。益似牛膝而短小柔軟去鬚酒洗用。惡大黃大戟。

於血熱血少而其源起於真陰不足陽甚而內熱故營血日枯也。益

苦辛生溫。熟。純陽之性能回垂絕之元陽。通十二經。走三陰。太少理氣血。逐寒濕。暖子宮止諸血。溫中開鬱。調經安胎。胎動腰痛。下血。腹艾湯良。治帶腹痛。冷刺霍亂轉筋。皆理氣血。通。殺蛇治瘡。阿膠艾葉煎服亦治虛痢。治吐衄崩帶。要药。腹痛冷刺霍以之。火能透諸經而治百病。血熱為病者禁用。灸火則氣下行入熱則熱上衝不可。

透劑。丹田氣弱膀胱冷者以熟艾燶。外科有用乾艾作湯。投白藥二三錢。洗瘡然後傅药。寒濕之效。殺蛇治瘡者。蓋人血氣冷必假艾力以佐陽而艾性又能殺虫也。

附錄經言古之蘭草即今之千金艸俗名孩兒蘭者今之所謂蘭其葉如茅者根名土蟠斷因花梗故得蘭名楊升菴云世以如蒲萱者為蘭九畹之受証也。久矣。又吳草廬有蘭說云蘭為醫經上品有根有莖草之說云蘭為醫經上品有根有莖草漏於流俗反以舊說為非大醫經為寃用豈可誣哉。今之蘭果可以利水殺蟲而除疫疾乎。其種盛於閩朱子閩人豈不識其土產而辨析若此世俗至今猶以非蘭為蘭何以惑之甚也。昂按朱子辨蘭後難驗絲佩以為証。窈謂紓佩亦驗人風致之詞耳。如所云飲木蘭之葉。露養秋製之落英。豈真露可飲而陰可餐乎。又云芝荷以為衣。集芙蓉以為裳。豈真芝荷可衣芙蓉可裳乎。宋儒釋經執泥恐未可為定論也。第強經既言秋蘭則非春蘭明矣。本經既言澤蘭則非山蘭明矣。是離騷之秋蘭當屬本經之澤蘭是也。然離騷不嘗曰春蘭乎。秋菊乎。不又曰結幽蘭而延於乎。不又曰疏石蘭以為芳乎。若秋蘭既屬之澤蘭將所謂春蘭秋蘭石蘭者又不得為山蘭當是何等之蘭乎。且山蘭為花中最上之品。古今評者列之梅消之前。今反屈於孩兒菊之下以為逾翼其名。世間至賤之草皆收入本草。獨山蘭清芬佳品。擴棄不錄。何其不幸若是之甚也。本草殺蟲之药良多。皆未必有驗。至於行水消癰固山蘭之葉力所優為者也。蓋李時珍陳方吳楊輩皆尼定陳載器以澤蘭為一類。二種。遂併驗經而疑之。崇澤蘭而黜山蘭。遂令澤草無復有用之者。不思若以為一類。則本經蘭草一條已屬重出。何以本經蘭草反列之上品。而澤蘭止為中品乎。況一入氣分。一入血分。迥然不同也。又驗經言蘭者凡五條。本蘭人所共識。其餘春蘭秋蘭幽蘭石蘭。若皆以為孩兒菊是不特二類一種。且四類一種矣。而以為九畹之受誣。豈理也哉。蓋本經言澤蘭所以別乎山也。言蘭草明用葉而不用其花也。驗經言秋蘭所以別乎春也。言石蘭所以別乎澤也。愚謂秋蘭當漏澤蘭而春蘭石蘭定是山蘭。其曰幽蘭則山蘭之別名以其生於深山窮谷故也。扈氏集氏之論又安可全非也。姑附愚說以諮詢多識之士。

宣活血利氣

古名紅藍潤燥花通行水

延胡索

紅花

萬草

紫草

腸熱滑

溫血

甘鹹氣寒入股陰血分。心涼血活血利九竅通二便。誠寒治心腹邪氣。即熱性滑治心腹邪氣也。水腫五疸。瘡癰惡瘡。血熱所致及痘瘡血熱毒盛。二便閉瀉者。血熱則毒閑得紫草之涼則血行而毒出。兒脾寒者可用脾虛者反能作渴。古方惟用草取其初得陽氣以類觸類用發痘瘡令人不違此理用之誤矣。渴者忌用去頭鬚酒洗。

忌鐵

色赤入營氣溫行滯味酸走肝。而鹹走血。本經入厥陰血分。心包能行血止血。能行經入能止。消瘀通經。通經一兩治風癱黃疽。痘有五黃痘。殺痘酒痘黃汗痘女勞痘。此皆虛亦不可以濕熱例治。當用四物。如柏壯其水。參木培其氣。隨證而加利濕清熱。為崩漏運樸損痔瘻瘡。血少者忌用。根可染絳。

通行水

日而蘇金匱有紅藍花酒云治婦人六十二種風

用養血多則行血過用能使血行。不止而覽吐未淨加桃仁紅花行之大抵鮮花宜止瘀血。宜行氣消腫止痛。凡血熱血瘀治經閉便難。血暈口噤胎死腹中。非活血行血不能下痘瘡血熱。言治痘喉瘡不通。又能入心經生心血。煩兼補益。藥為佐使。

俗用染紅併作胭脂。破以油胭脂傅之良。血生於心包藏於肝。屬於衝任。紅花汁與相類故治血病有產婦血閉而死名醫陸氏以

裝袋兜腹脚甚妙。寒濕腳氣亦宜以此夾入襪內。鮮者苦酒醋香附為使。艾附丸調婦人諸病。宋時重湯用艾自明成化來。則以斷州艾為勝。云灸酒塗一灸便退。蒙全發明以野艾為真。斯父雖香寔非艾種。

陳者良。接葛如棉謂之熟艾。灸火用婦人丸散醋煮搗餅。再為末用。入伏苓數片同研則易細。煎服宜。陳者良接葛如棉謂之熟艾。灸火用婦人丸散醋煮搗餅。再為末用。入伏苓數片同研則易細。煎服宜。

名紫威
熱

涼血

涼血

凌霄花 大小薊



甘酸而寒。入厥陰血分，能去血中伏火。破血去瘀，主產乳餘疾。崩帶癰瘍，腸結便血，閉淋悶。風痒血熱，生風之証。女科多用。孕婦忌之宜也。○肺癆有用之為君藥者，凌霄花為末和蜜，泛酒，服甚驗。

藤生花開五瓣，黃赤有點，不可近鼻，聞傷脣。

甘溫。大明曰：涼皆能破血下氣，行而帶補。治吐衄、腸瘻、女子赤白漏、安胎。涼血，小薊力微，能破瘀生新，保精養血，退熱補虛，不能如大薊之消癰毒。方一人冷氣入陰，橐腫滿疼，痛煎大薊汁服。

兩薊相似，花如梅。大薊莖高而葉皺，小薊莖低而葉不皺，皆用根。

名山楂

散瘀定

止血

三七地榆蒲黃

黃



甘苦微溫，散血定痛。治吐衄、血痢、血崩、血瘕、血癆、血崩、目赤、癰腫。暗磨塗即散，已為金瘡杖瘡要藥。枝時先服一二錢，則血不衝心。枝後傅之，去瘀消腫，易愈。大抵陽明厥陰血分之病，故能治血病。丹溪曰：小薊治下焦結熱，血淋本事。此藥近世始出，軍中恃之。從廣西山洞來者，略似白芨，地黃有節，味微甘，頗似人參，以末捲猪血中，血化為水者，真似菊艾而勁厚，有岐尖，並有赤梗。夏秋開黃花，蕊如金絲盤綻，可愛，而氣不香。根大有牛蒡味，甘極易繁衍。云是三七治金瘡折傷，血病甚效。與南中來者不同。

苦酸微寒，性沈而濡。本草未嘗言濡，然能收入下焦，除血熱，治吐衄、崩中、血虛、腸風隨風而見也。血瘀者，為臓毒，積久而發血，血痢。蘇仲曰：古方斷下多用之。冠宗曰：虛也。直前為近血，出腸胃，冀後為遠血，出肺肝。寒漏崩及初起者禁用。○蘇頌著本草經，似柳根外黑內紅，取上截炒黑，用梢皮行血，得良惡變。

甘平，破陰血分藥。肝生用性滑，行血消瘀，通經脈，利小便，祛心腹膀胱寒熱。同五靈脂，氣痛名療，摸打損傷，瘡瘍諸腫。一婦舌脹渴口，以蒲黃、燈心、晚乃愈。宋度宗腹脈滿口失笑，散瘀摸打損傷，瘡瘍諸腫。御醫用蒲黃、乾薑木等分，擇之愈時珍曰：觀此則蒲黃之涼血活血可知矣。蓋舌為心苗，心包相合，乃其日使得乾薑是陰陽相濟也。炒黑，性濡止一切血崩、帶泄精。香蒲花中慈屑。

生用破血
灸用止血

湯成入藥。
生用辛平。破血通經。治癰瘍淋結。灸用辛溫。止血。治腸風脫肛。生石上。拳掌如雞足。俗呼萬年松。凡使鹽水煮半日。井水煮半日。焙用。

卷

柏

漏破血

內經同烏鵲骨根如茱萸皮黃肉白

辛寒有小毒。蝕惡肉。排膿血。殺疥蟲。除熱痺。破癰瘍。葉長微闊。折之有汁。結實如豆。一顆三粒。甘草為使。

蘭 茄



潤行水散

蘭子



苦辛微寒。別錄微溫。入肝經。血分。行水散血。散中有補。治陽痿經濶。腰膝骨節重痛。產後血氣作痛。閃剎折傷。撲打方多用之。能制蛇。見之。爛葉似菊。而薄莖似艾。而粗淡。意為使。

金鬱



辛苦氣寒。純陽之品。其性輕揚上行。入心及包絡。薰入肺經涼心。熟散肝鬱。下氣破血。行滯氣亦不損正氣。氣破瘀血。亦能生新血。治吐衄。尿血。婦人經脈逆行。經不下行。上為吐衄。諸証用鬱金末加韭汁。薰汁。童便服。其血自清。瘀中帶血者。如竹懸。血氣諸痛。產後敗血攻心。顛狂失心。癥瘕塞於心竅。所致。鬱金七兩。白礬三兩。米糊丸。服名白金丸。鬱金入心散。惡血明礬化豆。毒入心。血五七滴。新汲水下治斑豆。始有白泡。忽擣入腹。紫黑無膿。下盡。痘毒同升麻服。出川廣體銳。圓如蟬肚。外黃內赤。色鮮微香。味苦帶甘者真。市人多以藍黃為之。

宣行氣解
鬱悶泄血
破瘀

瀉破血行

薑

黃

瀉破血行
氣消積

義

何魏山查化肉食紫蘇化魚蟹毒葛花枳根消酒積果積芫花牽牛大戟行水飲三棱莪遂鱠甲消雖為泄劑亦能益氣。王好古曰故治氣短不能接續大小便入氣或醋磨酒磨或煮熟用入血分。

辛苦氣溫入肝經血分破氣守之。能通肝經聚血消瘀通經閼胃化食解毒止痛治心腹諸痛。冷氣吐酸奔豚痃癖辟酒醋磨服瘀音腎小腹結症瘕多見於男子癥瘕多見於婦人莪遂上至心下肝積曰肥氣在左腸肺積曰息貴在右膀脾積曰痞氣在胃腕右側腎積曰奔脈在小腹上至心下治之不宜專用下藥恐損真氣宜於破血行氣藥中加補脾胃藥氣旺方能磨積正旺則邪自消也。經曰大積大聚其可紀也。哀其大半而止過者死東垣五積方用三棱莪遂皆熟人參贊助成功按治積諸藥神麌麥芽化穀食茱萸化麵食硇砂。

此藥可療癰瘕消腫止痛通乳墮胎功近香附而力峻虛者慎用。色黃體重若鯽魚根如生薑莪生根下似卯不齊堅硬難搗从火煨透乘熱搗之。

苦平色白屬金。皮黑入肺金血分破血中之氣亦通肝兼入脾經散一切血瘀氣結瘡硬食停老塊堅積乃堅者削之從血藥則治血從氣藥則治氣須輔以健脾補氣藥良昔有稜柄消成水乃知消腫止痛通乳墮胎功近香附而力峻虛者慎用。色黃體重若鯽魚而小者良醋浸炒或麵裹煨。

甘寒入手少陰心足太陰陽明。牌補中益氣除伏熱消瘀血利小便鮮酒毒治吐衄諸血心肝火旺逼血上行則吐血肺火盛則衄血茅根甘和血寒涼血引火下降故治之。撲搗瘀血搗十服名華花湯亦治鼻衄產淋。血閉寒熱則寒熱作矣淋崩中血熱傷寒噦逆即呃逆說文曰噦氣接也。東垣作乾嘔之甚者本是肺熱喘急內熱煩渴黃疸水腫消火

瀉火補中
止血止噦

瀉行氣破
血消積

荆三稜白茅根



本草大明

苦辛

品

色黃入脾入肝經理血中之氣下氣破血除風消腫功力烈於鬱金入臂治痛其兼理血中之氣可知

出川廣不同所用各別經疏曰薑黃主治介乎三棱鬱金之間時珍曰入肝治氣中之血稍為不同今時以扁如乾薑者為片子薑黃圓如蟬腹者為蟬肚鬱金並可染色遂形雖似鬱金而色不黃也

時珍曰良藥也。世人以微而忽之。惟事苦寒之劑。傷冲和之氣。烏足知此哉。

茅錢潰癰瘍

酒煮服一錢。二孔孔二錢。潰二孔。

渴熱止嘔

蘆

根

甘益胃。寒降火。治嘔噦反胃。胃熱火升則嘔。逆食不消渴。客熱傷寒內熱。止小便數。肺為上源。脾氣散精上歸於肺。始能通調水道。下輸膀胱。腎為水臟。而主二便。三經有熱。則小便數。甚至不能少忍。火性急速。故也。蘆中空。故入心肺。清上焦熱。熟解則肺之氣化行。而常道矣。

能解魚蟹河豚毒。取逆水肥厚者去鬚節用。

渴熱散瘀

蘭

根

苦寒而滑。補陰破瘀。解熱潤燥。治天行熱疾。太渴大狂。胎動下血。諸淋血淋。搗貼赤游丹毒。癰疽。痘瘡。癩。發背。金瘡折傷。止血。雞魚骨哽。搗如龍眼。雞骨魚湯。下魚骨魚湯。下汁能化血為水。蘭皮與產婦作枕。止血暉。安腹。上止產後腹痛。散瘀。滌心。汗。療消渴。

渴熱散瘀

薑

根

微澀而冷。入胃大腸經。除風熱。濕熱。生肌殺虫。治泄痢。消渴。牙痛。瘻。含漱。遺尿。好眠。癰疽。瘡。癩。花有紅白。黃紫數色。以黃心白色粉紅者入約子。名營實。酸溫。主治略同。千金薑根角。萬口瘡之神藥。角薑所在多有聞。說紅紫花角。微彎長二寸許。辛苦有小毒。治惡瘡。有虫及口齒痛。

渴熱

芭蕉

根

味甘大寒。治天行熱。狂煩悶。消渴。後血脹。並搗塗難腫結熱。為末油調。博

大渴血分
濕熱下有
形滯滯

大黃



大苦大寒。入足太陰脾手足陽明厥陰。心包肝血分其性。浮而不沈其用。走而不守。若酒浸亦能引至至高之分。仲景太陽門調胃承氣湯大黃註曰酒浸陽明大承氣湯大黃不用製皆有分別。東垣曰邪氣在上非酒不至。若用生者則遺至高之邪。用以瀉滯腸胃。下燥結而除瘀。執治傷寒時。

熱病愈後或目赤喉痺頭痛膈上熱疾生也。用以瀉滯腸胃。下燥結而除瘀。執治傷寒時。疾發熱譯語。語宜下之謠音占溫熱瘴癰下痢。赤白腹痛。裡急黃疸水腫。瘕瘕積聚。成形。

謂之積屬陰聚散無常謂之聚屬陽積多是血或食或痰聚多是氣留飲宿食。心腹痞滿二便不通。奪之吐血衄血。血閉血枯。損傷積血。一切寒熱血

中伏火行水除痰。蝕膿消腫。能推陳致新。然傷元氣而耗陰血亡陰若病在氣分。胃虛血弱人禁用。病在氣分而用之

垣曰能推陳致新如定禍亂以致太平所以有將軍之號。時珍曰仲景瀉心湯治心氣不足吐衄血者用大黃黃連黃芩乃瀉心包肝脾胃四經血分之伏火也。又治心下痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心火。又瀉脾胃之濕熱。非瀉心也。

病發於陰而反下之則痞滿乃寒傷營血邪結上焦胃之上脘當心故曰瀉心經曰太陰所至為痞滿又曰瀉脾胃之濕熱。非瀉心也。是謂誅伐無過東

垣曰生真服是已病發於陽而反下之則結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘故大搖胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃之氣邪而降其潤氣也。若謂胸在氣分只用小陷胸湯痞滿在氣分只用半夏瀉心湯或問心氣不足而吐衄何以不補心氣而瀉心丹溪曰少陰不足元陽無輔致陰血妄行故用大黃瀉其元之火又心本不足肝脾反受火邪而病作故用

黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之合也。肺火退則血歸心而自安矣。寇宗奭曰以苦泄其熱就以苦補其心蓋一舉而兩得之。李士材曰古人用大黃以治虛勞吐衄意甚深微。蓋濁陰不降則清陽不生瘀血不去則

新血不川產錦紋者良有酒浸酒蒸生熟之不同。生用更峻。黃芩為使。欲取通利者不得。確進穀食大黃得穀食便

便血曰解寒痛忌用。凡腹痛有寒熱虛寒食積寒血殘濕之不同。寒宜溫熱宜清虛宜補寃宜下食宜消導瘀血宜行散。寃濕宜寒熱往來邪在少陽黃疸五淋血閉。

寃熱在氣逆糞瘡瘍及諸失血消瘦。丹溪以黃芩降痰假其降火利水解渴安胎。胎孕血分

熱涼血不養陰退陽補膀胱水酒炒則上行瀉肺火利胸中氣。肺主氣熱傷氣治上焦。妄行則胎安利火動當先降火。

之風熱濕熱。丹溪曰黃芩火嗽喉腥。五臟肺為腥。目赤腫痛過服損胃血虛寒中者禁用。得柴胡退寒熱得芍藥治崩得厚朴黃連止腹痛得甘草瀉太陽少陽合病下利黃芩湯少陽証下後心滿瀉心湯並用之。蓋

白木安胎之聖药時珍曰仲景治少陽証小柴胡湯太陽少陽合病下利黃芩湯少陽証下後心滿瀉心湯並用之。蓋黃連苦寒入心瀉火除脾家濕熱使胃火不流入肺不致刑金即所以保肺也。肺虛不宜者苦寒傷土損其母也。少陽証雖在半表半裏而心膈痞滿。寃上焦心肺之邪心煩善嘔默不欲食又兼脾胃中焦之証故用黃芩以治手足少陽相火。黃芩亦少陽药也。楊士瀛曰柴胡退熱不及黃芩時珍曰柴胡乃苦以發之散火之標也。黃芩乃寒能勝熱。

黃芩



調停止痛無厭

渴火燥濕

折火之本也。東垣治肺熱身如火燎燒藥引飲而盡者宜一味黃芩湯以潤肺經氣分之。大黃芩一兩煎服。本事方用治崩中暴下。熱內塞名條芩。即子芩。瀉大腸火。補膀胱水。上行酒炒瀉肝膽火。猪膽汁炒。山茱龍骨為使。畏丹皮丹砂。

黃

連



大苦大寒。入心瀉火。王海藏曰。瀉心寔瀉心。鎮肝涼血。凡治血防風為上部之使。黃連燥濕為中部之使。地榆為下部之使。燒濕言曰。下痢必先汗解其外。後調其內。首用辛涼以解表。次用苦寒以解裏。機要云。後重宜下腹痛。宜和身重。宜除濕脈。宜去風。風邪內結。宜汗。角冷自汗。宜溫。膿血稠黏。宜重劑。以竭之下。痢亦屬血分。白屬氣分。裁氏曰。俗云赤熱白寒者非也。通作瀉熱處治。但有新

久虛寔

瘧濕

瀉濕間鬱仲景治九種心腹痛。清心痛。伏梁。心目痛。瘡傷。入乳浸興或合鰥芍等。癰疽瘡疥。諸痛瘡痛。酒

之分

毒胎毒

小兒初生合甘州。傳信方羊肝一具。黃連一兩。搗定驚。鎮止汗。解毒。除疳。同豬肚殺蛇。就得苦寒虛為病

者禁用。

久服黃連苦參反熱從火化也。昂拔淡土作苦味。苦以燥燥則熱矣。且苦寒沈陰肅殺傷生和之氣也。韓愈

者禁用。

曰。黃連與肉桂同行能交心腎於頃刻時。珍曰。治痢用香連丸。薑連丸。黃連丸。黃連散。用黃連生薑左金丸。

用黃連吳茱萸治口瘡。用黃連細辛止下血。用黃連

大蒜一陰一陽。寒因熱用。熱因寒用。最得製方之妙。

火生用。

虛火。醋炒。肝膽火。猪胆汁炒。上焦火酒炒。心宜黃連。吳茱萸降火。開鬱。酢音醞。中焦火薑汁炒。下焦火鹽水或

童便炒。食積火黃土炒。治濕熱在氣分。吳茱萸湯炒在血分。乾漆水炒。點眼赤人乳浸。辛熱制其寒。苦鹹制其燥。性

用者

詳之。黃芩。龍骨為使。惡菊花。元參。殼蠶白蘚皮。畏數冬牛膝。忌猪肉。時珍曰。方有臘連丸。黃連

火佐以龍胆。瀉肝胆火。白芍瀉脾火。石膏瀉胃火。知母瀉腎火。黃柏瀉膀胱火。木通瀉小腸火。黃芩瀉肺火。梔子佐之。瀉大腸之火。黃連佐之。柴胡瀉肝胆之火。黃連佐之。瀉三焦火。黃芩佐之。鄭真一曰。熱鬱至心。兀兀欲睡。用黃連數分

基效

胡黃連

渴熱瘡篤

效

苦寒去心熱。益肝膽厚腸胃。治骨蒸勞熱。五心煩熱。心窩手三消渴。而多飲為上消。肺熱

消是也。多食善飢為中消。胃熱也。痺成為消中。五痔。牝痔。牡痔。肺痔。腸痔。痔下流是也。渴而小便數有膏為下消。腎熱而水虧也。

腫溫瘡澆。女人胎蒸。消果子積。為小兒驚癇良藥。

朱二丸曰。鮮吃柑。毒合茶服之。甚效。

性味功用同黃

連。故名之。出波斯國。在今秦龍南海亦有之。其心黑外黃。折之塵出如煙者。真異惡同。

火燥濕
補陰

苦

參

火大補水

知母

肝膽火
佳溫熱

龍膽草

黃連

苦燥濕。寒勝熱。沈陰主腎。補陰益精養肝胆。安五臟。平而五臟自安。利九竅。生津止渴。

明目止渴。火為溫病血痢。純下清血者。肝風傷也。宜散風涼血藥。風濁亦黃疸酒毒。熟攻火而增氣物化之常也。氣增而火灭之由也。王冰註曰。氣增不已則膿有偏勝。偏勝則其七常毒治病去其八無毒治病去其九。穀肉果菜食養盡之無便過之傷其正也。按人參補脾沙參補肺紫參。

補肝丹參補心元參補腎。告參不在五參之内。然名參。糯米泔浸。腥蒸用。元參為使。惡貝母。菟絲子。漏蘆。苦参。皆補口药能治病。不能養人。食能養人。不能治病。一兩或酒煎。或醋煮。能吐天行時毒。○子名鴉胆子能治久痢。

辛苦寒滑。上清肺金而瀉火。火大清金滋水。火熱則腎水。火之用相火。火非清火。火之用相火。下潤腎燥而滋陰。入二經氣分。黃柏入二經必相須而行。消痰定嗽。止渴安胎。莫非清火。火之用相火。火之用相火。治傷寒煩熱。勞虛骨蒸。退有汗。躁有熱。有濕。有氣結。於下。宜清。宜燥。宜升。又有隔。二隔。三之治。如肺不燥。但膀胱熱。宜瀉膀胱。此治。如因脾濕不運。而精不上升。故肺不能生水。則燥胃健脾。此隔三之治。治而不得便。閑也。然苦寒傷胃。而滑腸。多服令人瀉。李士材曰。苦寒瀉。非長養之藥。易損人。則如水益深矣。持表出以為戒。得酒良。上行酒浸。下行鹽水拌。忌鐵。

大苦大寒。沈陰下行。益肝膽而瀉火。火相火。寄於肝膽。有溼無補。兼入膀胱。腎經除下焦之火。瀉其邪熱。即所以補之也。濕熱與防已同功。酒浸亦能外行。上行治骨蒸。寒熱。骨蒸主驚癇邪氣。肝經風火。時氣溫熱。熟瘡黃。寒濕脚氣。足傷濕熱。則成脚氣。腫而痛者。為湿脚氣。宜清熱利濕。搜咽喉風熱。赤睛。黃。黃肉。瀉肝胆火。龍目元素曰。紫胡為主。龍胆為使。癰疽瘡疥。遇服損胃。甘草水浸一。



齒肉。瀉肝胆火。龍目元素曰。紫胡為主。龍胆為使。癰疽瘡疥。遇服損胃。

甘草水浸一。日疾要藥。昇按。若目疾初起。宜發散。忌用寒涼。癰疽瘡疥。遇服損胃。

甘草水浸一。