

續

名

醫

類

案

第二

S28

1786

1P2



續名醫類案卷二

錢塘魏之琇編集

海昌王士雄孟英
定州楊照藜素園

同校

中寒

萬密齋治一婦人病至十三日其家人來求藥告以病狀初
苦頭痛到今十日昏睡不醒喉中痰響手足俱冷其身僵
直萬思之時辛酉二月朔後平地雪尺餘此婦元氣素弱
必因遠行而得三陰脈從腹下走足也問之果於初三日冒雪往親
戚家歸卽病曰此寒邪中足少陰厥陰二經也默默喜睡

者足少陰腎病也。頭苦痛厥逆僵直痰響者足厥陰肝病也。乃以十全大補湯去地黃白芍加細辛半夏乾薑與劑去五日來謝曰病安矣。

吳季先治一人傷寒頭痛不發熱乾嘔吐沫醫用川芎藁本

不應。吳曰此厥陰中寒之症乾嘔吐沫厥陰之寒上干於胃也。頭痛者厥陰與督脈會於顛寒氣從經脈上攻也。用人參大棗益脾以防木邪。吳茱萸生薑入厥陰以散寒邪。且又止嘔。嘔止而頭痛自除。設無頭痛又屬太陰而非厥陰矣。

陰矣。

直中病但有少陰症反發熱

一人患厥陰直中四肢厥冷脈細欲絕爪甲青紫但不吐利



與四逆湯至三日四肢暖甲紅發熱脈轉實數有力此陰
極陽生也使與涼劑病家疑一日寒溫各異不肯服至九
日熱不退熱利下重飲水不輟再求診用白頭翁秦皮黃
連黃柏各二錢一帖減二帖痊

真寒症斷無飲水下痢之變

按肢冷脈伏恐是陽厥至爪甲青紫則是欲戰汗也四
逆湯之悞特隱而不彰耳余有凌二官案可參

凌二官即熱病

門之凌表姪

吳孚先治汪掖蒼母忽心腹奇痛異常左右脈弦緊用二陳
去甘草加肉桂乾薑木香病不減次日寒熱交作往來如
瘧熱已復寒寒已復熱晝夜無度脈轉疾數前方加人參



中醫藥大學圖書館藏

五錢附子二錢不應復增參至一兩附子至五錢服反漸脫吳謂少陰中寒當與參附今不效畢竟病深藥淺之故時有醫者四人一欲用枳實貝母一欲用全蝎防風一欲用八味丸一欲用人參黃耆各八分肉桂四分附子三分吳曰業已泄瀉反用枳實虛極汗多反用全蝎此二人全不知病八味丸係調理之藥尚在末著參耆桂附庶幾合症但盃水車薪曷克有濟夫用藥如用兵衝堅搗厚非猛士多多不可李信之敗可鑑也用耆四兩煎湯代水人參四兩附子二兩煎膏時病人面色如粧汗出如珠六脈俱脫呼吸全無牙關緊閉幸太谿脈尚在乃以箸抉齒灌半

鐘移時又進半鐘。猶防脈之暴出也。既而重按兩尺隱躍指端。乃曰。脈漸出。大有起色矣。復進半鐘。自午至晚。方眼開語出。欲啜粥。已而反畏寒。喉痛。頻索冷水。或疑是水曰。畏寒者真情。索冷者假象。少陰脈循喉嚨。邪客其絡。令人咽痛。今寒邪由臟出經。病將退耳。仍前方加桔梗甘草而痛止。自後每日參必一兩。附必三錢。調理百日而愈。愈後遍體發疹。夾生疙瘩。奇痒異常。爬搔不輟。不寐汗多。用六君子另將黃耆二兩煎湯煮藥。十日不應。汪檢準繩風疹門與閤俱係風藥。並無補方。曰神而明之。存乎其人。不可泥也。仍守前方。數劑霍然。

卷一百一十五

馬元儀治陸濟臣患症甚篤診之兩脈虛微自汗厥逆面青唇青呃逆不止此少陰真陽素虧寒邪直中之候也陰寒橫發上干清道旁逆四末甚爲危厲兼以自汗不止虛陽將脫法當用桂附理中湯以消陰攝陽陽既安位則羣陰畢散矣是夜連進二劑脈漸起汗漸收五六劑症始霍然吳泮治結林潘氏子始強蚤起有事牖下尋病作頭痛惡寒諸飲食自鼎沸中致之不盡三之一其一以爲寒矣卽人嘗之莫不糜爛彼口舌自如當暑衣重裘猶以爲薄眾醫累治不效乃迎泮泮曰病由下虛病寒氣深入固結不散法當不治卽幸而可治不出三年尋以溫補劑愈之參附

輒倍他藥其後復病而卒終三年

太函集

寶材治一人患肺傷寒

名別

頭疼發熱惡寒咳嗽肢節疼脈沉

緊服華蓋散黃耆建中湯畧解至五日昏睡譫語四肢微厥乃腎氣虛也灸關元百壯服薑附湯始汗出愈

一人傷寒昏睡妄語六脈弦大實曰脈大而昏睡定非實熱乃脈隨氣奔也強爲之治用烈火灸關元穴初灸覺痛至七十壯遂昏睡不痛灸至三鼓病人開眼思飲食令服薑附湯至三日後方得元氣來復大汗而解

一人患傷寒至八日脈大而緊發黃生紫斑噫氣足指冷至腳面此太陰症也最重難治爲灸命關五十壯關元二百



壯服金腋丹鍾乳粉。四日汗出而愈。

一人患傷寒至六日。脈弦緊。身發熱自汗。太陰症也。先服金液丹。點命關穴。病人不肯灸。傷寒惟太陰少陰二症。傷人最速。若不早灸。服藥無功。不信。至九日瀉血而死。

一人傷寒至六日微發黃。一醫與茵陳湯。次日更深黃色。遍身如梔子。此太陰症。誤服涼藥而致。肝木侮脾。爲灸命關五十壯。服金液丹而愈。

一人患傷寒初起。卽厥逆。脈一息八九至。諸醫以爲必死。實曰乃陰毒也。

厥逆脈數斷爲陰毒。必有爪青吐利。踈臥等症。

與薑附湯一盞。至半

夜汗出而愈。若以脈數爲熱而下涼藥。必死無疑。



中風

黃帝問岐伯曰中風半身不遂如何灸答曰凡人素中風一兩月前或三五月前非時足脛上忽痠重頑痺此中風之候急灸三里絕骨四處三壯後用薄荷葱桃柳葉煎湯淋洗驅逐風氣於瘡口中出灸瘡春較秋灸常令兩腳有瘡為妙凡人不信此法飲食不節酒色過度忽中此風言語蹇澁半身不遂宜七處齊下火灸各三壯風在左灸右在右灸左百會耳前髮際肩井風市三里絕骨曲池七穴神効不能具錄依法灸之無有不愈

醫說續編論

徐平中風不省得桃源主簿為灸臍中百壯

即神闕穴多灸良凡灸先以鹽

實之

始蘇更數月乃不起鄭糾云有一親表中風醫者為灸

五百壯而蘇後年八十餘使徐平灸三五百壯安知其不

永年耶同

范子默自壬午五月間、口眼喎邪、灸聽會等三穴、卽正、右手足麻無力、灸百會、髮際等七穴、愈、次年八月間、氣塞、涎上不能語、金虎丹、臍粉服至四九半、氣不通、涎不下、藥從鼻中出、魂魄飛揚如墜江湖中、頃刻欲絕、灸百會、風池等、左右頰車、共十二穴、氣遂通、吐涎幾一碗許、繼又十餘行、伏枕半月餘、遂平、爾後又覺意思少異於常、心中憤亂、卽便灸百會、風池等穴、立效。

本事方云、十二穴、謂聽會、頰車、地倉、百會、肩髃、曲池、風市、足三里、絕骨、髮際、大椎、風池也、用之立效。同

鄉里有人忽覺心腹中熱甚急投藥鋪說其狀鋪家以爲此
中風之候與治風藥而風不作予中心藏之至夷陵見一
太守夏中忽患熱甚不免以水灑設簟臥其上令人扇之
次日忽中風數日而殂人皆咎其臥水簟上而用扇也暨
到澧陽見一老婦人夏中亦患熱夜出臥廳上次日中風
偶其子預合得小續命湯服之愈乃知中風由心腹中多
大熱而後作也

以上並
資生經

岳鄂鄭中丞頃年至潁陽日食一頓熱肉便中暴風外甥盧
氏爲潁陽尉有此方當時便服得汗隨瘥神效其方用紫
細牛蒡根取時須避風以竹刀或荊刀刮去土用生布拭

淨搗絞取汁一大升。和灼熱好蜜四大合。溫分爲兩服。每

服相去五六里。初服得汗。汗出便瘥。

本草同上

新武義唐承季潤名灌云。切記風中人。不可便服風藥。氣中

人。不可便服氣藥。或覺有此症候。急用真好麝香。肉三錢。

乳鉢研令極細。以真清麻油不拘多少。調令稀薄。可飲爲

度。卽令患人。一服頓盡。須辨菜子油。不可用。藥少卽見效。

遲如牙關緊。撬開灌入。甦省然後服紫湯。其方用川獨活

刷洗去沙土。薄片切。以豆淋酒煎濃汁服之。累服至一二

斤無害。服此二藥。永無手足偏廢。語言謬澁之患。後見得

是中風。只服小續命湯之類。見得是中氣。只須服勻氣散。

自然無事也。渠作漢東教官，得之太守張少衛云。屢試有驗。季潤亦以治數人矣。云麻油麝香煎五積散。是齊方同上

羅謙甫曰：按察書史李仲寬，年逾五旬，至元己巳春患風症。

半身不遂，四肢麻痺，言語蹇澁，精神昏憤。一友處一法用

大黃半斤，黑豆三升，水一斗，同煮豆熟，去大黃，新汲水淘

淨黑豆，每日服二三合，則風熱自去。服之過半，又一友云

通聖散四物湯黃連解毒湯相合服之，其效尤速。服月餘

精神愈困，又增瘖啞，不能言，氣冷手足寒。命予診視，細詢

前由，盡得其說。診之六脈如蛛絲，謂之曰：夫病有表裏虛

實寒熱不等，藥有君臣佐使大小奇偶之制。君所服藥無

考憑故病愈甚。今爲不救。君自取耳。未幾而死。有曹通甫
外郎妻蕭氏。六旬有餘。孤寒無依。春月忽患風疾。半身不
遂。語言蹇澁。精神昏慣。口眼喎邪。與李仲寬症同。予刺十
二經井穴。接其經絡之不通。又灸肩井曲池。詳病時月日。
處藥服之。減半。予曰。不須服藥。病將自愈。明年春。於張子
敬郎中家。見其行步如故。予歎曰。夫人病得全者。不亂服
藥之力。由此論之。李仲寬亂服藥。終於不救。蕭氏貧困。恬
澹自如。而獲安內經曰。用藥無據。反爲氣賊。聖人戒之。姚
雪齋舉許先生魯齋之言。富貴人有二事。反不如貧賤人。
有過惡不能匡救。有病不能醫療。噫。其李氏之謂歟。

陳自明治一婦人中風牙關緊急痰涎溢出與神仙太乙丹

一粒服之而愈。

方見
蠱門

宋時東京開河掘得石碑梵書大篆一時無能曉者真入林
靈素逐字辨繹乃是治中風方名去風丹也詩云天生靈
草無根幹不在土間不在岸始因飛絮逐東風汎梗青青
飄水面神仙一味去沉疴采時須在七月半選甚癱風與
大風些小微風都不算豆淋酒化服三九鐵鑊頭上也
出汗其法以紫色浮萍晒乾爲末煉蜜和丸彈子大每服
一粒以豆淋酒化下治左癱右瘓三十六種風偏正頭風
口眼喎邪大風癰風一切無名風及腳氣并打撲傷折及

胎孕有傷服過百粒即為全人此方後人易名紫萍一粒

丹。此與蒹葭草九相類亦惟實症可用虛者未必宜也本草綱目

許叔微云范子默記崇寧中凡兩中風始則口眼喎邪次則

涎潮閉塞左右共灸十二穴得氣通十二穴者謂聽會頰

車地倉百會肩髃曲池風市足三里絕骨髮際大椎風池

也依而用之無不效。醫學綱目

高評事中風頗緩張令涌之後服鐵彈丸在普濟加減方中

或問張曰君常笑人中風服鐵彈丸今以用之何也張曰

此收後之藥也今人用之於大勢方來之時正猶蚍蜉撼

大樹不識次第故也