

霍亂

癲狂

譫妄

增尸症等疾

循衣摸床

顫振

不得卧

多卧

怠惰嗜卧

不能食

傷勞倦

虛勞

傳尸勞

金匱啟鑰 第十冊

漉江黃朝坊妙山輯著

內經有云。大陰所至爲中滿。霍亂吐下。土鬱之發。民病霍亂。嘔吐有
歲土不及。風乃大行。民病霍亂。飧泄有熱。至則身熱。霍亂吐下。是霍
亂無不病於吐下。其証心腹卒痛。嘔吐下利。憎寒壯熱。頭痛眩暈。先
心痛則先吐。先腹痛則先利。心腹俱痛。吐利並作。甚則轉筋。入腹則
危。蓋陰陽反戾。清濁相干。陽氣暴升。陰氣頓墜。陰陽痞悶。上下奔迫。
此大易之否象也。然此疾多生夏秋之交。縱寒月有之。亦多由伏暑
而致病之作也。必先腹痛。或痛而上吐。或下瀉。吐瀉之後。甚則轉筋。
此兼風也。手足厥冷。氣少唇青。此兼寒也。身熱煩渴。氣粗口燥。此兼

暑也。四肢重痛，此兼濕也。通宜以藿香正氣散。兼風則加柴胡桂枝。兼寒則加肉桂干薑。甚加附子。兼暑則加香薷石羔。兼濕則加蒼白。二朮。風暑合病，宜理中湯加石羔。暑濕相搏，宜二香散。如盛夏中暑霍亂，上吐下瀉，心腹作痛，大渴煩燥，四肢逆冷，汗自出而腳轉筋，宜香薷飲。或桂苓白朮散亦妙。但人有三焦，上焦主入水谷，中焦腐熟水谷，流行於臟腑，下焦分別水谷，主出。今邪在上焦，脾胃不能受，故隨氣從上逆出，則爲吐。治宜平胃散。或溫胃飲。邪在下焦，從下而出，則爲瀉。用五苓散。邪在中焦，則吐瀉交作，宜理中湯加藿香砂仁茯苓。

滿隔絕上下遂成霍亂用六和湯倍藿香煎熟調蘇合香丸有七情
鬱結五臟六腑互相刑剋陰陽不和吐利交作七氣湯有霍亂轉筋
者其足腹之筋拘攣急痛甚至牽縮陰丸蓋因胃氣暴傷以致足陽
明厥陰血燥筋攣法宜養血溫經若四肢厥冷須臾不救宜吳茱萸
湯或理中湯加當歸木瓜肉桂厚朴若兼陰虛加熟地或理中湯去
朮加生附子千金法男子以手挽其陰女子以手揪兩乳大凡霍亂
猝發無藥設外法以吐瀉之則邪從上下出斯無苦也此尙邪不勝
脾胃得傳出吐瀉以解猶無虞也獨有上不得吐下不得瀉者名乾
霍亂又名絞腸痧其病因脾胃之邪無從而出若加喘滿作搐十不

救一連用鹽湯探吐之必吐出宿食積痰或以針刺十指甲邊令其
出血或刺臍灣名委中穴出血即解后用藿香正氣散有吐利不止
者元氣耗散病勢危篤或水粒不入或口渴喜冷或惡寒戰掉手足
逆冷或發熱煩燥欲去衣被此蓋內虛陰盛而陽絕症也不可以其
喜冷欲去衣被爲熱而妄投寒涼以速之斃宜用附子理中湯不效
則宜急用四逆湯但十分冷服恐其初相拒也霍亂吐瀉已定后作
胸膈高起痞塞欲絕又宜理中湯加枳實如霍亂已愈煩熱多渴小
便不利小麥冬湯若惡心懶食口渴宜白朮散霍亂后下利見血宜

名氣入胃助胃邪故也。倘輕與之死立見矣。如吐瀉已定過度多時宜以稀粥漸漸補養以遲為妙。醫者切宜銘心記之。

証治歌一

霍亂多生秋夏天。燥煩吐瀉痛顛連。上焦邪客定生吐。邪在下焦瀉必然。邪在中焦吐復瀉。三焦治法莫混牽。風寒暑濕須分辨。加葯隨症自安痊。通用藿香正氣散。兼風甚則轉筋焉。加入柴胡桂枝風自愈。乾薑附肉桂治寒兼。兼暑燥煩身熱渴。香薷更取石膏研。四肢重着是兼濕蒼朮白朮加入病旋蠲。風暑合恙別有以。理中湯入石膏堅。若因暑濕兩相搏。散用二香莫舍梅。霍亂暑天腹作痛。渴煩手足

治如與轉筋汗出香薷飲或用桂苓白朮散煎上焦逆吐宜平胃散

飲號溫中亦弗誤下焦瀉用五苓散邪在中焦吐瀉全治宜理中湯

可好加入香西砂茯苓妍飲冷乘風成痞滿六和湯好不宜偏煎

調蘇合香丸美薺結七氣湯服無愆霍亂轉筋治有法吳茱湯服有

奇緣理中加入當歸肉桂厚朴木瓜並下咽陰竭更宜加熟地外有

治法古人傳挽陰男法女揪乳探吐或行刺血滑法詳后歌燥渴惡寒

凡戰掉熱煩喜冷欲衣損肉虛陰盛陽衰証附子理中湯用必先不

文參和口生湯少一入介及三五三

救壽命延霍亂愈後食和血石脂湯進獲安眠

証治歌二

霍亂忌投熱物。將米湯一瓠命旋亡。吐停瀉止。胃氣復。稀粥投之。始

不妨吐甚勢危。難納藥。陰陽湯服勝瓊漿。以新汲水百沸和。凉水一半兌服。悞咽毒

物或停食阻塞。腹痛苦異常。急以鹽湯命頓服。食痰吐盡。病無殃。法

治吐瀉均有效。豇豆糊椒廿一囊。研末水蒸煎。亦可渴頻新汲水調。

嘗若乾霍亂。症疾非異。卽是世俗號絞腸。一兩食鹽。生薑減半。鹽須

炒黑或深黃。濃煎斟以大碗飲。倏爾安寧。自免傷。時久手探喉。一吐

不能吐瀉苦難當。陰陽痧病勢還急。腹痛難堪手足涼。冷如冰。身有點

紅可細看。燃燈紅點。燂安康。依斯治。奏效應速。別有奇方。亦莫忘手。
足溫。將患手臂。令人按。下力推強。令其惡血。指頭聚。十指針刺。近甲。
臧。韭菜大如針。此處一流惡血。卽平安。發痧肢厥。用溫水。病人宜伏。
眠在床。以手蘸水。拍膝灣處。膝灣紫黑。自然彰。惡血刺流。病卽起。法。
治簡便。不荒唐。香油拍法。曲池取。拱手肘灣。是穴場。麻入香油。密。
刮紫疹形。露愈堪望。又方。肘內大筋上。手宜重掐。獨壇長。男掐左灣。
女右手。試之。屢驗。是良方。

脈

燥欲入水四肢不收喘滿作搐皆不治

方

小麥冬湯

茯苓

去皮

麥冬

去心

半夏

薑製

橘皮

白朮

各一
小半

人參

小麥

甘草

炙各
一小

右加生薑烏梅煎服

白朮散

治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰老及

酒積嘔噦

白朮

茯苓

去皮

人參

藿香

木香

乾葛

右等分爲細末每服二錢白湯調下如煩渴加滑石二兩甚加薑汁續續飲之

赤石脂湯 治霍亂下焦熱結或利下膿血煩痛

赤石脂四兩

升麻

白朮各一兩半

烏梅去核炒

炮薑各一兩

梔仁

陳廩米各五升

右研細每服五錢水煎空心溫服

理中湯

附子理中湯

溫胃飲

四逆湯

均見惡寒

藿香正氣散

平胃散

均見中食

香薷飲

見中暑

五苓散

六和湯

均見感冒

一人時值盛夏。嘔瀉腹痛。煩渴面垢。自汗。以六合湯加香薷炮薑全愈。

一人忽然腹大痛。水瀉面青。脚轉筋。勢亦危急。用大劑附子理中湯。加木瓜厚朴砂仁一劑平減。兩劑愈。

予在夏月清晨猶未起。腹大痛欲吐不吐。命男掐左手灣肉大筋。即止。又六月間往縣。轎夫在中途。腹大痛不能行。予下輿用力掐伊左手灣筋亦止。

二香散

治暑濕相搏霍亂轉筋

藿香 白朮 厚朴 陳皮 茯苓 半夏 紫蘇 桔梗

白芷 香薷 黃連 扁豆 各一 大腹皮 甘草 各五

右加薑五片葱白三根水煎服

七氣湯 治七氣鬱結陰陽不和吐利交作

半夏 厚朴 白芍 茯苓 各 桂心 紫蘇 陳皮 人參 各

右加薑棗煎服

桂苓白朮散

白朮 藿香 扁豆 干葛 西砂 白芍 甘草 上桂

癲論

癲者或狂或愚或歌或笑或悲或哭如醉如癡言語有頭無尾有狂之意不如狂之甚穢澌不知歷年累月不愈俗呼心風此志願高大而不遂所欲者多有之治宜星香散加石菖蒲人參各五分加薑汁竹瀝下壽星丸或以湧劑湧出痰涎後服寧神之劑因驚而得者抱龍丸思慮傷心而得者酒調天門冬地黃膏多服取效有心經蓄熱發作不常或時煩燥鼻眼覺有熱氣不能自由有頰心風稍定復作清心湯加石菖蒲若氣結爲痰痰迷爲癲服四七湯若由七情得之痰涎包絡心竅用白礬鬱金丸若脉乍大乍小乍有乍無忽六部一

魚四肢如常。忽如雀啄。如屋漏。如蝦游魚戲。此鬼祟之徵也。宜以針灸治之。景岳云。癲狂之病。本自不同。狂病之來。狂妄以漸。而經久難已。癲病之至。忽然僵仆。而時作時止。狂病常醒。多怒而暴。癲病常昏。多倦而靜。由此觀之。則其陰陽寒熱。自有冰炭之異。故難經曰。重陽者狂。重陰者癲。義可知也。後世諸家有謂癲狂之病。大概是熱。此則未必然也。此其形氣脈氣。自亦有據。不可不辨。故癲病多由痰氣。非若狂病多因乎火也。凡氣有所逆。痰有所滯。皆能壅閉經絡。格塞心竅。故發則旋暈僵仆。口眼相引。目睛上視。手足搐搦。腰脊強直。食頃。

氣因其甚者而先之。至若火之有無。當審其脈証而兼爲之治也。氣
滯者。宜排氣飲。大和中飲。四磨飲。蘇合香丸。牛黃清心丸。集成潤下
丸之類。痰甚者。清膈煎。六安煎。二陳湯。橘皮半夏湯。或抱膽丸。硃砂
滾涎丸之類。兼痰兼火者。宜清膈煎。硃砂安神丸。丹溪潤下丸之類。
痰逆氣滯之甚者。必宜吐法。吐後隨証調理。凡癰病無火者多。若無
火者。不得妄投涼藥。恐傷脾氣。以致變生他証。且復有陰盛陽衰。及
氣血暴脫而絕無痰火氣逆等病者。則凡四君四物八珍十全大補
等湯。或乾薑附桂之類。皆所必用。不得謂癰癩盡屬寔邪。而概禁補
劑也。若真陰失守。氣不歸根。而時作時止。昏沉難愈者。必用紫河車

九方可奏效。其有虛中夾疑。微兼痰火。病久不愈者。集驗龍腦安神丸。最宜隨証增減。可爲法也。一癡。狀証。凡平素無痰。或以鬱結。或以不遂。或以思慮而疑貳。或以驚恐而漸致。言辭顛倒。舉動不經。或多汗。或善愁。其証則千奇萬怪。無所不至。脉必或弦。或數。或大。或小。不常。此宜氣逆在心。或肝胆二經。氣有不清。而然。但察其形體強壯。無虛脫等証。悉宜用服蠶煎治之。或用雷公治法。亦妙。然愈與不愈。視元氣之強弱。待時而復。非可急也。若因大驚猝恐懼。一時偶傷心胆。而致失神昏亂者。當以速扶正氣爲主。宜七福飲。或大補元煎之類。