

武昌醫館叢書


十



經史證類大全本草卷之十二

木部上品

桂 花




桂



賓州桂



宜州桂



北京中医药大学图书馆版权所有

桂味甘辛大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻鼈能墮胎堅骨節通血脉理疎不足宣導百藥無所畏久服神

仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾

得入參麥門冬甘草大黃黃芩

調中益氣得此胡紫石英乾地黃療吐逆陶隱居云按本經惟有單名桂入藥最多所用悉與前說相應仙經乃並有三桂常服食以慈涕合和雲母蒸化為水者正是此種爾今出廣州者好相州始興桂陽縣即是小桂亦有而不如廣州者交州桂州者形段小多脂肉赤好經云桂葉如柏葉澤黑皮黃心赤齊武帝時湘州送樹以植芳林苑中今東山有桂皮氣粗相類而葉乖異亦能凌冬忍或是杜桂時人多呼丹桂正謂皮赤爾北方今重此每食輒須之蓋禮所云薑桂以為芬芳唐本注云園桂葉似栟葉中有縱文三道表裏無毛而光澤杜桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者陶引經云似柏葉驗之殊不相類不知此言從何所出今按桂有二種准皮稍不同若園桂老皮堅板無肉全不堪用其小枝薄卷及二三重者或名園桂或名筒桂其杜桂嫩枝皮名為肉桂亦云桂枝其老者名木桂亦名大桂得人參等良本是園桂剥出單桂條陶為深誤也陳藏器本草云園桂杜桂桂心已上三色並同是一物按桂林桂嶺因桂為名今之所生不離此郡從嶺以南

際海盡有桂樹惟柳象州最多味既辛烈皮又厚堅土人所採厚

者必嫩薄者必老以老薄者為一色以厚嫩者為一色嫩既辛香

兼又筒卷者即菌桂也味淡自然板薄者即牡桂也以老大而名

筒卷者即菌桂也以嫩而易卷古方有筒桂字似菌字後人誤書

之習而成俗至於書傳亦復因循桂心即是剷除皮上甲錯取其

近裏辛而有味

柿葉牡桂葉似批把葉此乃云葉如柏葉蘇以桂葉無似柿葉

乃云陶為深誤刺出此條今據陶注云菌桂正圓如竹三重者後

壯桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦辛此桂則是半卷多脂者

此云仙經有三桂以蒸第合和雲母蒸化為水服之此則有三種

明矣陶又云齊武帝時相州得樹以植芳林苑中陶隱居雖是梁

武帝時人實生自宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見此

樹而言也蘇恭但只知有二種亦不能細尋事跡而云陶為深誤

何臆斷之甚也

之藥論云桂心君亦名紫桂殺草木毒忌生慈味苦辛無毒主

治九種心痛殺三蟲主破血通利月閉治輭脚痺不仁治胞衣不

下除欬逆結氣擁痺止腹內冷氣痛不可忍主下痢治鼻息肉

云桂心治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目

暖腰膝破疰癖癥瘕消瘀血治

風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉

圖經曰 菌桂生交趾山谷牡桂生南海山谷桂生桂陽舊經載

郭璞云有人呼桂厚皮者為木桂蘇恭以謂牡桂即木桂及單名

桂者是也今嶺表所出則有筒桂肉桂桂心官桂板桂之名而醫

家用之罕有分別者舊說菌桂正圓如竹有二三重者則今所謂
筒桂也筒菌字近或傳寫之誤耳或云即肉桂也杜桂皮薄色紫
少脂肉氣如木蘭味亦相類削去皮名桂心今所謂官桂疑是此
也桂是半卷多脂者今所謂板桂疑是此也今觀實宜詔欽諸
所圖上者種類亦各不同然皆題曰桂無復別名參考舊法謂
桂葉似柿葉中有三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是銀與
今賓州所出者相類杜桂葉狹於菌桂而長數倍其嫩枝皮半卷
多紫與今宜州韶州者相類彼土人謂其皮為木蘭皮肉為桂心
此又有黃紫兩色益可驗也桂葉如柏葉而澤黑皮黃心赤今欽
州所出者葉密而細亦恐是其類但不作柏葉形為疑耳皮厚者
名木桂即板桂是也蘇恭以杜桂與單名桂為一物亦未可據其
木俱高三四丈多生深山蠻洞中人家園圃亦有種者移植於嶺
北則氣味殊少辛辣固不堪入藥也三月生花全類茱萸九月結
實今人多以裝綴花果作筵具其葉甚香可用作飲香尤佳二月
八月採皮九月採花並陰乾不可近火中品又有天竺桂云生西
胡國功用似桂不過過烈今亦稀有故但附於此張仲景治傷寒用
桂枝湯甲乙經治陰受病發痺內熨方用醇酒二十斗蜀椒一斗
乾薑一斗桂一斗凡四物又咀著清酒中綿絮一斤細白布四丈
皆并內酒中置馬矢煨中善封塗勿使泄氣五日五夜出布綿絮
暴乾復浸之以盡其汁每漬必臍其日乃出布綿乾之并用碎與
絮複布為巾其布長五七尺為六七巾即用之生桑炭炙巾以熨
寒痺所刺之處令熱入至於病所寒復炙巾以熨之三十徧而止
汗出炙巾以拭身亦三十徧而止起步內無見風每刺必熨如此
病已矣此所謂內熨也又治臂筋急亦以白酒和桂塗之續傳信

方造桂漿法夏月飲之解煩渴益氣消痰桂末一大兩白蜜一升以水二斗先煎取一斗待冷入新瓷瓶中後下二物攪二三兩轉

七日開之藥成氣香味美格韻絕高今人亦多作故并著其法

雷公云 凡使勿薄者要紫色厚者去上麤皮取心中味辛者

未用即用重密熟絹并紙裹勿令見風其州土只有桂草元聖

無桂心用桂草煮丹陽木皮遂成桂心凡使即單擣用之

惠方 治風頭痛每欲天陰雨風先發者用桂心又方治心

悶用桂心半兩為末以酒調如膏用傅頂上并額角又方治心

蓋煎至半盞去滓稍熱服立効又方治寒疝心痛四肢逆冷全

擣羅為散不計時候又方治產後惡血衝心痛氣悶欲絕用桂

熱酒調下一錢匕又方治心三兩擣羅為散狗膽汁和丸如櫻

桃大不計時候用外臺祕要療小兒睡中遺尿不自覺桂末雄

熱酒磨下二九千金方治中風面目相引偏僻牙車急苦不可轉桂心以

下日千金方酒煮取汁故布蘸搗病上正即止左喝搗右右喝搗

三揄左常又方大治失音未挂又方治卒中惡心痛桂心八分

用大効又方若舌下漸熱汁又方治卒中惡心痛桂心八分

分二肘後方治卒心痛桂心八兩吹咀又方治心腹俱脹痛

絕桂一兩切以水一升二合煮取又方治中風四肢逆冷吐清

八合去滓頓服無桂用乾薑亦得又方水宛轉啼呼者取二兩

吸咀以水三升煮取二升去滓適寒溫盡服

又方

治反腰有血痛擣桂節三升許以苦酒和塗痛上乾復塗

葛

氏方

治卒吐血桂骨方寸匕晝夜含二十許服亦療下血大神驗千金方同

又方

治產後腹中痠痛末桂溫

酒服方寸匕日三子母秘錄同孫真人食忌

治中風失音方桂一尺以水三升煎取一升服取汁

又方

治唾血取桂心擣作末以水下方寸匕

梅師方

蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕或下白沫身體冷急煎桂汁服

之多飲冷水一二升勿食飲吐漿煎濃豉汁服之

又方

治卒外腎偏腫疼痛方桂心末和水調方寸匕塗之

又

方

治產後血暈不禁止餘血彌痛兼塊桂心乾薑等分為末空心酒調服方寸匕

斗門方

治中風失音用桂心

一兩去其麤皮近入身體懷之至兩時辰許為末分為三服每服用水二盞煎取一盞服之差大妙聖惠方同

姚和衆

方

治小兒臍腫取桂心炙令熱熨之日可四五度抱朴子云桂可以合葱涕蒸作水

可以龜腦和而服之七年能步行水上長生不死又云趙他子服桂二十年足下毛生日行三百里力舉千斤

無毒

心痛腎

風腎痛溫筋通脉止煩出汗

補中益氣丸服通

神效

生南海山谷

今俗用杜桂狀似桂而扁廣云南海郡即是廣州

殊薄皮色黃脂肉甚少氣如木蘭味亦類桂不知當是別樹為復猶是桂生有老宿者爾亦所未究唐本云云爾雅云侵偃木桂古方亦用木桂或云牡桂即今木桂及單名桂者是也此桂色子與蘭桂同惟葉倍長大小枝皮俱名牡桂然大枝皮肉理麤虛如木肉少味薄不及小桂皮肉多半卷中必皺起味辛美一名肉桂一名桂枝一名桂心出融州桂州交州甚良臣禹錫等謹言圖經云葉狹長於蘭桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中皺起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削去上皮名曰桂心藥中以此為善其厚皮者名曰木桂二月八月採皮日乾之爾雅疏云侵一名木桂郭云今南人呼桂厚皮者為木桂桂樹葉似枇杷而大白華華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青間無雜木本草謂之牡桂是也藥性論云牡桂君味甘辛能去冷風疼痛

圖經

文具桂條下

經驗後方

治大人小兒喫雜果子多腹脹氣急方取肉桂碾末飯丸如黍豆大小兒熱水下五丸大人下十九

未痊再服

蘭桂味平溫無毒主百病養精神顏色為諸藥之

通使久服軀身不老面生光澤媚好常如童子生交趾

桂林山谷巖崖間無骨正圓如竹立秋採

屬交州桂林屬

廣州而蜀都賦云菌桂臨崖俗中不見正圓如竹者惟嫩枝破者成圓猶依桂用非真菌桂也仙經乃有用菌桂云三重者良則明非今桂矣必當別是一物應更研訪云菌者竹名古方用筒柱者是故云三重者良其筒桂亦有二三重卷者葉似柿葉中三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是菌然大枝皮不能重卷味極淡薄不入藥用今惟出韶州為第一圖經云葉似柿葉而尖狹光浮花白葉黃四月開五月結實樹皮青黃薄卷者筒亦名筒桂厚硬味薄者名板桂又不入藥用三月七月採皮

圖經

文具桂條下

列仙傳


范蠡好食桂飲水討藥人出出見之又曰韓終采桂父象林人常服桂皮葉以龜腦和服之

藥詩

得而食之桂實大如栗別說云謹按諸家所說桂之異同

所敗及醫家見用唯陳藏器一說最近然筒厚實氣味重者宜入治藏及下焦藥輕薄者宜入治頭目發散藥故本經以菌桂養精神以壯桂利關節仲景傷寒論發汗用桂枝桂枝者枝條非身幹也取其輕薄而能發散今又有一種柳桂乃桂之嫩小枝條也亦宜入治上焦藥用也

松脂



松脂味甘溫無毒
 且惡瘡頭瘍白禿疥癰風氣安
 其赤者主惡瘡
 服軀身不老延年一名松膏一名松
 生太山山谷六月採

UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

中医药大学图书馆

松實味苦溫無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月

採陰乾

松葉味苦溫主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年

松葉無毒

松節溫主百節久風風虛脚痺疼痛

松根白皮主辟穀不飢

中以桑灰汁或酒煮軟按內寒水中

數十過白滑則可用其有自流出者乃勝於鑿樹及煮用膏也其實不可多得惟葉玉是斷穀所宜細切如粟以水及麴飲服之亦有陰乾搗為屑丸服者人患惡病服此無不周理為佳物但人多輕忽近易之爾
云松花名松黃拂取似蒲黃止爾酒服身輕
病云勝皮葉及脂其子味甚甘經直云味苦非也松取枝燒其
上下承取汁名諸脂諸主牛馬瘡疥為佳樹皮綠衣名艾納合和
諸香燒之其煙團聚青白可愛也
味甘平殺蟲用之主耳聾牙有
諸瘡膿血煎膏生肌止痛抽風
釵名五粒松道家服食絕粒子如巴豆新羅往往進之
松脂潤心肺下氣除邪煎膏治瘰癧排膿
松葉暖無毒炙治



所有

東蒼風濕瘡佳
風濕松根白皮味苦溫無毒補五勞益氣

圖經曰

松脂生泰山山谷今處處有之其用以通明如薰陸香

鍊治其法用大釜加水置甑用白茅藉甑底又加黃砂於甑上厚
寸許可矣然後布松脂於上炊以桑薪湯減即添熱水當令甑底
松脂盡入釜中乃出之投於冷水既凝又蒸如此三過其白如玉
然後入藥亦可單服其實及根白皮古亦有服食法但今松實多
作果品餘不聞堪入藥其花上黃粉名松黃山人及時拂取條湯
點之甚佳但不堪停久故鮮用寄遠燒其枝上下承取汁液名松
脂信諸主牛馬瘡皮上綠衣名艾納香用合諸香燒之其煙不散
方書言松為五粒字當讀為鬣音之誤也言每五鬣為一葉或有
兩鬣七鬣者松歲久則實繁中原雖有然不及塞上者佳好
也中品有墨條不載所出州郡然亦出於松故附見於此

聖惠方

絕穀昇仙不食法取松實搗為膏酒調下三錢日三

又方

服松葉令人不老身生綠毛輕身益氣久服不已絕穀不

亦可粥汁服之初

服稍難久自便矣

又方

治牙斷歷齒根暗黑

又方

治一切

松脂末填瘡孔令

又方

神仙餌松實用七月取松實過時即落

三服如服及百日身輕三百日日行五百里絕穀

外臺祕要集

療鰓齒取松脂銳如錐注鰓孔內
又方 治惡風疾松脂煉投

須臾鰓虫緣松脂出梅師方同
又方 療歷節諸風百節酸痛不可

者二三日差斷鹽及房室
又方 松脂三十斤煉五十遍不

十偏亦可二十偏用以煉酥三升溫
又方 松脂三升熟攪令

空腹以酒服方寸匕日三數食麪
又方 四肢疼痛如解落松脂二

一百日差
又方 松節酒主歷節風四

方 治脚氣十二風痺不能行服
此一劑更能行速不過兩劑松葉

以水四石煮取四斗九升以釀五
又方 松葉酒松葉六十斤細剉

漬米并饒飯泥釀封頭七日發
又方 治口喝青松葉一升

浸二宿近火一宿初服半
又方 治三年中風不效者松葉一

升漸至一升頭面汗即止
又方 細切之以酒一斗煮取三升

服取汗
千金翼 治蟲食齒根齒黑者以松木灰
出立差

三兩煉巴豆一兩相和熟擣可丸
孫尚藥 治脚轉筋疼痛

兵部手集

療刺入肉疼悶百理不差方
松脂流出如細乳

不痒不覺自落 **鬼遺方** 治疥癬松膠香研細約酌入少輕粉衮令勻凡疥癬上先用油塗了錯末一日便乾頑者兩

度 **傷寒類要** 酒服方寸匕日三辟五年瘰 **抱朴子** 續服年

不差家乃齋粮棄送於山穴中瞿自怨不幸悲歎涕泣經月者仙

人經穴見之哀之具問其詳瞿知其異人也叩頭自陳乞命於是

仙人取囊中藥賜之教其服百餘日瘡愈顏色悅服膏潤仙人復

過示之瞿謝活命之恩乞遺其方仙人曰此是松脂彼中極多

可煉服之長服身轉輕力百倍登危涉險終日不困年百歲齒不墮髮不白夜卧常見有光明如鏡 **列仙傳** 好食

松實能飛行健走及馬以松子 **野人閑話** 伏虎尊師篇煉松脂

遺堯堯不能服松者楠松也 法十斤松脂五度以

水煮過今苦味盡取得後每一斤煉了松脂入四兩茯苓

末每晨水下一刀圭即終年不食而復延齡身輕清爽