

幼
科
卷二



民國廿七年十一月三十號

編輯幼科雜病心法要訣

卷二



南京中醫藥大學圖書館版權所有

編輯幼科雜症心法要訣

疳證門

疳證總括○大人者十五歲以上也病在為勞若十五歲以下者皆名為疳
之氣血虛弱藏府嬌嫩易於受傷或因乳食過飽或因肥甘無節停滯中脘傳化
滯腸胃漸傷則生積熱熱盛成疳則消耗氣血煎灼津液凡疳病初起尿如米泔午
後潮熱日久失治令青筋暴露肚大堅硬面青黃肌肉消瘦皮毛憔悴眼睛發眦而
疳症成矣然當分其所屬而治之庶不致有悞也

脾疳○脾屬土色黃主肌肉故脾疳則見面黃肌肉消瘦身體發熱困倦喜睡心下
痞硬乳食懶進睡臥喜冷好食泥土肚腹堅硬痛疼頭大頸細有時吐瀉口乾煩渴
大便腥黏之證也宜先攻其積用消疳理脾湯肥兒丸主之積退然後調理其脾以
參苓白朮散主之



消肝理脾湯 蕪荑 三棱 菽朮 青皮炒 陳皮 蘆薈 檳榔 使君子肉

甘草生 川黃連 胡黃連 麥芽炒 神麴炒 引用燈心水煎服

肥兒丸 人參二錢半 白朮五錢 茯苓二錢 黃連二錢 胡黃連二錢 史君子肉四錢 神麴炒 麥芽炒

山查肉各三錢半 甘草錢半 蘆薈一錢 右為末 黃米糊丸 如黍米大 每服三二十九米湯化

參苓白朮散 人參二錢 白朮二錢 茯苓二錢 扁豆炒 薏米炒 山藥各五錢 陳皮三錢 縮砂炒熟

桔梗各二錢 甘草一錢 蓮子五錢 右共為末 每服一錢 老米湯調服

疝瀉 ○疝瀉之證多緣積熱傷脾以致水穀不分頻頻作瀉法宜清熱滲瀝以清熱

和中湯主之若瀉久不愈當漸為調理參苓白朮散主之

清熱和中湯 白朮 赤陳皮 厚朴姜炒 赤苓 黃連 神麴炒 穀芽 使君子 生

甘草 澤瀉 引用燈心水煎服 ○參苓白朮散寬脾疝

疝腫脹 ○疝疾腫脹之證多因傳化失宜以致脾肺兩傷現證氣逆喘咳胸膈痞滿

肚腹腫脹面色浮光宜用御苑勻氣散治之其腫脹自消矣



御苑勻氣散 桑皮炒 桔梗 赤苓 甘草生 藿香 陳皮 木通 引用姜皮燈

心水煎服

疝痢○疝痢之由皆因熱結腸胃所致故痢時或赤或白腹中窘痛急用香

湯治之其痢自愈

香連導滯湯 青皮炒 陳皮 厚朴薑 薑生 甘草 川黃連薑炒 山查 神麩炒

換榔 大黃 引用燈心水煎服

肝疝○肝屬木色青主筋故肝疝則見面目爪甲皆青眼生眵淚隱澀難爭搖頭柔

目合面腫卧耳瘡流膿大青筋身體羸瘦燥渴煩急糞青如苔之證也治宜先清熱

用柴胡清肝散蘆薈肥兒丸主之若病勢稍退當以逍遙散抑肝扶脾湯調理

柴胡清肝散 銀柴胡 梔子微炒 連翹生 生地黃 胡黃連 赤芍 龍胆草

青皮炒 甘草生 引用燈心竹葉水煎服

蘆薈肥兒丸 五穀虫二兩炒 蘆薈生 胡黃連炒 川黃連各一兩薑炒 銀柴胡一兩二錢炒 扁豆炒 山藥



各二兩 南山查 二兩 蝦蟆 一兩 肉豆蔻 七錢 檳榔 五錢 使君子 二錢 神麴 三兩 麥芽 一兩六錢 鷓鴣 八錢 萬壽

炒 二兩 砂 二錢 麝香 二錢 共研細末 醋糊為丸 如黍米大 每服一錢 米飲下

加味道遙散 茯苓 白朮 當歸 白芍 柴胡 薄荷 炙甘草 丹皮

梔子 引用姜棗水煎服

抑肝扶脾湯 人參 白朮 黃連 柴胡 茯苓 青皮 陳皮 白芥子

胆草 山查 神麴 炙甘草 引用姜棗水煎服

心疝 心驚 火色赤 主血脈 故心疝則見面紅目赤 狀熱有汗 時時煩渴 咬牙弄舌

口舌煩燥 渴飲生瘡 小便紅赤 胸膈滿悶 睡喜伏臥 懶食乾瘦 或吐或利 也熱盛者

瀉心導赤湯 主之 熱盛兼驚者 珍珠散 主之 病久心虛者 扶神湯 調理之

珍珠散 珍珠 三錢 麥冬 五錢 天竺黃 一錢 金箔 二十片 牛黃 一錢 胡黃連 三錢 生甘草 二錢 羚羊角

大黃 當歸 各三錢 砂 二錢 雄黃 一錢 扶神 五錢 犀角 三錢 右為細末 每服五錢 茵陳湯 調服

扶神湯 扶神 當歸 炙甘草 人參 引龍眼肉 煎 煩熱加麥冬



瀉心導赤湯 方見本古

疳渴 ○疳渴者多因肥甘積熱煎耗脾胃以致津液虧損故不食大渴引飲心神煩

熱速用清熱甘露飲其渴自愈

清熱甘露飲 生地黄 麥冬 志 石斛 知母 生 枇杷葉 蜜炙 石膏 煨 甘草

黃芩 引用燈心水煎服

肺疳 ○肺屬金色白主皮毛故肺疳則見面白氣逆咳嗽毛髮焦枯皮上生粟肌膚

乾燥增汗發熱常流清涕鼻拗 類 生瘡也先用生地清肺飲以疎解之繼用甘露飲清

之日久肺虛者當以補肺散主之

生地清肺散 桑皮 炒 生地黄 天冬 前胡 桔梗 蘇葉 防風 黃芩 生

甘草 當歸 連翹 志 赤苓苓 引用生姜紅棗水煎服

甘露飲 生地黄 熟地黄 天冬 麥冬 志 枳壳 炒 桔梗 黃芩 枇杷葉 蜜炙

茵陳蒿 石斛 引用紅棗水煎服



補肺散 白茯苓 阿膠炒粉 糯米 馬兜鈴 炙甘草 杏仁炒去尖 水煎服

腎疝 ○腎蠱水色黑主骨患此疝者初必有解顛鶴膝齒遲行遲腎氣不足等證

因肥甘失節久則漸成腎疝故見面色鰲黑齒齦出血口中氣臭足冷如水腹痛泄

瀉啼哭不已之證先用金蟾丸治其疝繼以九味地黃丸調補之若稟賦不足者調

元散主之

金蟾丸 乾蝦蟆五個 胡黃連 黃連各三錢 鶴蟲二錢 肉豆蔻煨 苦棟根白皮 雷丸 蘆

蒼生錢各三 蕪荑錢各三 右為末麩糊為菜豆大丸雄黃為衣每服十五丸米湯化下

九味地黃丸 熟地 茱萸肉錢各三 赤茯苓 澤瀉 牡丹皮 山藥炒 當歸 川棟

子 史君子錢各三 右為細末煉白蜜為丸如芡實大用白滾水研化食前服

○調元散 人參 茯苓 白朮炒 山藥炒 川芎 當歸 熟地黃 茯神 黃耆

炙甘草 白芍 引用姜棗水煎服

疝熱 ○疝疾之證身多發熱治者宜分別輕重虛實治之病初起多實者驚甲青蒿



飲主之日久多虛者驚甲散主之

驚甲青蒿飲 銀柴胡 驚甲炙 青蒿 生甘草 生地黃 赤芍 胡黃連

母炒 地骨皮 引用燈心水煎服

驚甲散 人參 黃芪炙 驚甲炙 生地 熟地 當歸 白芍炒 地骨皮

腦疴○腦疴者因兒素受風熱又兼乳哺失調以致變成此證頭皮光急腦注 瘡餅

頭熱毛結焦髮如穗鼻乾心煩腮顙腫硬困倦暗暗自汗身熱也腦熱生瘡者龍胆丸主

之外用吹鼻龍腦散吹之其證自愈

龍胆丸 龍胆草 升麻 苦棟根皮焙 赤茯苓 防風 蘆薈 油髮灰各三錢 青黛

黃連各三錢 右為細末 猪胆汁浸糕糊丸如麻子大薄荷湯下量兒大小與之

龍腦丸龍腦射香雄黃胡黃連珠砂牛黃蘆薈乾蝦蟆右為細末龍胆含丸如麻子大每服三丸薄荷湯下 吹鼻龍腦散 龍胆 麝香少許各研細末 蝸牛壳炒黃 蝦蟆灰 瓜蒂 黃連 桔梗 細辛

右為細末入磁合內貯之每取少許吹入鼻內日吹二次

眼疴○眼疴者疴熱上攻於眼故發時痒澀赤爛眼胞腫痛白睛生翳漸漸遮滿不



時流淚羞明閉目也先用瀉肝散疏解之再用清熱退翳湯消其翳若日久不瘳

當調補道遙散或羊肝散主之

瀉肝散 生地黃 當歸 赤芍 川芎 連翹志 梔子生 龍胆草 大黃

甘草生 防風 引用燈心水煎服

清熱退翳湯 梔子微炒 胡黃連 木賊草 生地 羚羊角 龍胆草 銀柴胡

蟬退 赤芍 甘草生 菊花 蒺藜 引用燈心水煎服

羊肝散 青羊肝一具去筋膜切韭叶片厚 人參 羌活 白朮土炒 蛤粉各等分 右為細末令勻聽用將藥

置荷叶上如錢厚一層鋪肝一層包固外以新竹青布包裹蒸熟任兒食之如不

食者及夏月恐腐壞則晒乾為末早晚白湯調下服完再合以好為度若熱者減

人參 ○道遙散宜見肝疳

鼻疳 ○鼻疳者因疳熱攻肺而成蓋鼻為肺竅故發時鼻塞赤癢疼痛浸淫潰爛

下連腎際成瘡咳嗽氣促毛髮焦枯也熱盛者宜清金散蔣氏化毒丹主之虫蝕者



化蟲丸主之外用鼻疳散敷之或以吹鼻蟬壳散吹入鼻

清金散 生枹子 黄芩 枇杷叶炙 生地黄 花粉 連翹志 麥冬志 荷薄

參 生甘草 桔梗 引用燈心水煎服 ○蔣氏化毒丹方見胎赤

化蟲丸 蕪荑 蘆薈生 青黛 川芎 白芷梢 胡黃連 川黃連 蝦

為細末猪胆汁浸糕為丸如麻子大每服二十九食後杏仁煎湯下

鼻疳散 青黛錢 麝香少許 熊胆五分 右為細末乾者用猪骨髓調貼濕者乾上

吹鼻蟬壳散 蟬壳微 青黛研 蛻蛻皮及 滑石 麝香各等分 右為細末每用菜豆大

吹入鼻中日三用之疳蟲盡出 ○通散方見疳疔

牙疳 ○牙疳者因毒熱攻胃而成故毒熱上發齧肉亦爛疼痛口鼻血出牙枯脫

落穿腮蝕唇病勢危急急用消疳蕪荑湯瀉其熱毒繼以蘆薈肥兒丸清其餘熱外

用牙疳散時時發之自愈總之此證必冒強能食堪勝峻藥始有生機否則難治也

蘆薈肥兒丸 方見疳疔



消疔蕪羨湯 大黃 芒硝 蕪羨 蘆薈^生 川連 胡黃連 黃芩 雄黃

水煎服眼後便軟反不食者去大黃芒硝加石膏羚羊

牙疔散 人中白^{煨存性} 綠礬^{煨紅} 五倍子^{各等分炒黑} 冰片^許 右為極細末先用水拭淨牙齒再

以此散敷之有蟲者加楸榔

脊疔 ○脊疔者因脊熱生蟲上蝕脊脊也以手擊其背必空若鼓鳴脊骨瘦弱狀若

鋸齒始為脊疔外證亦身體發熱下利煩渴十指皆瘡類齧爪甲其證最為可畏須

先以蘆薈丸殺其虫繼用金蟾散消其疔臨時調治或可愈也

蘆薈丸 生蘆薈 青黛 硃砂 熊胆 胡黃連 貫眾 地龍^{微炒} 川黃連 蟬

蛻^{去足} 雷丸^{各五錢} 麝香^{一錢} 蝦蟆^{二下酥塗炙焦} 右為細末用蝸角肉研和丸如麻子大每服五

丸粥飲下量兒大小與之

金蟾散 蟾^{一枚酥塗炙黑} 夜明砂^炒 桃白皮 樗根白皮 地榆 黃蘗 訶黎勒^{皮煨} 百合

人參 大黃 白蕪羨^炒 胡粉^錢 楸榔^{一錢} 丁香^{三十粒} 右為細末每服五分粥飲調下



蛔疝 ○ 蛔疝者因過食生冷油膩肥甘之物以致溼熱生蟲腹中擾動故有時煩燥
多啼有時壯腹攪痛口唇或紅或白口溢清涎腹脹青筋肛門溼癢也先用使君子
散之主不愈下蟲丸主之若蛔退又當調補其脾肥兒丸主之

使君子散 十个瓦上炒為末 苦楝子 五个泡去核 白蕪荑 各一錢脬汁浸一宿 右為細末每服

下蟲丸 苦楝根皮 新白者佳酒浸焙 木香 桃仁 去皮 綠包貫眾 蕪荑 焙 雞心檳榔 錢 輕粉 五分

鶴虱 一錢炒 乾蝦蟆 三錢炒黑 史君子 三錢煨取肉 右為末麩糊成丸如麻子大每服二十九滾白水

送下 ○ 肥兒丸 方見脾疝

無辜疝 ○ 無辜者其病有二或因浣夜露被無辜鳥落羽所污兒著衣後致成此證
或因乳母有病傳染小兒以致此疾其證頸項生瘡或項內有核如彈按之轉動弱
而不疼其中有蟲如米粉不速破之使蟲食臟腑便利膿血身體羸瘦面黃發熱也
治宜先清其熱柴胡飲主之再消其疝以蘆薈肥兒丸主之

柴胡飲 赤芍 柴胡 黃連 半夏 姜製 桔梗 夏枯草 龍胆草 浙貝母 黃



水

芍 甘草生 引用燈心水煎服○蘆薈肥兒丸方見肝病

丁奚疳○丁奚疳者偏身骨露其狀似丁故各曰丁奚也其證肌肉乾澀啼哭手足枯細面色黑項細腹大肚臍突出尻削身軟精神倦怠骨蒸潮熱燥渴

先用五疳消積丸化其滯繼用人參啟脾丸理其脾病可漸愈也

五疳消積丸 史君子肉五錢 麥芽炒 陳皮 神麴炒 山楂各一兩 白蕪荑 黃連

各三錢 右為末陳米飯為丸每服一錢米飲下

人參啟脾丸 人參五錢 白朮五錢 白茯苓五錢 陳皮四錢 扁豆五錢 山藥五錢 木香二錢 穀芽三錢

神麴三錢 炙甘草二錢 右研細末煉蜜為丸重一錢用建蓮湯化下

哺露疳○哺露者因乳食不節大傷脾胃也其證羸瘦如柴吐食吐蟲心煩口渴頭

骨開張日哺蒸熱先用集聖丸消其積滯再用肥兒丸清理其脾若哺露日久肚大

青筋者又宜清補兼施以人參丸主之

集聖丸 蘆薈炒 五靈脂炒 夜明砂淘洗 礞砂焙乾 木香 陳皮 莪朮 史君子肉



黃連

川芎潤乾

乾蟾各二錢

當歸一錢五分

青皮二錢

右為細末用雄豬胆二個取汁和麵糊為

丸每服一錢米飲送下○肥兒丸方見脾胃

人參丸

人參

麥冬志心

半夏善製

大黃微炒

黃芪炙

茯苓

柴胡

黃芩

炙甘草

川芎

驚甲炙

訶黎勒煨

右為細末煉蜜為丸如麻子大以粥飲下量兒

吐證門

吐證總括○嘔吐一證皆諸逆上衝所致也夫諸逆之因或以乳食過多停滯中脘

致傷胃氣不能健運而上逆也或於食時蠲驚停積不化而上逆也或痰壅欬成阻隔

氣道或蚊蟲擾亂懊懣不安而上逆也總之上逆之因雖不能同而皆能成嘔吐也

但病者有虛有實有寒有熱治者當於臨證時參合兼見之證審慎以別之庶不悞

辨吐嘔噦證○吐證有三曰嘔曰吐曰噦古人謂嘔屬陽明有聲有物氣血俱病也

吐屬太陽有物無聲血病也噦屬少陽有聲無物氣病也獨李杲謂嘔吐噦俱屬脾

胃虛弱潔古老人又從三焦以分氣積寒之三因然皆不外諸逆上衝也治者能分



虛實別寒熱以治之自無不曲中病情矣

傷乳吐○傷乳吐者因乳食過飽停蓄胃中以致運化不及吐多乳片猶如物感

而上溢也其證身熱面黃肚腹膨脹治宜消乳丸化其宿乳安胃和中節其乳食自

然止也

消乳丸 香附二兩神麴炒麥芽各一兩陳皮八錢宿砂炒甘草各五錢右為細末滴水為丸如

米大量兒大小與之姜湯送下

保和丸 南山查二兩神麴炒茯苓 半夏各一兩連翹去心陳皮 萊菔子各五錢右為細末

麴糊為丸麥芽湯化服

傷食吐○傷食吐者因小兒乳食不節過食油膩麴食等物以致壅塞中脘而成也

其證肚腹脹惡食口臭頰吐酸黏眼胞虛浮身體熱潮治宜清胃和中為主先用三

稜丸止其吐再用和胃湯化其滯而病漸愈矣

三稜丸 三稜煨陳皮 半夏姜神麴各一兩黃連姜枳實炒丁香各五錢右為細末麴和丸



如黃米大每服二十九食後姜湯下

和胃湯 陳皮 半夏善製 砂仁研 蒼朮炒 厚朴姜炒 藿香葉 香附炒 甘草炙

神麴炒 引用姜水煎服

夾驚吐 ○夾驚吐者多因飲食之時忽被驚邪所觸而致吐也其證頻吐清

發熱心神煩燥睡臥不寧先用全蠍觀音散截其風次用定吐丸止其嘔而病可

全蠍觀音散 人參三錢 黃耆蜜炙 扁豆炒 茯苓各五錢 蓮肉三錢 木香一錢 白芷二錢 羌活 防風

天麻 全蠍各三錢 炙甘草一錢 右為細末姜棗煎湯調服量兒大小與之

定吐丸 丁香二十粒 煨四十九條 半夏三個 右為細末令勻暑棗肉為丸如黍米大每服七

丸金器煎湯化服

痰飲吐 ○痰飲吐者由小兒飲水過多以致停留胸膈變而為痰痰因氣逆遂成嘔

吐之證其候頭目眩暈面青嘔吐涎水痰沫也宜用香砂二陳湯虛者香砂六君子

湯治之 ○二陳湯 方見現乳本方加藿香砂仁

