

醫統正脈全書

三



類證活人書卷六

無求子著

血門

諸血症虛實之脉 寸脉獨盛血必上溢尺脉獨盛血必下陷兩關盛者嘔吐不已血後陰火空發應現芤數之脉芤者空大之象因虛火附于血絡故大以其失血經絡已虛其脉故空空大者浮數無力之候也大凡失血之脉喜其微弱平緩或不妨細數或先大而漸小或先數而漸緩皆稱吉兆如弦急短促疾而



無倫或搏指空硬者爲難治

咳血形証 咳血者或無痰乾咳而見血或因痰致嗽而帶血或一絲一點或一口兩口雲門中府微脹而氣急促者乃肺體自燥且爲火制因而咳傷肺膜而血隨痰出當以清火順氣滋金潤燥之劑多服若脉弦氣促咽痛聲嘶者不治大凡血症非身心靜養難以回春

咳血主方

麥冬

錢三

生地

錢二

阿膠

川貝母

知母

紫苑

各一錢

百合

五分

水前午後臨睡服

麥冬耑于潤肺而清本經之燥火知母抑龍火之僭逆而保肺阿膠生地清血中之熱而止其妄行貝母

紫苑百合清肺家浮逆之氣以緩痰嗽如火盛而

脾胃强者加玄參一錢血不止加白芍一錢氣急

加紫苑桑皮各一錢元氣虛加人參一錢五分

金水膏瓊玉膏固本丸必須兼服

金水膏 金爲水源肺爲腎母房勞過度腎水虛涸坎

水少火無水以濟則不能靜伏而空發于上謂之壯
火壯火食氣反正爲邪銷鑠精神而肺金反受其尅
所謂子能令母虛也肺主氣因虛則不能統攝宣布
反逆歸本經未有不咳逆喘嗽以致痰紅咯血之理
是膏非止清痰治嗽和傷止血蓋耑于潤肺滋金力
培金水之化源肅清諸氣而下引兼用固本丸大補
肝腎之眞陰使陽火有所依附而歸元返本水暖雲
蒸天澤下沛還成坎離旣濟之體水足一分則火退
一分火旣漸退則精神自成而諸患亦漸平其時壯



火復爲少火靜藏本位猶之招徠亂民復爲良民且
能耕桑力作以供王稅方謂之少火生氣也旣曰生
氣則精神血液咸能充足矣凡老幼男婦虛癆煩欬
肺痿痰紅必須之藥當亟用之

天門冬

紫苑茸

葳蕤

炒各六兩

懷生地

十二兩

麥冬肉

八兩

白芍

炒

百合

款冬花

各四兩

知母

炒

山藥

畧炒

陳皮

川貝母

另研細末聽用

茜草

各二兩

如法熬膏煉蜜收冷後調入貝末不

拘時噙化口中聽其自然臨睡及睡醒時服尤妙

培元固本丸 夫腎爲陰臟于卦爲坎其形有二左屬陰水右屬陽火陰陽互用原成一體居下焦地道萬物無不藉之以化育生成者也吾人不能體此精義以調攝恣情縱慾損氣傷精必至陰陽舛錯水火分張火無水則飛揚僭越水無火則不能生炁由是朝涼暮熱煩嗽痰紅神馳不寐盜汗遺精肌消色痿肢痿體弱飲食不甘脾胃虛泄遂成虛損癆瘵之症此藥耑補坎體之陰水以生血益坎中之陽火而培元必兼金水膏滋金潤肺以佐金水之化源所謂母能



令子實也從此地氣升而爲雲天氣降而爲雨又何
患根本之焦枯生機之不復哉挽回造化莫此爲最
毋視爲膚淺而忽諸

人參

五兩

麥冬

四兩

五味子

肉蓯蓉

製淨

炙乾各二兩

熟地

八兩

山茱萸

山藥

各一兩

茯苓

丹皮

澤瀉

各三兩

蜜丸早空心滾湯吞服三五錢

太平膏

男婦壯火炎上消燬肺金氣失清化致乾咳

煩嗽痰紅咯血嘔血吐血咽痛喉啞喉癰喉痺梅核

肺痿等症總由火盛金衰津枯液竭之故此藥散結
熱以止痛生津液以潤枯燥順氣清痰以治欬嗽便
于噉化而無伐胃傷脾之患

紫苑茸

四兩

欬冬花

杏仁霜

各三兩

知母

川貝母

茜根

薄荷末

各二兩

百藥煎

粉草

海粉

飛淨各一兩

訶子肉

嫩兒茶

各五錢

爲極細末煉白蜜爛和不拘時噉化

咯血形證 不因咳嗽而咯出者謂之咯血或一口或

兩三口其色紫或黑或黃此係心包絡受傷隨氣逆

火炎而咯亦有時乎因痰嗽而咯病由勞煩思慮過度日久失治急宜息念安神調氣靜養服清熱和血安神育氣之劑

咯血主方

生地

三錢

麥冬

二錢

棗仁

一錢五分

茯神

白芍

各一錢

山藥

茜根

各五分

蓮子肉

五枚

水煎午後臨睡服

血熱而後妄溢以地黃補血涼血兼清包絡之火謀慮不遂多傷肝動火以白芍抑肝而斂血血虛則心

不清神不寧故用棗仁安神麥冬清心山藥蓮肉用以健脾胃而育心氣茜草性溫色赤以和傷止血如內熱盛而脾胃旺者加玄參以助水制火知母肅清龍雷之火以保肺 血虛加歸身五分去茜草

氣虛加人參錢半 無睡加棗仁一錢桂圓肉一錢

去白芍茜草安神丸瓊玉膏固本丸早晚兼服

硃砂安神丸

見火門心與小腸虛火方後

培元固本丸

見咳血

瓊玉膏

脾肺腎之元氣不足情志鬱結生機不能啟



發致精神氣血有虧遂成虛癆咳嗽久音啞咳血咯血漸及神銷形萎自汗氣促睡夢不寧遺精泄瀉皮寒骨蒸肢體酸弱諸症凡陰火冲逆畏寒喜熱者宜之

熟地

麥冬

枸杞

各八兩

蒺藜

牛膝

桂圓肉

黑棗

各六兩

人參

黃芪

白朮

天冬

各四兩

廣陳皮

二兩

熬膏煉蜜收早晚隔湯頓熱噙化二三錢

如無

寐加棗仁六兩茯神四兩骨蒸盛加製何首烏六

兩地骨皮四兩如有鬱痰加白茯苓六兩川貝四兩
嘔血形証 嘔者有聲有血一氣五六口或數口之外
其色或黑或紫或紅此胃腑之血也蓋胃爲多氣多
血之所生血之鄉致病多由縱飲或喜薑桂辛辣炙
煇厚味釀成濕熱及燥烈之毒以傷陽明胃絡之膈
膜加以本經有餘之火而嘔逆不已患此血者當忌
一切助火動氣致嗽生痰之物宜用清淡滋潤胃腑
靜居高枕坐臥不使形勞氣逆輕則五日重至七日
其勢自定以後方爲主視其緩急加減調理愈後三

年不發方爲全好倘仍前縱恣不謹觸發不常必增
痰嗽諸症擊動諸經虛火則死不旋踵雖盧扁却走
矣

嘔血主方

生地 五錢

白芍 二錢

知母 茜草 各一錢五分

乾葛

玄參 各一錢

甘草 二分 鮮藕節 一大枝

水煎午後臨睡服

陽明胃腑多受飲食之積熱陽絡傷而血自妄行故
多用生地以清火涼血甚則用童便搗生地爲汁和



藥尤妙芍藥之酸茜草之寒可以歛火止血玄參知

母清三焦之熱以救炎炎之勢如血不止加山藥二

錢已止加麥冬二錢去乾葛茜根藕節如火盛

加茅根二錢已清加麥冬一錢五分茯苓山藥各一

錢去玄參乾葛茜根金水膏宜服如肝腎素弱關

尺空弦者兼服古方六味丸

金水膏

見咳血條

古方六味地黃丸

先天元陰不足後天精神虧損致

水火爲仇金木相刑而有咳血唾血痰紅煩嗽喉啞



聲嘶朝涼暮熱遺精盜汗形神枯萎虛癆不足之症
此藥大補肝腎之真陰裨陽火得所歸依不致僭越
也

熟地

八兩

山藥

山萸肉

各五兩

茯苓

澤瀉

丹皮

各三兩

蜜丸空心吞服五六錢

吐血形証

吐者獨有血而無聲一吐數碗甚至傾盆

非散塊卽或黑或紫或紅此肝經之血也蓋肝統受

心虛之血而藏之故爲多血之臟病由暴怒或鬱怒

傷肝或負重疾走或鬪毆跌撲因內傷而發發則不

宜速止止則使敗血瘀積復不宜攻逐致傷元氣胃氣只用後方緩治加意調攝自愈

吐血主方

生地

錢五

白芍

錢二五分

茜草

錢一五分

玄參

花粉

錢各一

車前

錢各三

黑山梔

錢各五

鮮藕節

錢二大枝

水煎午後臨睡服

血去既多則三焦之火必乘虛而逆上故多用生地佐以白芍平肝清火滋陰涼血茜草藕節止血消瘀玄參花粉之甘涼清熱車前山梔之苦寒瀉火如

