

醫方考綱

三



醫方考繩愆卷之二

歙邑 參黃子 吳崑著

攝陽 北山友松子繩愆
平野 門人白梅庵校閱

火門 第八

叙曰水火人身之陰陽也陽常有餘故火證恒多所謂一水不勝五火是也人能攝理其火致其冲和則調元之手矣或者寒涼太過斯又弊焉自有五行以來不可以無火故知滅燼之爲非今考古方二十餘首以治火豈曰滅火云哉

井花水

水足以濟火，故狂燥煩渴火實之證內以水飲之外以水漬之，此既濟之妙自太易以來已有之矣。

甘梨漿

甘梨漿水類也，生人可平六府之陽，熟之可濟五藏之陰，實火宜生虛火宜熟。

△按類編云：丁士人狀若有疾，厭厭無聊徃謁，楊吉老診之曰：君熱證已極，氣血消鑠，此去三年當以疽死。士人不樂而去，聞茅山有道士醫術通神，不欲自鳴，乃衣僕衣，詣山拜之，願執薪水之役，道上畱置，弟子中久之以實白。道士道

士診之笑曰汝便下山但日日喫好梨一顆如
生梨已盡則取乾者泡湯食滓飲汁疾自當平
士人如其戒經一歲復見吉老見其顏貌腴澤
脈息和平驚曰君必遇異人不然豈有痊理士
人備告吉老吉老具衣冠望茅山焚香設拜自
咎其學之未至云如楊君者可謂無固無我太
丈夫矣今時醫流見人之長則吹毛責備欲著
所短無所不至不咎自學之短惟恐負墮己術
陽不敢議陰致狂吠曰人有所短寸有所餘彼
長我亦長也癡人聞之總以爲然如此之輩真
蜀犬也

人屎人屎人中白牛屎猪屎馬通驢子小便總考
○蘇思邈千金方凡療火證熱證率用上件取汁
飲之往往稱其神良何也經曰清陽出上竅濁陰
出下竅屎溺出於二陰則無分人類物類皆陰濁
也惟其陰濁故足以制陽光或者鄙而遠之未夫
未達醫之妙也

煉秋石

古昔神良之醫但用人屎溺白渣耳未嘗有用秋
石之方也近時多用之夫藥有氣有味有精有魄。
秋石既經煎煉則其氣味已易精華已去所存者
獨枯魄耳惡能與人屎溺白渣論効功耶此舉世

尚奇之昧也。或用陰秋石者爲近之。

防風通聖散

防風 川芎 川歸 白芍藥 大黃
芒硝 連翹 薄苛 麻黃 石膏
桔梗 黃芩 白术 桔子 荆芥

滑石 甘艸

○萬氏家抄方云
其太黃芒硝麻黃
三味對證旋入自
利去硝黃自汗去
麻黃又治癘之法
見于本門增損三
味其理自長

表裏客熱三焦火實者此方主之○麻黃防風
表藥也火熱之在表者得之由汗而泄太黃芒硝
攻裏藥也火熱之在裏者得之由下而泄荆芥薄
荷清上藥也火熱之在巔頂者得之由鼻而泄滑
石梔子清下藥也火熱之在少瀆者得之由溺而

○喬當作翹

泄乃石膏桔梗又所以清肺胃而連喬黃芩又所以去諸經之客熱也火熱灼其血則川芎當歸芍藥可以養之火熱壞其氣則白朮甘艸可以益之

導赤散

生地黃

木通

去粗皮

甘艸梢

等分爲末

心熱小便黃赤此方主之○心與小腸爲表裡故心熱則小腸亦熱而令便赤是方也生地黃可以涼心甘艸梢可以瀉熱佐之以木通則直走小腸膀胱矣名曰導赤者導其丙丁之赤由溺而泄也

三黃瀉心湯

大黃

酒潤各

一升頓服之仲曰
金匱一經歷乎二
味以水三升煮取
一升頓服之仲曰
金匱一經歷乎二

黃芩

黃連

大黃

酒潤各等分

之間未聞有知此經者迨趙宋王洙學士在館閣日得於蠹簡之中或脫簡或蛀爛或有證脫方或有方脫證儒臣孫背林億等修飾者焉然編策聖者也修飾儒者也其中不無差錯焉如傷寒論太黃連渴心湯以麻沸湯浸須臾大分溫再服渴心湯則不然以水三升煮取二升頓服疑矣滌火犯上吐衄之際豈可煎取

△東垣李氏三味爲末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食后熟水吞下用治男婦三焦積熱之藥也后世改丸爲湯号曰渴心丸渾亂古法也謹按傷寒論太陽篇有曰太黃黃連渴心湯者唯標藥名十種而無黃芩故也本因黃連渴心火則此方有黃芩仍名渴心湯者假枯芩渴火於上以治衄也歟且夫長沙治太陽病心下痞按之濡其脉關上浮者大黃黃連渴心湯主之太黃二十兩黃連一兩右二十味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服成氏註曰內經曰火熱受邪心病生焉苦入心寒除熱太黃黃連以

三分之一濃汁頓服一升而直達中下二部以誅無過之地乎設使用湯亦作九次七次而服之庶可成功所用東垣用蜜爲丸如橘子大每服三十丸熟水吞下者土一以熟水寒因熱用且蜜丸末藥不致速下而治病之法或在是焉又於證曰心氣不足於治藥曰瀉心湯思其間必有脫文後人雖有憶度解說總不親切焉吾寧師東垣之洪矣

導瀉心下之虛熱但以麻沸湯漬服者取其氣薄而泄虛熱愚謂此詎未盡善也蓋由黃連本黃於藥中大苦大寒若依常法煎服恐傷胃氣不納而嘔變壞益多焉故長沙瀆湯而服乃日本所謂擺出藥也東垣解之以爲蜜丸便於施治豈不有餘裕也

心膈實熱狂燥面赤者此方主之○味之苦者皆能降火黃芩味苦而質枯黃連味苦而氣燥太黃苦寒而味厚質枯則上浮故能瀉火於膈氣燥則就火故能瀉火於心味厚則喜降故能蕩邪攻實此天地親上親下之道水流濕火就燥之義也

龍膽瀉肝湯

柴胡一錢 炒
黃芩七分 炒
五味子九粒
知母去毛 炒
天門冬去心
人參
龍膽艸各五分

生甘艸
麥門冬去心

○十使良方治膽
梨每服五錢水鍾
半煎七分不拘時
服徐春甫云肝膽
有竇熱令人口苦
而酸用本方治之
若謀慮不決肝膽
虛而口苦者人參
志茯神爲君柴
艸龍膽爲使善
錢氏地黃丸所
謂虛者補其母也
黃連龍膽艸山梔子得柴胡以君之則入肝膽而
平之矣制肝者惟土故用人參甘艸以益脾
益肺畏肝者惟土故用人參甘艸以益脾

○愚按此丹溪之
方也以黃連六兩

茱萸一兩同炒

爲末神龜糊丸如

桐子大每服三四

十九白湯下治肝

經火實左脇滿痛

者以黃連吳茱萸

熱一冷二味同炒

佐最得製法之妙

正名同氣丸治

腹壹因於火者方

和同令黃連之苦

能勝熱可以同其

火今佐以吳茱萸之

辛熱經曰佐以所

利和以所宜是此

謂乎

黃連 炒 六兩 吳茱萸 一兩 湯泡 二共爲末作丸
肝藏火實左脇作痛者此方主之○左肝也左金
心火不得乘其肺金則清肅之令左行而肝有所
制矣吳茱萸味辛熱而氣躁躁則入肝辛熱則疏
陰陽相濟君臣相
利乃用之以爲反佐經曰佐以所利和以所宜此
之謂也

△丁富兒夏月中下痢赤白裡急后重醫用下
劑則加胸脇痛難以布息請治於予脉之弦實
辛熱經曰佐以所
利和以所宜是此
再加丸數諸症如脫焉或問左金丸治痢亦有
利害

初乎曰浙西河山純老用變通丸治赤白下痢
日夜無度及腸風下血用川黃連去毛吳茱萸
湯泡過各等分同炒香揀出各爲末以粟米飯
和丸梧子大各別收每服三十丸赤白痢芩艸湯
下黃連丸白痢薑湯下茱萸丸赤白痢各用十
五丸米湯下此乃變通乎寒因熱用熱因寒用
之微義所以治病有功而無偏勝之害也出百
一選方

當歸龍鬚丸

黃芩

龍膽艸

黃芩

各一

木香

一錢

麝香

五分

當歸龍鬚丸
正方製治風熱發
瘧驚悸筋惕
瘲癰瘍白晝眩
脈

肉瞞癢胸膈不利

腸熱燥澁躁擾越

狂罵詈驚蹶諸火

熱證○爲細末煉

蜜丸如小豆大每

服二三十粒生薑

湯下小兒如麻子

大服忌發熱諸物

云後人加柴胡五

錢青皮一兩以神

漏火之計較也

大黃

酒

青黛

蘆薈

各五錢

蜜丸如豆大

風熱蓄積時發驚悸筋惕搐搦隘塞不利腸胃
澁狂越等證此方主之○肝火爲風心火爲熱
熱則驚悸肝熱則搐搦隘塞不利者肺亦火也腸

胃燥澀者脾亦火也狂越者狂妄而越禮也經曰

狂言爲失志又曰腎藏志如斯言之則腎亦火矣

此丁水不勝五火之謂也故用黃連以瀉心用黃

芩以瀉肺青黛龍膽蘆薈以瀉肝大黃以瀉脾黃
藥以瀉腎所以亟亟以瀉五藏之火者幾於無水
故漏火以存水平用當歸者養五藏之陰於亢火
之時用木香麝香者利五藏之氣於剋伐之際也

互考見咳嗽門

鴻黃散

藿香二錢

山梔一兩
炒黑

石膏五錢

甘艸三兩

防風四兩



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

○錢氏一名渴脾
散右制同蜜酒微
炒香爲末每服一
錢至一錢水一盞

煎至五分溫服清
津無時王海藏
云脾實則渴其子
脾乃脾之子加薑
白皮湯脾

脾家伏火唇口乾燥者此方主之○唇者脾之外
候口者脾之竅故唇口乾燥知脾火也苦能渴火
故用山梔寒能勝熱故用石膏香能醒脾故用藿
香其能緩脾故用甘艸用防風者取其發越脾氣
而升散其伏火也或問何以不用黃連余曰黃連
苦而燥此有唇口乾燥則非黃連所宜故惟梔子
之苦而潤者爲當耳又問曰既惡燥何以不去防

風余曰東垣已言之矣防風乃風藥中之潤劑也故昔人審擇而用之

升陽散火湯

本方去獨活加
葱白名火鬱湯

升麻去根絲

葛根

獨活

羌活

○每服一杯半兩水
一盞煎至一盞去

粗獷熱服忌寒涼

之物及冰水月餘

○講義論治男婦

人參去芦

白芍

各五錢

柴胡八錢

防風三錢

五分

生甘艸二錢

炙甘艸三錢

發困熱風熱筋骨
間熱如火燎肌膚
拘之焰手夫四肢
屬脾胃者土也熱
伏地中此病多因
虛過食冷物抑遏
陽氣於脾土火鬱
則發之

過食冷物抑遏少陽之火鬱於脾部者此方主之
○少陽者三焦與膽也經曰少火生氣丹溪曰天
非此火不能生萬物人非此火不能以有生是少
火也生物之本揚之則光遏之則滅今爲飲食壅
塞至陰抑遏其上行之氣則生道幾於息矣故宜

辛溫之劑以舉之升麻柴胡羌活獨活防風桂枝
皆辛溫上行之物也故用之以升少陽之氣清陽
既出上竅則濁陰自歸下竅而食物傳化自無抑
遏之患芍藥味酸能瀉土中之木人參味甘能補
中州之氣生甘艸能瀉鬱火於脾從而灸之則健
脾胃而和中矣東垣氏聖於脾胃者其治之也必
主於升陽俗醫知降而不知升是撲其少火也安
望其衛生耶

△愚按山東曰東垣氏聖於脾胃者其治之也
必主升陽云云者似未達乎易水東垣治脾胃
有授受之訣也易水悟入太陰陽明論肺不主

時云云之旨從乎春升夏浮秋降冬沈之四體而用藥則涼之寒之溫之熱之或順之逆之無不是法天地生萬物之妙義也以故春夏主用升浮之藥以順天地之生長秋冬主用降沈之藥以承天地之收藏事詳老羊承崑崙范公曲糞吐露滿腔珠璣而撰內外傷辨惑論之中矣以仁術繫心者習之日久亦當知愚之私淑十來年之秘訣於老人今日盡囊拋出用示太方者不過以人命爲重不擇親疎而告之云

瀉白散

桑白皮

地骨皮

各一兩

甘艸

五錢

○錢氏曰右三味
爲末每服一二錢