

神州醫學社新編

增補
葉天士醫案

上海廣文書局出版



中華民國十年三月初版

葉天士醫案（全四冊）

定價洋九角

編輯者


陸士

印刷所

上海世界書局

發行所

上海廣文書局



總發行所

上海四馬路

世界書局



南京中醫藥大學圖書館藏

尺牘類

對^言照^文初等新尺牘

廣註學生尺牘大全

廣註秋水軒尺牘

廣註小倉山房尺牘

廣註^{秋水軒}尺牘合璧

合^{上中下}訂

大字本

大字本

合訂

二冊

一冊

二冊

四冊

一冊

白話文類

初等白話尺牘

初等白話文範

初等白話文法

做白話文秘訣

評歷代白話文範

國語指南

新式水滸演義

(洋裝)

(洋裝)

(洋裝)

二冊

三冊

一冊

一冊

四冊

一冊

四冊

作文類

對^言照^文初等作文新範

對^言照^文高等作文新範

對^言照^文女子作文新範

自修類

新學生國音字典

廣註論說文自修讀本

廣註紀事文自修讀本

廣註駢體文自修讀本

廣註尺牘自修讀本

廣註古今詩自修讀本

廣註古文觀止讀本

各體習字自修範本

新文精華

四冊

三冊

三冊

一冊

二冊

二冊

二冊

二冊

二冊

二冊

二冊

十三冊

十冊

四冊



南京中醫藥大學圖書館藏

● 世界書局出版書目 ●

最近醫書

醫學南針

一厚冊 七角

編新 葉天士醫案

二厚冊 九角

編新 葉天士女科醫案

一冊 四角

編新 葉天士幼科醫案

一冊 四角

編新 薛生白醫案

一冊 四角

葉天士手集秘方

一厚冊 五角

註會 徐靈胎古方新解

二厚冊 八角

補增 單方大全

一厚冊 六角

續刊醫書預告

評加 溫病條辨

四冊 六角

批增 溫熱經緯

四冊 六角

編新 吳鞠通醫案

二冊 五角

編新 王潛齋分類醫案

二冊 六角

醫學南針續編

一厚冊 八角

柯韻伯傷寒三書

一冊 五角

註廣 素靈類纂

三冊 一元



增補
重編
葉天士醫案卷三

(一) 腫脹

朱某初因面腫邪干陽位氣壅不通二便皆少桂附不應即與導滯滯屬有質濕熱無形入肺為喘乘脾為脹六腑開合皆廢便不通爽溺短渾濁時或點滴視其舌終口渴臍病背脹臍病腹滿更兼倚倒左右腫脹隨着處為甚其濕熱布散三焦明眼難以決勝矣經云從上之下者治其上又云從上之下而甚於下者必先治其上而後治其下此症逆亂紛更全無頭緒皆不辨有形無形之誤姑以清肅上焦為先

飛滑石 錢半

大杏仁 去皮尖十粒

生苡仁 錢三

白通草 錢一

鮮枇杷葉 刷淨毛去筋手內揉與三

茯苓皮 錢三

淡豆豉 錢半

黑山梔殼 錢一

急火煎五分服

此手太陰肺經藥也肺氣室塞當降不降杏仁微苦則能降滑石甘涼滲濕解熱苡仁通草淡而滲氣分枇杷葉平涼能開肺氣茯苓用皮謂諸皮皆涼梔豉宣其陳腐鬱結凡此氣味俱薄為上焦藥倣齊之才輕可去實之義

陳某進神芎導水丸二日所下皆粘膩黃濁形色余前議臍氣室塞水濕粘滯濁攻犯肺為痰嗽水漬脉隧為浮腫大凡經脈六腑之病總以宣通為是內經云六腑以通為補今醫不分臟腑經絡必曰參朮是補豈為明理然肢節足跗之濕出路無由

戊己丸局方

川芎連妙

吳茱萸妙

白芍妙

芍藥妙

生白朮妙

必鍼刺以決其流。此內外真可皆安。戊己丸三錢。用二日後。再進前藥一服。

陳三診脈。右大而緩。左如小數促。冬季寒熱身痛。汗出即解。自勞役飢飽。嗔怒之後。

病勢日加。面浮足腫。呼吸皆喘。目淚鼻衄。卧著氣衝欲起。食納留中不運。時序交夏。

脾胃主候。靚色脈情形。中滿脹病日來矣。蓋此症屬勞倦致損。初病即在脾胃。東垣

云。胃為衛之本。脾乃營之源。臟腑受病。營衛二氣。晝夜循環失度。為寒為熱。原非虛

邪。半表半裏之症。斯時若有明眼。必投建中而愈。經言。勞者溫之。損者益之。建中甘

溫。令脾胃清陽自立。中原砥定。無事更遷。仲景亦謂。男子脈大為勞。則知內經東垣

仲景垂訓。真規矩準繩至法。且汗泄積勞。都是陽傷。醫藥辛走劫陽。苦寒敗胃。病人

自述。飲蔗即中脘不舒。頃之少腹急痛。便稀。其胃陽為苦辛大傷。明甚。又述咳頻衝

氣。必自下上逆。夫衝脈隸於陽明。胃陽傷極。中乏坐鎮之真氣。衝脈動。則諸脈皆動。

濁陰散漫上布。此卧著欲起矣。愚非遙指其脹。正合內經濁氣在上。則生腹脹。太陰

所至為腹脹相符也。昔有見瘵休治瘵。見血休治血。當以病因傳變推求。故辨論若

此

厚朴 杏仁 人參 茯苓 蜜蠟薑 南棗

厚朴杏仁取其能降氣。參苓薑棗取其建立胃中之清陽。而和營衛也。

某五食穀不運。臍脹嘔惡。大便不爽。脈弦色黃。此胃陽式微。升降司失使然。法當溫



通陽氣。

吳萸

分半夏

錢三華撥

錢一淡乾薑

錢一生薑汁

分五廣皮白

半錢

脈沈屬水。初因食物之滯。繼為下奪太速。脾陽頓傷。氣窒濕聚。為腫脹矣。

大腹皮

茯苓皮

厚樸

豬苓

澤瀉

老薑皮

新會皮

陳某壯盛年歲。形消色奪。診脈右小促。左小弦勁。病起上年秋季。腕中卒痛。有形梗

突。病後陡遇驚觸。漸次食減不適。食入不運。停留上脘。腹形脹滿。甚則脇肋皆脹。四

肢不暖。暮夜漸溫。大便旬日始通。便後必帶血出。清早未食。自按臍上氣海。有瘕形

甚小。按之微痛。身動飲水。寂然無踪。天氣稍冷。爪甲色紫。細推病屬肝脾氣血不通。

則為鬱遏。久則陽微痺結。上下不行。有若否卦之義。閱醫藥或消或補。總不見效者。

未知通陽之奧耳。

薤白

桂枝

瓜蒌仁

生薑

半夏

茯苓

又。薤白汁

桂枝木

瓜蒌仁

川棟子皮

半夏

茯苓

歸鬚

桃仁

延

胡薑汁

二汁法丸

吳某平昔濕痰阻氣為喘。茲因過食停滯。陰臟之陽不運。陽腑之氣不通。二便不爽。跗腫腹滿。診脈沈浮。是由水寒痰滯。阻遏氣分。上下皆不通調。當從三焦分治。頃見案頭一方。用兔絲子升少陰。吳茱萸泄厥陰。不知作何解釋。不敢附和。仍用河間分

消定議。

大杏仁

萊菔子

猪苓

澤瀉

葶藶子

厚朴

桑白皮

廣皮

細木通

又三焦分消。泄肝通腑。二便不爽如昔。診脈浮小帶促。聞聲呼吸不利。是氣分在火結阻。以致中下不通。喘脹要旨。開鬼門以取汗。潔淨腑以利水。無非宣通表裏。務在治病源頭。據脈症參詳。急急開上為法。合金匱風水反登義矣。

麻黃

杏仁

石膏

甘草

苡仁

倪樞濕熱脚氣。上攻心胸。腕中滿脹嘔逆。乃濕上甚為熱化。與苦辛先平在上之滿脹。用瀉心法。

川連

黃芩

枳實

半夏

薑汁

杏仁

汪某腫自下起。脹及心胸。遍身肌膚赤癰。溺無便滑。濕熱蓄水。橫瀆經隧。氣機閉塞。呻吟喘急。濕本陰邪。下焦先受。醫用桂附芫朮。邪蘊化熱。充斥三焦。以至日加凶危也。

川通草

錢半

海金沙

錢五

黃柏皮

錢半

木猪苓

錢三

生赤豆皮

錢半

真北細辛

分一

又前法腫消三四。仍以分消。

川白通草

猪苓

海金沙

生赤豆皮

葶藶子

茯苓皮

晚蠶沙

又間日寒戰發熱。渴飲。此為瘧。乃病上加病。飲水結聚。以下痛脹。不敢用涌吐之法。



暫與開肺氣壅遏一法。

大杏仁 蜜炒麻黃 石膏

又濕邪留飲。發紅瘰。胸聚濁痰。消渴未已。用木防已湯。

木防已

錢一

石膏

者三錢少

杏仁

錢三

苡仁

錢二

飛滑石

半錢

寒水石

錢一

通草

煎湯代水。

楊六味過辛酸。脾胃氣傷。結聚。食入則脹滿。曾服礞石大黃丸。滯濁既下不愈。並不在乎腸中。前賢治脹治滿。必曰分消。攻有形不效。自屬氣聚為瘕。疎胃宜清。調脾當暖。此宗前賢立法。

生茅朮

廣皮

丁香皮

黃柏

草豆蔻

川黃連

厚朴

茯苓

澤瀉

水法丸。

秦某兩年初秋發瘍。脈絡氣血。不為流行。而腹滿重墜。卧則頗安。臍左動氣。卧則尤甚。吐冷沫。常覺冷氣。身麻語塞。肝風日熾。疎泄失職。經以肝病吐涎沫。木侮土位。自多腹脹。丹溪云。自覺冷者。非真冷也。兩次潰瘍之後。剛燥熱藥。似難進商。議以宣通肝胃為治。有年久恙。貴乎平淡矣。

雲茯苓

錢三

三角胡麻

十次

漆水洗

厚橘紅

錢一

嫩鉤藤

錢一

熟半夏

炒

黃一

白旋覆花

錢一

濾清服一杯

四帖

又接服大半夏湯。

熟半夏

錢炒二半

雲苓

五錢小塊

薑汁

四錢調服

人參

同煎錢

方五診脈百至。右緩濇。左弦勁。始而腸鳴泄氣。由漸腹滿臍脹。納食幾廢。便難溺少。此皆情懷少曠。清氣不轉。肝木侵侮胃土。胃陽窒塞。脹滿日甚。據云先因胃脘心下痛症。氣鬱顯然。非旦晚圖功之象。議河間分消法。

杏仁

厚朴

海金沙

陳香櫟

鬱金

萊菔子

木通

王七食入不運。腕中臍脹。病由悒鬱。經年不愈。視色黃形瘦。按脈小而濇。喜涼飲。惡熱。大便未經通調。九竅不和。皆胃病矣。

川連

雞肫皮

枳實

廣皮

桔梗

瓜蒌實

半夏

萊菔子

鬱金

杏

仁

薑汁

竹瀝

楊四肝鬱乘胃為脹。經年內結有形。用緩消一法。

生茅朮

雞肫皮

川連

生厚朴

淡薑渣

針砂

梨

椒目湯法丸

畢某濕熱由腑滯及腸中。大便不爽。食入不適。平昔肝木易動。厥陰不主疎泄。少腹形脹。無非滯氣之塞。久則凝瘀日踞。

小溫中丸三錢十服。

程三脈右弦。面黃腹滿。按之漉漉有聲。每大便先腹痛。便不能乾爽。此胃氣不降。陽

氣自滯。由乎嗔怒不息。肝木橫逆。疎泄失司。膜脹之來。皆由乎此。議泄肝通腑。濁宣脹減之義。

杏仁 紫厚朴 猪苓 鬱金 椒目 檳榔汁 接服小溫中丸

某五不飢不運。小腹胃脘悉滿。診脈左弦。乃肝木犯胃。二腑不主流行。濁陰漸次瀰漫。他日單脹之作。竟有難以杜患者。速速戒惱怒。安閒自在。誠治斯疾之良圖。

小溫中丸一錢五分。開水送下。

夏夏四月脾胃主氣。嗔怒怫鬱。無不動肝。肝木侮土。而脾胃受傷。鬱久氣不轉舒。聚而為熱。乃壯火害氣。宜乎減食腹脹矣。當作木土之鬱調治。桂附治熱。黃地滋滯。鬱熱益深。是速增其病矣。

鈎藤 丹皮 黑山梔 川連 青皮子 紫厚朴 萊菔子 廣皮白 薄荷梗

又脹勢已緩。脈來弦實。此濕熱猶未盡去。必淡泊食物。清肅胃口。以清滲利水之劑。服五六月再議。

猪苓 澤瀉 通草 海金沙 金銀花 茯苓皮 黑穠豆皮

又診脈浮中沈。來去不為流利。氣阻濕鬱。膠痰內著。議用控涎丹六分。緩攻。又服控涎丹。大便通而不爽。診右脈弦實。目黃舌燥。中焦濕熱不行。因久病神倦。不

敢過攻。議用丹溪小溫中丸。每服三錢。乃泄肝通胃。以緩治其脹。謝某形神勞煩。陽傷腑氣不通。疝瘕陰濁。從厥陰乘犯陽明胃。為陰濁蒙閉。腸中氣窒日甚。年前邪勢頗緩。宣絡可效。今閉錮全是濁陰。若非辛雄剛劑。何以直突重圍。脹滿日增。人力難施矣。

生炮川烏頭 生淡川附子 淡乾薑 淡吳萸 川棟子 小茴香 豬膽汁

浦如腎氣丸五苓散。一攝少陰。一通太陽。濁泄溺通。腹痛日減。不為錯誤。但虛寒脹滿。而用溫補。閱古人調劑。必是通法。蓋通陽則濁陰不聚。守補恐中焦易鈍。喻氏謂能變胃而不受胃變。苟非純剛之藥。曷勝其任。議於暮夜服玉壺丹五分。早進

人參 半夏 薑汁 茯苓 枳實 乾薑

陳二老人脾傷陽衰。午後暮夜陰氣用事。食納不適。腸鳴腹脹時泄。治法初以剛劑。俾陰濁不僭。陽乃復辟。

人參 錢半 淡附子 錢一 淡乾薑 錢八 茯苓 錢三 炒兔絲 錢三 胡盧巴 錢一

此治陽明之陽也。若參入白朮甘草。則兼走太陰矣。

某七腫脹由足入腹。診脈細軟。不能運穀。當治少陰太陰。

生白朮 厚朴 茯苓 淡附子 淡乾薑 華撥

馬六暮食不化。黎明瘕泄。乃內傷單脹之症。脾腎之陽積弱。據理當用腎氣丸。

顧三四脈微而遲。色衰萎黃。蠅為介屬。鹹寒沈降。凡陽氣不足者。食之損陽。其致病之由。自試二次矣。久利久泄。古云無不傷腎。今浮腫漸起自下。是水失火而敗。若非緩下。徒見瀉泄有紅。為脾胃濕熱。必致中滿敗壞。

生茅朮 熟地炭 熟附子 淡乾薑 茯苓 車前

某脾胃虛寒多瀉。由秋冬不愈。春木已動。勢必剋土。腹滿小便不利。乃腫病之根。若不益火生土。日吃疲藥。焉能却病。

人參 白朮 附子 生益智 兔絲子 茯苓

姚四據說情懷不適。因嗔怒痰嗽有血。視中年形悴肉消。漸漸腹脹跗腫。下午漸甚。陽氣日奪。早服腎氣丸三錢。晝服五苓散。

殷氏行動氣墜於下。卧著氣擁於上。此跗腫晝甚。頭脹夜甚。總是中年陽微最有腹大喘急之事。濟生九十服。

某躬耕南畝。曝於烈日。漬於水土。暑濕內蒸。為瀉痢。邪去正傷。臨晚跗腫腹滿。乃脾陽已困。諸氣不司運行。濁陰漸爾竊據。內經病機。諸濕腫滿。皆屬於脾。

生白朮 草薢 茯苓 厚朴 附子 澤瀉

鄒三深秋霍亂轉筋。必有暴冷傷及脾胃。病機一十九條。河間皆謂熱。亦屬偏見。愈泄愈脹。豈是實症。夫酒客之濕。皆脾胃陽微不運。致濕邪凝聚。氣壅成脹。見脹滿輒



南京中醫藥大學圖書館藏

投攻下。不究致病之因。故曰難調之症。

生白朮 草果 熟附子 厚朴 廣皮 茯苓

陳^四苦寒多用。胃陽久傷。右脇痛。嘔酸濁。皆濁陰上干。用辛甘溫中。補虛痛減。病火
述早上腹寬。暮夜氣緊微硬。大便不爽。有單腹脹之憂。

人參 生白朮 茯苓 肉桂 歸身 益智 廣皮 煨薑

趙^五胸腹脹滿。久病痰多。

生白朮^{兩二} 茯苓^{兩二} 厚朴^{兩一} 肉桂^{錢五} 薑汁^丸

本草云。厚朴與白朮能治虛脹。仿潔古枳朮之意也。佐茯苓通胃陽。肉桂入血
絡。則病邪可却矣。

楊某脈沈小弦。中年已後。陽氣不足。痰飲水寒。皆令逆趨。致運納失和。漸有脹滿浮
腫。法以辛溫宣通。以本病屬脾胃耳。

人參^{錢一} 茯苓^{錢三} 白芍^{錢半} 淡附子^{錢一} 薑汁^{三分}

倪^二腹奕膨。便不爽。膈陽不行。

生益智 茯苓 生穀芽 廣皮 砂仁殼 厚朴

又六腑不通爽。凡濁味食物宜忌。

雞肫皮 麥芽 山查 砂仁 陳香櫟



南京中醫藥大學圖書館版權所有

又脈沈小緩。早食難化。晚食夜脹。大便不爽。此臍陽久傷。不司流行。必以溫藥疎通。忌食閉氣粘葷。

生白朮 附子 厚朴 草果 茯苓 廣皮白 檳榔汁

僧四俗語云。膏梁無厭發癰疽。淡泊不堪生腫脹。今素有脘痛氣逆嘔吐。漸起腫脹。乃太陰脾臟之陽受傷。不司鼓動運行。陰土宜溫。佐以制木治。

生於朮 茯苓 廣皮 椒目 厚朴 益智仁 良薑

某七左脈弦。脹滿不運。便泄不爽。當溫通脾陽。

草菓仁 錢一 茯苓皮 錢三 大腹皮 錢三 廣皮 半錢 青皮 錢一 厚朴 半錢 木猪苓 錢一

椒目 分五

唐氏 紫苑 杏仁 通草 鬱金 黑山梔

又三焦不通。脘脾腹脹。二便不爽。前方用開手太陰肺。苦辛潤降。小溲得利。兼進小溫中丸。泄肝平胃。脹勢什減有五。但間日寒熱復來。必是內鬱之氣。陽不條達。多寒戰慄。議用四逆散和解。其小溫中丸仍用。

生白芍 枳實 柴胡 黃芩 半夏 杏仁 竹茹 生薑

張軀腹膨脹。大便不爽。得煖氣稍快。乃陽氣不主流行。蓋六腑屬陽。以通為補。春木地氣來升。土中最畏木乘。勢猖熾。治當泄木安土。用丹溪小溫中丸。每服三錢。



南京中醫藥大學圖書館版權所有

張氏用鎮肝逆理胃虛方法。脈形小弱。吐涎沫甚多。仍不納穀。週身寒凜。四肢微冷。皆胃中無陽。濁上僭踞。而為膜脹。所謂食不得入。是無火也。

人參 吳萸 乾薑 附子 川連 茯苓

丁三噴怒氣血逆亂。右脇不和。夜食噎噤。膜脹。乃肝胃病。治以解鬱宣通氣血。

鈎藤 丹皮 桑葉 生香附 茯苓 神麴 降香末 炒黑查肉

徐某平素肝氣不和。脇肋少腹膜脹。氣血不調。痰飲漸聚。厥陰陽明同治。

桃仁 延胡 歸尾 小茴 香附 半夏 茯苓 橘紅 神麴

馬三脈實。久病瘵熱在血。胸不爽。小腹墜。能食不渴。二便濇少。兩進苦辛宣臍。病未
能却。此屬血病。用通幽法。

桃仁 郁李仁 歸尾 小茴 紅花 製大黃 桂枝 川棟子

又晝日氣墜少腹。夜卧不覺甚。則頭昏胸悶。今年五月初用疎滯。繼通三焦。續進通
幽。其墜脹仍若。議辛香流氣法。

川棟子 延胡 小茴 黑山梔 青木香 橘核 生香附磨汁法丸

董某初因下血轉痢。繼而大便秘艱。自左脇下有形。漸致脹大堅滿。小便自利。病在
血分。久病兩年。氣短。不敢峻攻。若五積成例。議用古禹餘糧丸。每日一錢。

鄭氏得食腹痛。上及心胸。下攻少腹。甚至筋脹。擾於周身。脈絡之間。大便欲解不通。



暢。此乃腸胃氣阻。故痛隨利減。神保丸一錢。

張某脈左弦。右浮濇。始因脘痛貫脇。繼則腹大高凸。納食減少難進。二便艱濇不爽。此乃有年操持。紫慮太甚。肝木怫鬱。脾土自困。清濁混淆。脹勢乃成。蓋臟真日納。腑陽不運。考古治脹名家。必以通陽為務。若滋陰柔藥。微加桂附。凝陰汙濁。豈是良法。議用局方禹糧丸。暖其水臟。攻其穢濁。俟有小效。兼進通陽剛補。是為虛症內傷。脹滿治法。至於攻瀉剋奪。都為有形而設。與無形氣傷之症不同也。局方禹餘糧丸。陳軀久鬱。傷及脾胃之陽。面無華色。納粥欲嘔。大便溏泄。氣陷則跗腫。氣呆則脘悶。有中滿之憂。用治中法。

人參 生益智 煨薑 茯苓 木瓜 炒廣皮

程女脈數。惡心脘脹。

炒半夏 廣皮 霍香黃連一分煎水拌 茯苓 鬱金

又暑傷脾胃。則肝木犯土。左腹膨泄瀉。

人參 厚朴 廣皮 炒澤瀉 茯苓 木瓜 炙草 炒查肉

又 人參 炒柴胡 炒白芍 炒黃芩 茯苓 炙草 生薑 大棗

宋某食入脘脹。此屬胃病。視色蒼形瘦。自述飲酒嘔吐而得。又述耳鳴肉瞤。是木火犯中。鬱勃病甚。議用逍遙減白朮。合左金方。