

名醫類案卷第十二

新都篁南江瓘集

後學

仁和余錢塘魏之秀玉橫

仁和沈煥敷曾

重校

歛

鮑廷博

以文

仁和余錢塘魏之秀玉橫
集容裳

煥敷曾

胎毒

東陽陳叔山小男二歲得疾下利常先啼日以羸困問華佗
佗曰其母懷軀陽氣內養乳中虛冷兒得母寒故令不時
愈佗與四物女宛丸十日卽除

三國志

東垣云一人中年以來得一子一歲之後身生紅絲瘤不救
後四子至一二歲皆病瘡而死問何緣致此翌日思之謂

曰汝乃腎中伏火精中多有紅絲以氣相傳故生子有此疾俗名胎癟是也汝試觀之果如其言遂以滋腎丸數服以瀉腎中火邪補真陰之不足忌酒肉辛熱之物其妻以六味地黃丸養其陰血受胎五月之後以黃芩白朮作散與五六服後生子前症不作

丹溪治一兒二歲滿頭有瘡一日瘡忽自平遂患痰喘詢其母孕時喜食辛辣熟物視其子精神昏倦受病特深知其爲胎毒也解利藥大非所宜遂以人參連翹黃連生甘草陳皮川芎白芍木通濃煎入竹瀝與之數日而安

一婦形瘦性急身本有熱懷妊三月適夏暑口渴思水時發

小熱遂教以四物湯加黃芩陳皮生甘草木通因懶於煎煮數貼而止其後生子二歲瘡癰遍身忽一日其瘡頓愈遂成瘻瘍此亦胎毒也瘍若再作病必自安已而果然若於孕時確守前方何病之有

一女得癩遇陰雨則作遇驚亦作口吐涎沫聲如羊鳴此胎受驚也其病深痼須調半年可安仍須淡味以助藥力與燒丹丸繼以四物湯入黃連隨時令加減果半年而愈

一人連年病瘍後生二子三月病左脇下陽明少陽之間生一癩甫平右腋下相對又一癩膿水淋漓幾死醫以四物湯敗毒散數倍加人參以香附爲佐犀角爲使大料乳母

三月而愈踰三月忽腹脹生赤疹如霞片取翦刀草汁調
原蠶砂敷隨消又半月移脹入囊爲腫黃瑩裂開二丸顯
露水出以紫蘇葉盛桴炭末托旬餘而合

一子年十六生七箇月得淋病五七日必一作其發則大痛
水道方行下如漆和粟者一盞方定脉之輕則濇重則弦
視其形瘦而長青而蒼意其父必服固下部藥遺熟在胎
畱於子之命門而然遂以紫雪和黃柏末丸梧子大曬極
乾湯下百丸半日又下二百丸食壓之又半日痛大作連
腰腹水道乃行下漆和粟者碗許痛減十之八後與陳皮
一兩桔梗木通各半兩又下合許而安父得燥熱尚能病

子況母得之者乎。

一小兒胎受熱毒。生下兩目不開。燈心黃連秦皮木賊棗各五錢水一盞煎澄清頻洗而開。

程仁甫治一兒一歲之內大便三四十日只通一次每次通時腹脹盛此乃胎毒熱結所致用元明粉米飲調下一錢三五次之後再不復秘矣。

薛已治少叅史南湖孫乙未生丙申正月陰囊赤腫薛作胎毒治之而瘥後患發熱痰盛等症診其母有鬱火血熱用解鬱涼血之藥子母俱服而愈至六月初患吐瀉小便赤澁兩眼瞤動投參术之類不應或以爲慢驚欲用附子之

藥請薛議視其寅卯關脉赤此風熱傷脾用柴胡清肝散加釣鉤藤木賊草一劑卽愈至丁酉正月初旬頸患熱毒潰而膿出感風發熱翌日頭面黯腫如斗大兩耳厚寸許此風熱上攻血得熱而然急砭兩額出黑血二盞許次砭面額亦如之隨用清熱化毒湯腫黯十退七八翌日又砭各處血不甚黑乃止仍用前藥去牛蒡子加熟地黃而愈此症若砭緩則血凝滯或爲破傷風皆致死

劉欽天之子腿如霞遊走不定先以麻油塗患處砭出惡血其毒卽散用九味解毒散一劑而安

一小兒患之外勢雖輕內苦便閉此患在臟也服大連翹飲

敷神功散而瘥

胎晕

江晉南治一兒產數日常昏暈一日五六見醫作驚風治不效江以大補氣血之劑濃煎湯喂之并飲乳母多服漸減而愈

臍風

樞密孫公朴生子數日患臍風已不救家人乃盛以盤合將送諸江道遇老嫗曰兒可活卽與俱歸以艾灸臍下卽活

江應宿曰。凡兒臍風。須看牙齦有水泡點。如粟粒。以銀針挑破出污血。或黃膿少許而愈。

又一法。以熱水蘸綿子。包指擦之。輕挖破。以金頭蜈蚣灸。未敷之。仍以厚衣包裹。納母懷中。取大汗出而愈。再服歸命散解之。

近來江南臍風之症最多。蓋由赤子落臍之時。不慎照顧。風邪流入心脾。五七日而發。面青口撮。吐白沫。倉卒急迫。失救。遂致夭折。急用蒜一兩。搗捏作餅子。納于臍上。以艾火灸五七壯。以拔出風邪。仍用艾茸。或綿子。如

錢大一塊貼於臍上外以膏藥封之兼行前二法爲妙。

必有青筋發在腹有二道生又以艾灸
絕截住又頭稍遲則上行攻心而死

撮口臍風方

生川烏尖三個爲末全足蜈蚣半條酒浸
炙爲末加麝香少許吹鼻得嚏乃以薄荷

湯灌

一匙

腎縮

思村王氏之子生七日兩腎縮。一醫云、硫黃茱萸研大蒜塗其腹。仍以茵草蛇牀子薰之愈。蓋初受寒氣而然也。瑣碎錄

咯血

錢氏治段齋郎子四歲病嗽。身熱吐痰數日而咯血。醫以桔梗湯及防已丸治之不效。其涎上攻。吐喘不止。錢用福銀丸一大服下之。復以補肺散治之。醫曰：今咯血肺虛。何以下之？曰：肺雖咯血。有熱故也。久則虛痿。今涎上潮而吐。當下其涎。若使不吐。涎爲甚便也。蓋吐涎能虛。又生驚也。痰實上攻。亦使發搐。故依法只宜下痰。後補脾肺。必涎止而吐愈。若先補其肺。爲逆。先下其痰。爲順。先下後補。爲良也。

熱症

錢仲陽治朱氏一兒五歲。忽發熱。醫曰：此心熱也。腮赤而唇

紅煩燥引飲。遂用牛黃丸三服。以一物瀉心湯下之。來日不愈。反加無力而不能食。又下之。便利黃沫。錢曰。心經虛而畱熱在內。必被攻藥下之。致此虛勞之病也。先用白术散。生胃中津液。後以生犀散治之。宜參連並用朱曰。大便黃沫。

如何曰。胃氣正。則瀉自止。此虛熱也。朱曰。醫用瀉心湯。如何錢曰。瀉心湯者。黃連一物耳。性寒。多服則利。能寒脾胃也。諸醫皆曰實熱。何以瀉心湯下之不安。又加面黃頰赤。五心煩躁。不食而引飲。醫曰。既虛熱。何以大便黃沫。錢笑曰。便黃沫者。服瀉心湯多也。因與胡黃連丸而愈。

鄭人齊郎中子忽臟熱。自取青金膏三服。併一服而餌之。至

三更瀉五行。其子困睡。齊言子睡中多驚。又與青金膏一服。又利三行。加口乾而身熱。齊言尚有微熱未盡。又與青金膏一服。其妻曰。用藥十餘行未安。恐生他病。錢曰。已成虛羸。先多煎白术散。時時服之。後服香朮丸。十三日愈。朱氏子五歲。夜發熱。曉卽如故。醫有作傷寒治者。有作熱治者。以涼藥解之。不愈。其候多涎而喜睡。他醫以鐵粉丸下。涎其病益甚。至五日大引飲。錢曰。不可下之。乃取白术散一兩。煎藥汁三升。使任意取足服。朱曰。飲多不作瀉否。錢曰。無生水。不能作瀉。縱多不足怪也。但不可下耳。朱曰。先治何病。錢曰。止瀉治痰。退熱清神。此藥是也。至晚服盡。錢

視之曰更可服三升。又煎白术散三升。服盡得稍愈。至第三日。又服白术散三升。其子不渴無涎。又投阿膠散二服而安。

一兒感冷。身大熱惡寒。此有表症。用發汗藥。汗出遂涼。過一日復熱。醫謂表解裏未解。驗之。服四順飲子。利動藏府。一行。遂涼。隔一日。又復熱。醫云。經熱未解。驗之。小便赤。故知心熱未解。服生氣湯。遂涼。過二日。又熱。醫云。脉已和。非病也。旣發汗。又利大小便。其兒已虛。陽氣無所歸。皆見於表。所以身熱。以和胃氣藥。如六神散之類。加烏梅煎。令微覺有酸味。收歸其陽氣。自此全愈。

此表裏俱虛氣不歸元而陽浮于外所以再發熱非熱症也

東都張氏孫九歲病肺熱他醫以犀角龍麝生牛黃治之一月不愈其症喘嗽悶亂飲水不止全不能食錢用史君子丸益黃散張曰本有熱何以又行溫藥他醫用涼藥攻之一月尚未效錢曰涼藥久則胃寒不能食小兒虛不能食當補脾候飲食如故卽瀉白散瀉肺經病必愈矣服補脾藥二日其子欲飲食錢以瀉白散瀉肺遂愈七分張曰何以不虛錢曰先實其脾然後瀉肺故不虛也

程明祐治一兒病日晡時熱衆皆以爲陰虛火動法不治程

診之曰。兒氣方息。日以生陰。固無緣虛也。火之動。食飲積胃。蘊蒸宿結。則隆隆而熱。遂宣洩輸瀉之。其病忽已。

薛已治李閣老子潮熱。飲食如故。自申酉時。甚至子丑

膀胱腎

時方止。遍身似疥。肺主皮毛大便秘結。小便赤澁。熱渴飲冷。薛

以爲脾胃實熱。傳於肺與大腸。先用清涼飲四劑。結熱始退。又用四物柴胡黃連數劑。其瘡漸愈。彼欲速效。另用槐角丸之類。諸症益甚。仍以前藥。更加桃仁赤芍。至百劑而

愈。

江篁南治一兒。生方兩月。時值酷暑。又久雨溼冷。流行遍身大熱。然初生小兒。腸胃脆窄。藥難區處。乃取乾壁土。春碎。

撒地上。上以芭蕉葉鋪之。將兒臥葉上。又以芭葉覆之。更少加乾壁土于上。睡少時其熱如失。

寒症

東垣治一小兒二歲時初冬患大寒症。明堂青脈額上青黑。腦後青絡高起。舌上白滑。喉鳴而喘。大便微青。耳尖冷。目中常淚下。仍多眵。胸中不利。臥而多驚。無搐則寒。以黃柏陳皮葛根連翹蠍稍炙草已上各一分升麻黃芪柴胡各二分歸身麻黃各三分吳萸生地黃各五分名曰補陽湯。咬咀都作一服水一大盞半煎至六分乳食後熱服服後

愈

癥爲潮熱

錢仲陽治曹氏子三歲面黃時發寒熱不飲食而飲水及乳不止衆醫以爲潮熱用牛黃丸麝香丸不愈及以止渴乾葛散服之反吐錢曰當下白餅子主之後補脾乃以消積丸磨之此乃癥也後果愈夫何故但飲水者食伏于脘內不能消致令發寒熱服止渴藥吐者藥冲脾故也下之卽愈

江應宿治一幼女發熱咳嗽似乎傷風服解表發汗藥熱不