

蘭臺軌範

徐氏八種

卷十



卷五湯方目

五
卷
五

麥冬湯

桂枝加厚朴杏子湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

定喘湯

皺肺丸

清燥救肺湯

以上喘

雞矢醴方

防已茯苓湯

甘草麻黃湯

麻黃附子湯

桂枝

去芍藥加麻黃細辛附子湯

枳朮湯

蒲灰散

已椒

薤黃圓

牡蠣澤瀉散

大腹水腫方

麻豆湯

十水丸

舟車神祐方

大聖濟川丸

木香散

葶藶丸

療水病洪腫氣脹不消食方

療患氣兼水身

面腫垂死方

五香散

五皮散

治蠱脹方

敷

藥

沉香琥珀丸

調榮飲

烏鯉魚湯

小胃丹

煨腎散

禹餘糧丸

以上服
脹水腫

甘草乾薑湯

桂枝湯

芍藥加皂莢湯

韋莖湯

桔梗白散

以上
肺痿

血枯方

柏葉湯

瀉心湯

滋血潤腸湯

治吐血百治不瘥

療十疔瘰癧不傳方

犀角地黄湯

犀角地黄湯

四生丸

白芨枇杷丸

皮膚血汗方

汗血方

諸竅出血方

療舌上出血如孔鑽者

療舌血不止

紫霜丸

療齒斷血出

療酒醉牙齒涌血

雄

黃麝香散

治牙縫出血

黃連散

療滿口齒血出

治牙宣方

療鼻瀝血三升氣欲絕方

茅花湯

地黃散

療淋血方

療小便出血方

瞿麥散

神效方

髮灰散

玉屑散

鹿角膠丸

黃土

湯

赤小豆當歸散

牛角鰓灰散

猪臟丸

又

猪臟丸

以上諸血

茱萸湯

生薑瀉心湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏薑湯

猪苓散

大半夏湯

大黃甘草

湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

生薑半夏湯

半夏

乾薑散

葛根加半夏湯

橘皮湯

橘皮竹茹湯

黃連湯

昆布丸

關格不通方

千金理諸噎方

又方

中風客熱噦方

嘔噦方

消穀丸

卒噦

廣濟枳榔散

崔氏方

深師治噎方

胃方

丁香柿蒂湯

治冷呃方

撞氣阿魏丸

以上

嘔吐
溫脾湯

訶梨勒丸

香茸丸

固腸丸

附子

理中丸

以上
泄瀉

蘭臺軌範卷五

吳江徐靈胎洄溪著

男 熾鼎和校

喘

素問

經脉別論夜行則喘出於腎滯氣病肺有所墮恐喘出於肝滯氣
害脾有所驚恐喘出於肺滯氣傷心度水跌仆喘出於腎與骨當
是之時勇者氣行則已怯者則着而爲病也 陽明脉解篇陽明
厥則喘而惋惋則惡人帝曰或喘而死或喘而生者何也岐伯曰
厥逆連臟則死連經則生 脉要精微論肝脉搏堅而長因血在



南京中医药大学图书馆藏

脇下令人喘逆 逆調論腎者水臟主津液主臥與喘也此句又為喘之

總訣生氣通天論因於暑汗煩則喘喝靜則多言 陰陽別論陰爭

於內陽擾於外魄汗未藏四逆而起起則熏肺使人喘鳴 水熱

穴論水病者下為肺腫大腹上為喘呼不得臥者標本俱病故肺

為喘呼腎為水腫肺為逆不得臥

金匱

上氣面浮腫肩息其脉浮大不治又加痢尤甚

喘方

麥冬湯金匱火逆上氣咽喉不利止逆下氣此主之

麥冬

七升

半夏

一升

人參

甘草

各二兩

粳米

三合

大棗

十二枚

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三夜一服

此即竹葉

石膏湯去竹葉石膏加大棗也專清肺胃之火若火逆甚仍用竹葉石膏為妙

桂枝加厚朴杏子湯

傷寒論

喘家主之

於桂枝湯方內加厚朴

二兩

杏仁

五十個

餘依前法

麻黃杏仁甘草石膏湯

傷寒論

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘

無大熱者此湯主之

麻黃

四兩

杏仁

五十個

甘草

二兩

石膏

半斤碎

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升

去滓溫服一升

即越婢湯加杏仁去薑棗

定喘湯

振生方

治肺寒膈熱哮喘

麻黃

欬冬花

半夏

桑皮

各三錢

蘇子

二錢

仁

一錢五分

白果

二十一枚碎炒

黃芩

甘草

各一錢

右以水煎徐徐服

皺肺丸

治喘

欬冬花

知母

秦艽

百部

去心

紫苑

貝母

阿膠

糯米

炒各一兩

杏仁

另研四兩

右為末將羊肺二具先以水灌洗看容得水多少即更添些煮



杏仁令沸瀝過灌入肺中繫定以糯米泔煮熱研爛成膏搜和

前藥末杵數千下丸梧子大每服五十丸食前桑白皮煎湯下

清燥救肺湯

治贖鬱喘嘔

桑葉

三錢經霜者

石膏

二錢半炒

甘草

一錢

胡麻仁

一錢炒研

阿膠

八分

人參

七分

麥冬

一錢二分

杏仁

七分去皮尖炒黃

枇杷葉

一片去毛蜜炙

右九味以水一碗煎六分頻頻三三次滾熱服

小青龍加石膏湯

越婢加半夏湯

俱見咳嗽

按此二方為喘病之主方其餘眾方意不能外此即有他法必有別因當隨症增減也

麻黃湯

見傷寒

資生腎氣丸

瀉白散

錢乙

黑錫丸

俱見通治



按黑錫丸鎮納元氣爲治喘必備之藥當蓄在平時非一時所能驟合也

臍脹水腫

靈素

靈脹論黃帝問曰願聞脹之舍岐伯曰夫脹者皆在於臟腑之外

四字總括明透排臟腑而郭胸脇脹皮膚故命曰脹帝曰未解其意岐伯

曰夫胸腹臟腑之郭也臆中者心主之宮城也胃者太倉也咽喉

小腸者傳送也胃之五竅者間里門戶也廉泉玉英者津液之道

也故五臟六腑者各有畔界其病各有形狀營氣循脉衛氣逆爲

脉脹衛氣並脉循分爲膚脹

水脹篇黃帝問於岐伯曰水與膚



脹臧脹腸覃石痕石水何以別之岐伯答曰水始起也目窠上微腫如新卧起之狀其頸脉動時欬陰股間寒足脛痠腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也黃帝曰膚脹何以候之岐伯曰膚脹者寒氣客於皮膚之間蹵蹵然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹窅而不起腹色不變此其候也臧脹何如岐伯曰腹脹身皆大與膚脹等也色蒼黃腹筋起此其候也腸覃何如岐伯曰寒氣客於腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫癖而內着惡氣乃起瘕肉内生其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此

其候也石痕何如岐伯曰石痕生於胞中寒氣客於子門子門閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉則留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下陰陽別論云陰陽結邪多陰

少陽曰石水少腹腫

邪氣臧腑病形篇督脉微大為石水起臍

已下至小腹睡睡然上至胃脘死不治

水為有形之物故按之即起膚脹為無形之氣故按

之不起腸覃乃腸外惡氣所結故月事仍下石痕乃胞中惡血所凝故月事不行各有定理也至石水則在少腹之中水結不散之症若臧脹則非氣非水臧腑皮肉俱堅腫邪盛正衰難為治矣

素腹中論黃帝問曰有病心腹滿旦食則不暮食此為何病岐伯

對曰名為臧脹帝曰治之奈何岐伯曰治之以雞矢醴一劑知二

劑已 水熱穴論黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯對
曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脉也故其
本在腎其末在肺皆聚水也 腎者胃之關也關門不利故聚水
而從其類也故凡水病下爲跗腫大腹上爲喘呼不得卧者標本
俱病 氣厥論肺移寒於腎爲涌水涌水者按腹不堅水氣客於
大腸疾行則鳴濯濯如囊裏漿水之病也 陰陽應象大論濁氣
在上則生臌脹

金匱

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脉自浮外

證骨節疼痛惡風皮水其脉亦浮外證肘腫按之沒指不惡風其
腹如鼓不渴當發其汗正水其脉沉遲外證自喘石水其脉自沉
外證腹滿不喘黃汗其脉沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈
必致癰膿 脉浮而洪浮則爲風洪則爲氣風氣相搏風強爲隱
疹身體爲痒痒爲泄風久爲癰氣強則爲水難以俛仰風氣相
擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虛此爲風水不惡風者小便通利
上焦有寒其口多涎此爲黃汗 寸口脉沉滑者中有水氣面目
腫大有熱名曰風水視人之目裹上微腫如蠶新卧起狀其頸脉
動時時咳按其手足上陷而不起者風水 太陽病脉浮而緊注

當骨節疼痛反不疼身體反重而酸其人不渴汗出卽愈此爲風水惡寒者此爲極虛發汗得之渴而不惡寒者此爲皮水身腫而冷狀如周痺胸中窒不能食反聚痛晝躁不得眠此爲黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此爲肺脹其狀如腫發汗卽愈然諸病此者渴而下利小便數者皆不可發汗 裏水者一身面目黃腫其脉沉小便不利故令病水假如小便自利此亡津液故令渴也越婢加白朮湯主之 少陰脉緊而沉緊則爲痛沉則爲水小便卽難脉得諸沉當責有水身體腫重水病脉出者死 夫水病人目下有卧蠶面目鮮澤脉伏其人消渴病水腹大小便不利其脉沉絕

者有水可下之。問曰病下痢後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也答曰此法當病水若小便自利及汗出者自當愈。心水者其身重而少氣不得卧煩而躁其人陰腫。肝水者其腹大不能自轉側脇下腹痛時時津液微生小便續通。肺水者其身腫小便難時時鴨溇。脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難。腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗乃愈。師曰寸口脉沉而遲沉則爲水遲則爲寒寒水相搏趺陽脉伏水穀不化脾氣衰則驚漇胃氣衰則身腫少陽脉卑