

閔陳修園著

福文堂發兌

醫學從眾錄

連元閣藏板

醫學從衆自序

不爲宰相便爲醫貴之之說也秀士學醫如菜作薺賤之之說也
醫者學本靈素通天地人之理而以保身而以保人本非可賤之
術緣近今崙業者類非通儒不過記問套方希圖倖中揣摩人情
以爲糊口之計是自賤也余向有金匱傷寒各種醫書疊疊數十
萬言先爲醫士治膏盲之疾不曰靈素則曰南陽雖有遵經之志
却非語下之方畏其難者中阻而工於欺人之術者別戶分門遂
多簞鼓而余之汲汲苦心終爲未逮也余觀近今醫士不學者無
論有能讀薛立齋王金壇趙養葵張景岳張石頑李時珍李士材
喻嘉言八家之書卽爲不凡之士尙可與言蓋此八家雖未能合

內經之旨仲師之法而書中獨得之妙亦復不少茲且就世俗所共奉者採其名言錄其方治約數十方而取其一二方約數百言而括以一二言卽間有以誤傳誤與主張太過之處復參他氏斟酌歸於至當顏曰從衆錄簡便易知頗切時用是卽向之所謂醫醫者知其受病已深正治則拒格不入不若從治之爲得也

閩吳航脩園陳念祖題於嵩山精舍

先大父醫學宗長沙一生精力在傷寒論淺注金匱要略淺注等
書復以餘力集長沙辨証之法纂取千金方外臺秘要以下
諸方書爲醫學從衆錄八卷蓋恐專用經方之駭衆特降而
從衆也學者既精傷寒金匱之法進而參究乎斯編則宜古
者亦復宜今此書正不無小補也謹付梓以廣其傳

長孫男 心典 謹識

醫學從眾卷一

閩吳航陳念祖脩園甫著

次男元犀靈石參訂

孫男

心典徽菴

心蘭芝亭

全校字

真中風症

曰真者。所以別乎類也。風者。八方之風邪也。中者。邪之自外入內也。有中經。中府。中藏。中血脉之分。此數句與病機要發明大同小異。各有諸病。余從發明而訂正之。中經外有六經之形症。中府內有便溺之阻隔。中臟者性命危。中血脉者外無六經之形症。內無

便溺之阻隔。先以中經言之。中經者。現出六經形症。太陽頭痛脊強。陽明目痛鼻乾身熱。不得卧。少陽胸滿口苦脇痛耳聾寒熱。太陰自利腹痛。或便難。少陰口渴時厥。厥陰囊縮遺溺。手足厥逆。而面色亦現出五色。可診此中風之淺也。宜小續命湯加減主之。小

續命湯

方見時方

如中風無汗惡寒。依本方。麻黃杏仁防風各加一倍。

宜針至陰出血。

穴在足小指外側爪甲角針二分

崑崙

穴在足外踝後跟骨針透太谿

如中風有汗惡風。依本方。桂枝芍藥杏仁各加一倍。

宜針風府。

穴在頂後入髮一寸針入三分禁灸

已上三症。皆太陽經中風也。

如中風有汗身熱不惡寒。依本方加石膏知母各二錢。甘草再加一倍。去附子。

如中風有汗身熱不惡風。依本方加葛根桂枝黃芩。再加一倍。

宜針陷谷。

穴在足大指次指外間本筋後陷中針入五分。

去陽明之賊。

兼刺厲兌。

穴在足大指次指端去爪甲如韭葉。

瀉陽明之實。

已上二症皆陽明經中風也。

如中風無汗身涼。依本方附子加一倍。乾姜加二倍。甘草加二倍。

宜刺隱白。

穴在足大指內側去爪甲角如韭葉。

去太陰之賊。

此太陰經中風也。

如中風有汗無熱。依本方。桂枝附子甘草各加一倍。

宜針太谿穴在足內踝後跟骨土陷中針透崑崙

此少陰經中風也

如中風六經混淆繫之於少陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁依

本方加羌活連翹

於少陽之經絕骨穴在足外踝上三寸灸五壯以引其熱

○厥陰之井大敦穴在足大指甲聚毛間刺以通其經

此少陽厥陰經中風也

又以中腑言之與傷寒腑症畧同內有便溺之阻隔宜三化湯通之夾有經症宜防風通聖散兩解之

又以中臟言之中臟多滯九竅有唇緩失音耳聾目瞽鼻塞大小

便難之症。或卒倒不省人事。有閉脫之別。

若口開爲心絕。眼合。或上視爲肝絕。手撒爲脾絕。遺尿爲腎絕。汗出如油。聲如鼾睡。爲肺絕。及面赤如粧。脉急大。皆虛極陽脫不治之症。唯以三生飲一兩。加人參一兩。另煎濃汁。調入灌之。或可救十中之一。如牙關緊閉。以烏梅浸醋。擦其牙。痰塞咽喉。以稀涎散吐之。不醒人事。以半夏末吹入鼻中。蓋此法爲通關所設。而藥汁方可灌入。非藉此法吐痰以愈病也。

男元犀按。不省人事。有閉症脫症之辨。二症誤認用藥。則死生立決矣。

內經云。風爲百病之長也。善行而數變。或爲寒中。或爲熱中。如

陽臟之人。素有內火。而風邪中之。則風乘火勢。火借風威。遂卒倒不省人事。牙關緊閉。兩手握固。雖有痰聲。非漉漉之聲。亦無涌起之勢。可用橘皮二兩。半夏一兩。入生羌汁少許煎服。或服後探吐之。隨以滌痰湯。加天麻丹參石菖蒲。入竹瀝羌汁。以開之。如外熱甚。二便閉。可用防風通聖散。及涼膈散。加石菖蒲。遠志丹參。及三化湯之類。表裏兩解之。如陰藏之人。素多內寒。而風邪中之。則風水相遭。寒水徹骨。亦猝倒不省人事。口開手撒。尿出。臍下冰冷。痰聲漉漉。如水沸之勢。急用三生飲。加人參。或用人參二兩。附子一兩。生半夏三錢。煎一鐘。入生羌汁半匙。冬密一蛤蜊殼。灌之。亦有得生者。若以膽南星。及滌痰驅風等藥。

投之如入井而下以石也。

二症愈後語言行動定不能如常。察其水衰火衰。以六味丸八味丸。清早服三四錢。下午服六君子湯。加麥冬三錢。乾桑葉一錢。竹瀝二蛤蜊殼最妙。蓋柔潤熄風爲治風之秘法也。

又以中血脉言之。中血脉者。外無六經之形症。內無便溺之阻隔。非表非裏。邪無定居。或偏於左。或偏於右。口眼喎斜。半身不遂。治之之法。汗下俱戒。唯潤藥以滋其燥。靜藥以養其血。則風自除。宜大秦苑湯主之。或偏於右者。以六君子湯加竹瀝薑汁以補氣。行痰祛風。偏於左者。以四物湯加桃仁紅花竹瀝羌汁天麻羚羊角以補血行血化痰祛風。氣血兩虛者。以八珍湯或十全大補湯加

鈎藤竹瀝薑汁以峻補之

大秦朮湯

秦朮

石膏

生用各一錢半

甘草

川芎

當歸

羌活

獨活

防風

黃芩

白芍

酒炒

白芷

白朮

炒

生地

熟地

茯苓

各一錢

北細辛 三分

水煎服

滌痰湯

卽六君子湯。去白朮加南星、貝實、石菖蒲、竹茹、治中風痰迷心竅、舌強不能言。

口眼喎斜以牽止散主之。又以鱖魚血塗正處牽之便正。

又偏枯症。如樹木枯去一枝。而津液不能周行。灌漑宜六君子湯。如竹瀝等法治之。久可望愈。或以六味丸八味丸入桑寄生五加皮牛膝杜仲以自製虎骨膠爲丸。朝吞五錢。黃酒送下。暮服前湯。可愈。十中一二。

中風四言脉訣

中風浮吉。滑兼痰氣。其或沉滑。勿以風治。或浮或沉。而微而虛。扶元治痰。風未可疎。浮遲者吉。急疾者殂。

各症方藥

三化湯

治中風內有便溺之阻隔

厚朴

大黃

枳實

羌活

名二錢五分

水煎服

喻嘉言曰仲景云藥積腹中不下填竅以熄風後人不知此義每欲開竅以出其風究竟竅空而風愈熾長此安窮哉此方與愈風湯大藜朮湯皆出機要方中云是通真子所撰不知其姓名然則無名下土煽亂後人見聞非所謂一言引眾盲耶

防風通聖散

方見時方

治諸風抽搐手足痙攣小兒驚風大便結邪熱暴甚肌肉蠕動

一切風症

按此表裏通治之輕劑

喻嘉言曰汗不傷表下不傷裏可多服也

祛風至寶膏

卽前方再加人參補氣熟地益血黃柏黃連除熱羌活獨活天
麻細辛全蝎防風蜜丸彈子大每服一丸茶酒任下此中風門
不易之端方也

三生飲

方見時方

薛氏云加人參二兩許駕馭而行庶可驅外邪而補真氣否則
不惟無益適以取敗

稀涎散

治中風口噤單哦雙哦

巴豆仁

六粒每粒分作兩片

牙皂

三錢切片

明礬

一兩

先將明礬化開却入二味攪勻待礬枯爲末每用三分吹喉中

痰涎壅盛者燈草湯下五分

在喉卽吐
在膈卽下

一方半夏十四粒牙皂一箇炙水煎入羌汁服

加味轉舌膏

卽前方加遠志菖蒲防風桔梗犀角川芎柿霜蜜煉丸彈子大

硃砂爲衣

中風續論

古人定病之名必指其實後人旣曰中風如何舍風而別治觀仲
師侯氏黑散風引湯數方自見余此書原爲中人以下立法只取
唐人續命湯一方爲主蓋以各家所列風症頭緒紛繁議論愈深

則愈晦。方法愈多，則愈亂。不如只取一方，以驅邪爲本。庶法一心，純不至多岐反惑。要知此湯長於治外，非風則不可用。是風則無不可用也。至云風爲虛邪，治風必先實竅。此旨甚微，能於侯氏黑散風引湯二方研究十年，而知其妙處，則可與共學適道矣。

侯氏黑散

治大風，四肢煩重，心中惡寒不足者。

外臺治風顛

內經云：邪害空竅。

此則驅風之中兼填空竅。空竅滿則內而舊邪不能容，外而新風不復入。

風引湯

俱見金匱

除熱癰癧

巢氏治脚氣