

痢證滙叅卷之四

海虞吳道源本立纂輯



同里 王式金聲谷評定

劉文思庭輝叅訂

門人 王天瑞希范 同較

龔錫勇天表

下痢大孔腫痛

喻氏云。肛門腫痛。熱流於下也。初病身熱脈洪大宜。

辨其虛實
最是

清之黃芩芍藥湯。久病身冷自汗。宜溫之。理中湯。王肯堂曰。大孔腫痛者。濕熱下流所致。實者清之。黃連黃芩炮薑。脈滑有力。中有熱也。虛寒者溫之。宜養臟湯。專治日久大孔痛。張景岳謂大孔痛者。皆因脾胃不和。則水失其正化。而濁污難堪之味出。諸孔道此痛楚之苦。不能免也。緣火爲痢。陷陽爲陰。逐并逼於下。無從解散。此腫之所由生也。所以痢多則痛多。痛與否亦由氣之陷與不陷耳。故無論冷熱之痢。大孔

識見更爲
透徹

皆能爲痛。不得謂痛盡由熱也。治者但治其痢。痢止則痛自除。亦如治後重之法也。大凡治肛門腫痛。但知火能腫痛。不知元陽之下陷也。丹溪治下痢日久。大孔腫痛。用檳榔。芩連。炮薑之屬。亦分寒熱治之。熱者。艾蠟。訶子。燒烟薰之。寒者。炒熱鹽熨之。又用瓦片敲如錢大。燒紅。淬童便中。急取起。將綿紙包好。熨痛處。其時天寒。恐外寒乘虛入也。參歸陳皮煎湯飲之。

下痢脫肛

脫肛一證。最難爲藥。熱則肛門閉。寒則肛門脫。用磁石爲末。每服二錢。食前米飲調下。外以鐵銹磨湯溫洗之。王肯堂治一老僕。脫肛日久。復下痢。因天氣已寒。衣蓋又薄。寒侵形體。不禁而腸頭下脫者。寒也。滑也。真氣不禁。形質不收。乃血脫也。此乃寒滑氣泄。不固。形質下脫也。當以澀去其脫。而除其滑。以大熱之劑。除寒補陽。兼以補氣之藥。升陽益氣。以微酸之味。固氣上升。名曰訶子皮散。一服減半。再服全安。本事。

此二法最穩

得之行房者爲更重徒用治標藥恐不濟事也

方用酸石榴連皮搗爛塗於臍外以棉蓋之將白布束緊內服補中益氣湯其腸頭自收屢驗

痢後風

因痢後不善調攝或遠行或久未行房而盡力皆下遍體汗流而久病之弱質毫竅疏豁則風邪乘虛內侵皆能致此其症兩腿酸軟腫痛或麻痺不仁或筋脈結促宜用防風湯加羌活秦艽續斷虎骨

痢後枯細

須知痢後
枯細總由
氣血兩虛
調攝不當
所發治者
只開胃健
脾使之飲
食如常而
四體亦如
常矣不必
別生議論
也

枯細之證。此惡血流入經絡。血受濕熱。久而凝滯。所
下未盡。留滯墜道。所以作痢。經久不治。則成枯細。兩
腿肉消。蓋膝腫痛。治宜四物。加桃仁。紅花。牛膝。陳皮。
煎沖入薑汁。服潛行散。再以陳煮酒過口。張三錫曰。
痢後兩腿漸細。不治。則成鶴膝風。用蒼朮二兩。白芍
龜腹版各二兩。鹽水炒黃柏三兩。粥糊丸。以四物湯。
加陳皮。炙草煎湯送下。氣虛加參朮。甚者。用防風湯。
陰虛下痢。

有素患陰虛。偶感寒邪。腹痛下痢。裏急後重。赤白稠
粘。或見血水。發熱夜甚。煩渴不寧。胸中似飢。得食則
脹。治宜清解熱邪。兼滋陰血。庶可保全。設用涼藥攻
積。補氣破氣。治之必死。宜白芍丹皮生地山藥桔梗
石蓮茯苓陳皮。風米之類。趙養葵曰。陰虛自痢者。卽
五泄中瘕泄也。經曰。裏急後重。數至圜而不能便。必
莖中痛。褚氏曰。陰已耗而欲竭之。則小便牽引而痛。
愈便則愈痛。其證赤白相兼。後重裏急。悉似疫痢。必

此理不可
不明

言之歷歷
如掌上觀
紋

透徹語

小便短澀而痛。或欲小便而大便先脫。或欲大便而
小便自遺。急以八味丸加故紙肉果阿膠兼用理中
湯加升麻桂附相繼間服。世有服痢藥而死者不可
枚舉。張景岳曰。陰虛之病有形體薄而顏色青白者。
有脈雖數而無力無神者。有脈見真弦而真虛似實
者。有素稟陽衰者。有素多淡素者。有犯生冷者。有偶
中陰寒者。有年衰神弱者。或食生冷偶傷胃氣而成
滯下者。果何積之有。又何熱之有。大都脾弱之輩多。

有。此。證。故。治。此。者。只。宜。溫。調。脾。腎。俾。脾。溫。則。寒。去。卽。
所。以。逐。邪。也。卽。用。溫。補。健。脾。原。無。妨。碍。切。不。可。妄。云。
補。住。邪。氣。而。用。攻。積。清。火。等。藥。脾。氣。再。傷。多。致。不。救。

疫痢

疫痢之證。運氣所致。或流衍之紀。雨濕連綿。或二火
司令。赫義用事。濕熱大作。或燥金行令。燥火時行。三
者。皆成疫痢。此所謂之天行疫痢也。脈多濡散。或見
微遲。或伏。或散。脈微者。用人參敗毒散。脈自起。燥火

治法序

脈數者。當歸銀花湯。病機云。時行疫痢。長幼相似。能傳染者是也。宜審寒暄。分別表裏而治。其初起有外證者。敗毒散。表證除。當清熱消積。吳又可曰。疫痢者。大腸事也。大腸病。失其傳送之職。故正糞不行。純乎下痢膿血而已。所進穀食。停積胃中。直待大腸邪氣將退。胃氣通行。正糞自此而下。今大腸失職。正糞不行。又何能與胃載毒出外。羈留在胃。耗氣搏血。尤爲喫緊。宜用枳榔順氣湯。繆仲淳曰。疫痢之證。沿門闔

是治時疫
痢要旨

境俱患痢疾。發熱頭疼。口渴煩燥。或夾癰疹。下痢溺
澀。庸工指爲漏底傷寒。殊不知疫痢使然。緣今人之
稟質薄弱。積感厲氣之所致。治宜清熱解毒。表散爲
急務。如羌獨柴葛之類。如有別證夾雜。以意加減。全
在活潑。

痧痢

郭志邃云。痧痢之證。先瀉後痢者居多。蓋因腸胃空
虛。穢氣易觸。則成痧痢。或天氣炎熱。或時行疫痢。感

觸腸胃因積而發亦致痧痢。夫痢不兼痧積去便痊。痧不兼痢括放卽愈。痧積兼全腹必疔痛非常只治其痢腹痛不止藥之不效以致延綿日久陣陣作痛。久則變爲休息疔痛仍在務必先治其痧兼消其積。則痧除積去痛止而痢除矣。如脈洪大不勻此氣未清。痧毒尙盛也。令其胸背括痧俾氣血流通痛止而痢漸愈矣。宜當歸枳殼煎冲入童便待冷服之。次用蘇木紅花靈脂茜根當歸烏藥香附赤芍以導其瘀。

乃安。

蟯虫痢

胃弱腸虛則蟯虫下。乘或痛或癢。從穀道中出。其形極細。乃九虫之一也。治宜清熱殺虫。

虫疰痢

痢下黑色。形如雞肝。口燥大渴。五內切痛。由服金石湯丸。損傷真陰所致。其血自百絡而來。大抵好色之輩。都有是證。如初起發熱頭疼。表證見者。卽宜發散。

所謂風邪內結汗之是也。

似痢非痢

東垣所見
極是

東垣曰。世之似痢非痢者居多。過吞生冷。起居不時。損傷胃氣。則上升清華之氣。反從下降。以致殄泄。久則太陰傳少陰。而爲痢疾。裏急後重。赤白相錯。宜補中益氣湯爲主。使升降之道行。其痢不治而自止矣。如用溫補仍不治者。又當別治。經曰。熱之不熱。是無火也。無火者。益火之源。兼補命門之火。以生脾土之

古人醫案
皆知明處
當治驗歷
歷可尋非
如指南所
載之難爲
典要也
閱此知噤
口痢之多
由藥誤矣

母此萬舉萬全之策也。

附寓意草似痢非痢種種不同治法

胡太夫人偶然腹痛不寧瀉痢數行醫以痢疾治之。
其痢轉多。更用通因通用之法。用九製大黃丸。三成
下之。遂擾動胃氣。腹脹全不思食。有似噤口痢疾狀。
余診之。六脈皆沉而伏。應指模糊。亟曰。此非痢疾證。
乃誤治之證也。今但安其胃。不必治痢。而痢自止。不
必治脹痛。而脹痛自止。於是用四君子湯爲主。復加

薑寇暖胃之藥。用之二劑。痢果不作。但苦胃中脹痛。不安。本欲加行氣之藥。使其脹消痛止。而速得進飲。食。或曰。寧可消其食。不可急其氣。蓋以前因藥誤引。動胃氣。作楚。若加行氣。則脹滿必無紀極。堅持前說。卽用陳皮和之。亦須炒。而又炒。絕不可惹動其氣。凡五日未得大便。亦不惹動其便。聽其緩疾。痛止。脹消。則進食便利。至七日安痊。

張仲儀初得痢疾。三五行。卽請往視。行動如常。然得。

古人醫案
皆知明處
當治驗歷
歷可尋非
如指南所
載之難爲
典要也
閱此知噤
口痢之多
由藥誤矣

母此萬舉萬全之策也。

附寓意草似痢非痢種種不同治法

胡太夫人偶然腹痛不寧瀉痢數行醫以痢疾治之。
其痢轉多。更用通因通用之法。用九製大黃丸。三成
下之。遂擾動胃氣。腹脹全不思食。有似噤口痢疾狀。
余診之。六脈皆沉而伏。應指模糊。亟曰。此非痢疾證。
乃誤治之證也。今但安其胃。不必治痢。而痢自止。不
必治脹痛。而脹痛自止。於是用四君子湯爲主。復加