



未集

外科正宗



外科正宗卷八

海甯許

楣辛木訂

明崇川陳實功著

吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光胤寅昉校

腸癰論第三十五

夫腸癰者。皆溼熱瘀血流入小腸而成也。又由來有三。男子暴急奔走。以致腸胃傳送不能舒利。敗血濁氣壅遏而成者。一也。婦人產後體虛多卧。未經起坐。又或坐草艱難。用力太過。育後失逐敗瘀。以致停積腸



南京中醫藥大學圖書館版權所有

胃而成者二也。飢飽勞傷。擔負重物。致傷脾胃。又或
醉飽房勞。過傷精力。或生冷並進。以致氣血乖違。淫
動痰生。腸胃痞塞。運化不通。氣血凝滯而成者三也。
總之初起外症發熱惡寒。脈芤而數。皮毛錯縱。腹急
漸腫。按之急痛。大便墜重。小便澀滯若淋。甚者臍突
腹脹。轉側水聲。此等並見。則內癰已成也。初起未成
時。小腹殷殷作痛。儼似奔豚。小便淋瀝者。當大黃湯
下之。瘀血去盡自安。體虛脈細。不敢下者。活血散瘀
湯和利之。已成腹中疼痛。脹滿不食。便淋刺痛者。薏

苡仁湯主之。復濡而痛。小便急脹。時時下膿者。毒未解也。用牡丹皮湯治之。如膿從臍出。腹脹不除。飲食減少。面白神勞。此皆氣血俱虛。宜入珍湯加牡丹皮肉桂黃耆五味子斂而補之。五味子徐勒如日久因循。不識此症。誤作脹病治之。徐曰庸醫往往如此以致毒攻曰臍腸胃受傷。或致陰器攻爛。腐靨黑斑。色敗無膿。每流污水。腹連陰痛。煩躁不止。身熱口乾。衾幃多臭。臥房難進者。俱爲不治。宜斟酌之。

腸癰看法

初起小腹疼痛。小便不利。六脈微緩。不作寒熱者。輕已。
成小腹腫而堅硬。小便數而不利。六脈洪數者。險已。潰。
時時下膿。裏急後重。日夜無度。疼痛不減者。重。潰後膿。
腥臭穢。或流敗水。濁瘀。虛熱更增。不食者死。

腸癰治法

初起小腹疼痛。或軟或硬。脈芤數者。瘀血也。宜下之。小。
腹作痛有塊。大便秘澀。小便如淋者。宜和而利之。已潰。
時時下膿。腹痛不止。飲食無味者。宜托而補之。產婦惡。
露不盡。流注小腸作痛。脈數者。宜和而導之。腹脹日久。

臍高突出。轉側響如水聲。臍內蓄急針之。徐曰實見如此可用針

腸癰治驗

一男子小腹脹痛。裏急後重。時時下膿。醫作痢疾治之。

愈重。

醫字徐×

余診其脈芤而數。此小腸癰也。投以薏苡

仁湯一服。下膿升許。卽不後重。更用牡丹皮散六服而安。

一幼婦產後月餘。腹中漸痛。腫脹如蠱。內醫紛紛認爲蠱病。又月餘。沈重昏憤。已棄不治。適其家童稚患瘡。請余往視。偶言及此。余自請診之人。雖昏憤不甦。而

脈細數有力。余曰：此內癰也，尚可治。其家不信。余曰：

請視其腹。一決生死。何如？視之，則腫皮緊急，光亮，臍

下大熱。以上十字徐密點批曰：辨症全在此產後極多。余曰：確係內癰。治之

萬無一失。其家乃善。因命先備淨桶，用滾湯半桶，

之聽用。先以薏苡仁湯薏苡仁湯徐密點加酒炒大黃二錢。

徐徐灌服。此二句徐密點待腹中覺痛，扶起患者，坐桶上，熱

氣薰蒸。此四字徐密點其膿下如湧泉，連湯與膿約共滿桶。

病者即甦。更服八珍湯，加牡丹皮、五味子，調理月餘

而安。

一婦人小腹腫痛。小便如淋。診之。脈緩而芤。此得之。行經時誤食生冷。又兼惱怒。肝火急迫。瘀血而成。內癰膿。尚未成也。以大黃湯下之。瘀血出盡而安。

一婦人小產。瘀血未盡。勞動太早。小腹內外腫痛。月餘大便秘燥。小便澀滯。口燥咽乾。煩悶不睡。內醫調理。

其病日重。余偶往診之。脈數實而有力。謂曰。此腸癰已成也。用薏苡仁湯加大黃一服。下膿數碗。脹痛頓退。外腫堅硬不散。仍作掀痛。此餘膿尚欲外泄也。投

以十全大補湯三服。十全大補湯徐勒批曰。蠻方膿脹痛而針之。

更服八珍湯加牡丹皮五味子。五味子徐人月餘而斂。

一婦人腹脹如鼓。臍突寸許。小水澀滯。轉側腹有水聲。

此內膿已成。用針刺臍上突頂。出膿盈許。服牡丹皮

散五六劑。其膿漸少。朝以八味丸。暮以八珍湯加澤

瀉牡丹皮黃耆破故紙。此一味徐人服之月餘而愈。

腸癰主治方

大黃湯。大黃湯中用朴硝。加上桃仁水煎服。丹皮白芥共調。腸癰腹痛自然消。

治腸癰小腹堅硬如掌而熱。按之則痛。肉色如故。或

掀赤微腫。小便頻數。汗出憎寒。脈緊實而有力。日淺

未成膿者。

大黃炒

利硝各一錢

牡丹皮

白芥子

桃仁去油

尖各二錢

水二茶鍾煎入分食前或空心溫服。

徐曰。此實症主方。

活血散瘀湯

活血散瘀湯赤芍瓜蒌枳殼桃仁等

檳榔蘇木與芎歸大黃加上粉丹皮

治產後惡露不盡。或經後瘀血作痛。或暴急奔走。或

男子杖後瘀血流注。腸胃作痛。漸成內癰。及腹痛大

便燥者。



川芎

歸尾

赤芍

蘇木

牡丹皮

枳殼

瓜蒌仁

去殼

桃仁

去皮尖各一錢

檳榔

六分

大黃

酒炒二錢

水二茶鍾煎八分空心服渣再煎服

徐曰。即前方義。

牡丹皮散

丹皮散內用參歸甘草白芷川芎芍

薏苡茯苓共黃耆桃仁官桂木香宜

治腸癰腹濡而痛以手重按則止或時時下膿

人參

牡丹皮

白芍

茯苓

黃耆

薏苡仁

桃仁

白芷

當歸

川芎

各



南京中医药大学图书馆藏

錢

甘草

官桂

各五分

木香

三分

水二茶鍾煎八分。食前服。

徐曰。卽前方義。

又曰。王不留行。冬瓜子。全瓜蒌。枳殼。穿山甲。廣膠。槐米。番木鱉。阜茨。蝎子。俱可參用。

七賢散

七賢散內淮山藥
茯苓參耆合成七

黃肉丹皮熟地黃
薑棗同煎理內傷

治腸癰潰後疼痛淋瀝不已。或精神減少。飲食無味。面色萎黃。四肢無力。自汗盜汗。睡卧不甯。

茯苓

山藥

牡丹皮

山茱萸

熟地



北京中醫藥大學圖書館版權所有

人參

各一錢 黃耆 二錢

水二茶鍾。煨薑三片。大棗二枚。煎八分。食前服。

徐曰：不切病。

失笑散

失笑散用五靈脂醋調末服。或丸服。

加上蒲黃一味。宜瘀血諸痛均堪醫。

治產後心腹絞痛欲死。或血迷心竅。不省人事。及尋常腹內瘀血。或積血作痛。又婦人血氣為病作痛之聖藥也。及治男子諸疝疼痛不已者。

五靈脂

蒲黃

俱炒等分

右為細末。每服三錢。醋一合。調稠。熬數滾。入水一茶



北京中医药大学图书馆藏

鍾煎七分。食前連藥服。如用醋爲丸。每服二錢。淡醋湯下。治前症亦妙。

徐曰。此非治腸癰之方。乃治婦人瘀血作痛之方也。

又曰。此消瘀血之要方。

梔案此二味徐俱圈。

排膿散

排膿散內用黃耆銀花白芷瓜蒌等

川芎山甲與當歸防風加上效神奇

治腸癰小腹脹痛。脈滑數。裏急後重。時時下膿。

黃耆

當歸

金銀花

白芷

穿山甲

防風

川芎

瓜蒌仁

各一錢

水二茶鍾煎八分食前服或為末每服二三錢食遠

蜜湯調下亦可

徐曰此通利膿水之法

瓜蒌子湯

瓜蒌子湯薏苡仁

桃仁丹皮相其行
產後惡露併瘀血
腸胃停滯用此清

治產後惡露不盡或經後瘀血停滯腸胃作痛縱非
是癰服之亦效

薏苡仁

四錢桃仁

牡丹皮

瓜蒌仁

各一錢

水二鍾煎八分食前併空心服



徐曰。後有薏苡仁湯。不必有此。

薏苡仁湯

薏苡仁湯功力奇。桃仁加上瓜蒌子。

腸癰腹痛。總堪醫。更兼白芍與丹皮。

治腸癰腹中疼痛。或脹滿不食。小便澀滯。婦人產後。多有此病。縱非癰服之尤效。

薏苡仁

瓜蒌仁

各三錢

牡丹皮

桃仁

去皮尖。各二錢。

白芍

一錢

水二茶鍾煎八分。空心服。

徐曰。此腸癰主方。與前方相同。

腸癰應用方

八珍湯

十全大補湯

八味丸

俱見潰瘍門

臟毒論第三十六

夫臟毒者醇酒厚味。勤勞辛苦。蘊毒流注。肛門結成腫。

塊其病有內外之別。虛實之殊。發於外者多實多熱。

脈數有力。肛門突腫。大便秘結。肚腹不寬。小水不利。

甚者肛門肉泛如簾孔。頭緊閉。此爲外發。屬陽。易治。

宜四順清涼飲。內消沃雪湯。通利大小二便。痛甚者。

珍珠散。人中白散。搽之。膿脹痛者。針之。發於內者。屬

陰虛。溼熱滲入肛門。內臟結腫。刺痛如錐。小便淋瀝。

