

種痘新書卷之二

十二經絡

手太陰爲肺

手少陰心經

手太陽小腸

手少陽三焦

手陽明大腸

手厥陰肝經

足太陰脾經

足太陽膀胱

足陽明胃經

足少陽膽經

足少陰腎經

足厥陰心包

痘疹脉法

左心小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命分寸關尺三部以定經絡

寧邑張 坎遜王氏編輯

受業曾衡波全泰



種痘新書卷之二

十二經絡

手太陰爲肺

手少陰心經

手太陽小腸

手少陽三焦

手陽明大腸

手厥陰肝經

足太陰脾經

足太陽膀胱

足陽明胃經

足少陽膽經

足少陰腎經

足厥陰心包

痘疹脉法

左心小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命分寸關尺三部以定經絡

寧品張 坎遜王氏編輯

受業曾衡波全泰



部位總不外於浮沉遲數四字決其寒熱虛實但痘自發熱至
起脹時毒從內出陽之候也脉宜浮洪而數不宜沉細而遲
收靨以後毒從外解陰之候也脉宜和緩不宜洪數

五臟見症

肝經主	驚搐	頭疔	悲怒	橫床	穿衣	眼澀
心經主	睡驚	煩燥	譫語	妄言	喜笑	見鬼
脾經主	腹痛	狂悶	顛狂	唇紅	口渴	撮口
肺經主	噴嚏	咳逆	悲哭	咽啞	鼻涕	氣喘
腎經主	腰痛	身疼	寒戰	咬牙	竄硯	耳尻冷

指南賦

人參補氣炙草和中用黃芪而實腠
埋得蟬退而善開提紅花
有活血養血之功生地有涼血行血之效痘若乾紅便宜加入
紫草消肌開竅毒壅堪行熱症賴之有益而虛症切莫輕投因
查善逼瘡毒能消食積兼理滯氣於補益方中且解鬱結於香
肌湯內輕其表而涼其裏功在荆喬疎其肌而發其壅莫如蟬
水蟬退木
通也利咽喉而清氣道能發散而善開提功必資於桔梗

分清濁而利小便消痘毒而去臃腫效莫大於腹皮川芎引清
陽而達表勿缺於未滿之前芍藥斂陰氣以濟陽可施於行漿
之日牡丹皮去血中之毒壯熱煩紅爲聖藥地骨皮去氣中之



毒毛焦熱甚是良功。官桂有鼓動陽氣之能。神倦而不振者。用之以收寔效。丁香有贊助元陽之力。內虛而不起者。得之以奏奇功。木香順氣而理脾寒泄。湯湯中必用。訖葛鬆肌而止。渴煩之症。宜加白朮。茯苓健脾胃。佐參芪。且能益氣。當歸。生地。補陰虛。君只壳而能滋腎解蘊毒。莫如犀角。黃連。惟熱盛乃前。後堪用。定心煩。莫如門冬。五味。有渴症。則終始宜加大附子。返本回陽。能理虛寒而定戰慄。天花粉消痰清胃。且收肺氣而發聲音。白芷排膿痘毒。憑之而運化。紫蘇發表。寔邪賴是以驅除。羌活有攻毒走表之功。防風有散邪逐毒之妙。僵蚕利子。解筋止風。定瘰如神。只壳快乎胸膈。下氣。寬胸最速。開腠定喘力莫。



大如麻黃。逐過瀉之。而發散。平胃溫中。功則歸於厚朴。腹瀉。是以消磨。莖骨枯槁。暫為瀉。為之用。泄止。則不宜施。澤瀉。有分利水穀之妙。灌膿時。當慎用。乾姜溫中。氣而止嘔。止瀉。寒。瀉者。常用。則用大黃。蕩腸胃。而通秘結。熱瀉。便秘。宜用。牛旁利咽。而善解毒。升麻發毒。而善升提。柴胡前胡。解鬱。退熱。黃芩黃柏。清火。而可消癰。止嗽。消痰。用貝母。清便。山枝牛中黃。化風痰。而療顛癇。有扶危救急之功。龍腦片。血而起黑陷。貝撥亂反正之才。射香通竅。人五臟。亦。黃解毒。于六腑。兼可定驚。神砂寧心。定志。而有養血涼血。珍珠透裏入堅。能解骨髓之毒。訶子斂肺。氣。命。瀉腸。豆豉。



脾胃而止泄。人齒但能發鬆肌肉。過用則肉裂皮焦。藥味不
于異人。取效每存平常品。明此一篇。思維過半。

節制賦

夫病深而藥淺。終是無功。病淺而藥深。反增他劇。勢緩而
劑急。則拂亂其經。病劇須用劫藥。非劫難解其危。以本藥而
本病。病去即當行別議。防變症而用變藥。變症難逆乎將來。故
備行補法。未必盡爲怯弱。專用辛溫。豈應槩是虛寒。宜用則用
當去。即去藥隨病。更方非可執。故升麻進於未點之先。非熱甚
而莫投身。無壯熱。体加乾葛。柴胡。臉不煩紅。勿進芩連。喬芥。壅
遏。只許疎。這投補。劑則胸膨。臧食內熱。須宜清利。過發汗。則

爛瘡疼熱鬱心煩用丁桂須防患目便溏胃弱投苓連恐致
亡傷食吐酸先宜消導不食嘔吐須與和中糞焦熱泄溫補豈
其所宜便溏糞白涼藥總爲不合胃虛弱而滋陰恐增泄瀉
焦擁而益湯慮發顛狂喘滿便清是虛煩而可補氣粗腹脹加
便秘而可通咳嗽有痰切勿妄投半夏胃熱作嘔且教謾入乾
薑氣虛不振則參芪易于奏捷脾胃虛寒則桂附乃可成功設
令煩渴喘秘誤投辛熱勢必反生跋扈苓連解熱毒于水折之
前刑喬清血熱於方脹之始若還勢在行漿此輩皆爲所此
六七日內不起內托保元無禁八九日外變生木香異攻何
補法不宜早施溫藥必須在後發散乃作先鋒溫補是爲裁

遵此遺制鮮致悞人識透立機方為妙用。

權宜賦

痘有緩急治宜權變。且如紅紫掀腫。發涼血為上。唇白平。將補氣最良。出不快。令傷表。定而發散可用。二便秘者。裏實。利何妨。毒不能以速散。毒甚者。令微汗之。發越熱不可以三。除熱劇者。使小便之清長。三陰甚而多寒。藥必發。三。數而多熱。治無外乎清涼。是故補元氣。參。芪。白。朮。黃。地。黃。發。表。散。邪。重。柴。葛。而。輕。桂。枝。疎。通。寒。熱。微。口。亮。而。甚。解。熱。香。薷。連。枝。子。快。癰。疹。紫。草。荆。防。牛。旁。連。翹。是。痘。中。之。聖。用。芎。藭。草。乃。藥。內。之。君。王。玄。參。桔。梗。能。因。氣。通。車。前。善。

膀胱氣逆兮陳皮青皮胃寒兮丁香本香治泄瀉兮柯子豆蔻
止嘔吐兮砂仁霍香祛風熱兮蟬退白附定驚搐兮琥珀牛黃
麥冬干葛清心熱而止煩渴腹皮厚朴療水腫而消腹脹五味
杏仁潤肺止嗽而定喘山查只寔消食行滯而偏長半夏南星
貝母悉是消痰之藥麻黃紫蘇羌活皆爲發汗之劑紅花丹皮
可解血熱鹿茸山甲能起痘漿消食積神曲麥牙草果理後重
只壳檳榔木香犀角羚羊解乎心肺之執秦艽香附退乎脾胃
之黃乳香沒藥止痛乾姜附子回陽前胡蘇子能清熱而止風
嗽猪苓澤瀉堪止瀉而利小腸此藥味之加減在醫者之權宜
而病症之輕重又因人而立主方慎勿膠柱而鼓乃云醫道之

良

金鏡賦

痘毒未出之初。宜開和解之門。既出之後。當塞走泄之路。壯熱
腮紅。宜服升麻乾葛。面青唇白。急進和表參蘇。氣粗執壅。心煩
悶便秘。須當解利。升甘芍葛。只前姜防芷紫芩。各樣喘呼脹滿。
眼中紅肌燥急。宜疎解。羌活乾葛。芍升麻。甘桔牛旁。堪誇發痘
之門不開。則熱蒸之毒必解。未見點前。惟茲一法。既敷瘡後。又
有奇方。稀疎而氣血和平。須知安表和中之理。歸芍芍藥木苓
甘。且用益元飲。子稠密而毒氣太盛。當識內外分消之妙。荊喬
歸地芍紅芍。通用小連喬飲。瘡來赤色執焦枯。急進清涼而解。



毒紅斑赤紫。參連犀栢當施。身熱療人乾葛。前胡並用。氣喘
腹膨脹。蟬退只壳木通。遇色來紅潤。便宜徹去荆喬。如見
便清泄。卽是地歸俱免。宜加白朮茯苓。精神倦而飲食少。進以
人參。出不快而痘不振。兼用查退。初覺繁紅稠密。紫草用之。無
疑如見毒盛形焦。半于進之。何害。是故三日以前固宜清解。四
月以後。須要權宜。瘡頭放白。勢在行漿。此際最爲緊要。必參看
內外虛實之異。酌以溫平表裏之宜。若神壯而氣盛。能食而不
泄者。痘雖稠密。只用和中表發。防甘查芎桔歸芪。催膿而已。若
神倦而氣衰。減食而痘陷者。毒若繁壅。必用重崇補益。參芪甘
桔桂歸芎托裏。宜用。設此二方。乃作釀膿之具。膿泡未滿。不可

輕易其方。痘或變遷不一。另設便宜妙用。至于漿成充足。毒已盡行外化。法當漸進于清涼。氣血回元復位。不可重用。參芪切勿多食。脾甚恐難收拾。若便寢而能食。壯熱而不渴者。便宜疎利爲先。升麻乾葛四順清涼。倘便澹而減食。壯熱而渴者。則以健脾爲貴。朮苓通歸防風芍芷。假如內外症平。不必過服藥餌。直至結痂以後。再觀餘毒有無。當疎利則宜疎利。當調補則宜調補。餘毒若攻。用連喬飲風寒外剝。進益氣湯。治法固自多方。總皆因症而治。若無餘症。則安養氣血。調和飲食。自可無虞。

用藥

補氣

人參黃芪白朮茯苓炙草肉桂丁

補血

鹿茸當歸川芎芍藥地黃

發散表熱

升麻乾葛柴胡前胡紫蘇葱白

清解裏熱

黃芩黃連山枝黃柏犀角羚羊

用
栢枝犀角不可
麻黃不可妄用

表寒

黃芪桂枝生薑川芎防風麻黃

裏寒

乾姜肉桂附子丁香木香豆蔻

利小便

猪苓澤瀉木通車前活石

通大便

只壳只寔大黃牽牛玄明粉不可輕用

活血涼血

生地紅花紫草丹皮荊芥歸尾

理氣

木香陳皮青皮香附



喉痛

玄參桔梗牛旁豆根射干

胃寒嘔吐

藿香丁香木香砂仁白蔻煨姜

驚搐

天麻白附姜蚕全蝎砂神砂牛黃竹黃

咳嗽

桔梗陳皮桑皮杏仁橘紅

祛風

蠲退防風全蝎白附勾藤姜蚕

泄瀉

白朮茯苓桐子豆蔻

腰痛

續斷故芷杜仲牛膝玄胡

頭痛

川芎藎本薄荷蔓京

驚痰

牛夏南星貝母欬冬花粉

止渴

乾葛麥冬五味



清华大学图书馆藏

消食

山楂、麥芽、神曲、草菓

腹脹

厚朴、蒼朮、腹皮

快癰

紫草、防風、荆芥、升麻

解毒

牛旁、連翹、慈薺、地丁

起痘攻漿

鹿茸、山田、川芎

腹痛

厚朴、蒼朮、玄胡、川練、木香

氣痛

乳香、沉香、木香、只壳、香附

眼目

菊花、蒙花、膽草、決明、鬼糞、疾黎

吐血衄血

百草霜、血茹、京墨、山枝

此大藥言之以備初學應用而臨機應變又不可言執也



酌量藥品

牛蒡

通肌滑竅而解毒。多服恐內動中氣外致表虛。

連翹

能開朋相竅。使痘上升。多服則泄元氣。以致表虛。痘

虛。柏空壳。

紫草

解毒涼血而滑大腸。多服恐成溏便。

白朮

健脾養胃。其功歛脚乾漿。初發慮其滯。毒起脹畏其乾。

汁是以初中皆忌。惟漿清收靨時宜用。

蒼朮

去濕僻邪。多服則潤濕之氣不行。痘必難以行。漿

諸荳

令車前木通。皆利水滲濕之藥。升水之時皆忌。解痘

之前后則宜。

