

柴胡

龍骨

生姜

人參

茯苓

鉛丹

黃芩

牡蠣

桂枝

兩各一

半夏

合二

大棗

六枚

大黃

二兩

右十二味以水八升煮取四升內大黃更煮一二

沸取其生去滓溫服一升

傷寒腹滿譫語似胃家實寸口脈浮而緊為肝疑絃字

脈也此肝乘脾也而肝邪盛名曰縱刺期門直故名曰縱

期門者肝之募刺之以泄肝邪

傷寒發熱惡寒肺大渴欲飲肝氣其腹必滿肝

不得肺行水自汗出。小便利其病欲解。此肝乘肺也。名曰

橫刺期門。發熱惡寒。似太陽之表。此却為肺病者。肺

而大渴。非轉屬陽明邪。未經妄下。而腹滿。非轉屬太陰。

蓋以木邪亢極。水精不勝。寡於金。畏也。金行。制木。通調。

水道。故腹滿。是侮所不勝。寡於金。畏也。金行。制木。通調。

反乘金。為不利。病為欲解。病為欲解。病為欲解。病為欲解。

太陽病二日。反躁。反熨其背。誤而大汗出。大熱入胃。

胃中水竭。躁煩。必發譫語。十餘日。振慄。重陽必陰。自

下利者。熱邪此為欲解也。故其汗從腰以下不得汗。欲小便不得。反嘔。欲失溲。足下惡風。大便鞭。小便當

數而反不數以上皆火邪及多大便已頭卓然而痛

陽氣下降頭痛其人足心必熱先陽氣不通於下故

中陽虛故也穀氣下流故也

太陽病中風以火劫發汗邪風被火熱血氣流溢失

其常度兩陽火風相熏灼其身發黃熱發陽盛則欲衄

迫血陰虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭

汗出齋頸而還熱氣腹滿微喘口乾咽爛或不大便

久則譫語胃中甚者至噦病深者手足躁擾捻衣摸

床火熱小便利者可治此證可治不可治全

傷寒脈浮。醫以火迫劫之。亡陽。必驚狂起。卧不安者。

火劫之藥。非火熱傷陰。如桂枝去芍藥加蜀漆牡

條即逼汗亡陽如此條也。上 蠱龍骨救逆湯主之。汗者動其腎被火者傷其心也。發

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠱龍骨救逆湯方

桂枝 三兩 甘草 二兩 牡蠱 五兩 龍骨 四兩

蜀漆 三兩 生姜 三兩 大棗 十二枚 擘

右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥

再取三升去滓溫服

形作傷寒。謂頭痛也。其脈不絃緊而弱弱者必渴。脈不絃緊



則無傷寒表脈也。經云：諸弱發熱，被火者必譫語。則脈弱為裡熱，故云弱者必渴。  
相合胃弱，者發熱，脈浮解之，當汗出愈。得脈浮為邪。  
中躁煩弱，者發熱，脈浮解之，當汗出愈。得脈浮為邪。  
氣還表當汗。  
出而解矣。

太陽病以火熏之，不得汗，其人必躁，到經不解，必清。

血清作圜，下火也。邪逼血下，行也。名為火逆。

脈浮熱甚，實表反灸之，虛治此為實，以虛治因火而

動，必咽躁唾血。此上火邪迫，血上行也。

微數之脈，慎不可灸。灸則除寒，因火為邪，則為煩逆。

追虛逐實，血散脈中，火氣雖微，內攻有力，焦骨傷筋。

血難復也

脈浮宜以汗解。用火灸之。邪無從出。因火而盛。病從

腰以下必重而痺。火性炎上。腰以下陰氣獨治。故重而痺。名火逆也。欲

自解者。必當先煩。乃有汗而解。何以知之。脈浮故知

汗出解也。煩若浮。不浮則煩。為入裡矣。

燒針令其汗。心氣陰血而驚動。針處被寒。核氣而起。而赤者

必發奔豚。氣從少腹上衝心者。心氣虛於內。寒薄於外。因驚而虛。腎氣

乘寒而動。故灸其核上各一壯。助心氣。與桂枝加桂湯

更加桂二兩。水溫少陰。或問曰。燒針亦用火灸。答曰。灸

者。灸其被寒之處。外寒束其  
內。火火鬱則發之之意也。

桂枝加桂湯方

桂枝湯原方加桂二兩餘依前法

火逆下之。因燒針煩躁者。先火為逆。復以下除之。裡

為火熱所煩。故生煩躁。桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之。

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方

桂枝一兩 甘草二兩 牡蠣二兩 龍骨二兩

右四味以水五斗煮取二升半去滓溫服八合日

三服

太陽傷寒者加溫鍼必驚也

損榮血而動心氣

太陽病當惡寒發熱今自汗出反不惡寒發熱關上

脈細數者以醫吐之故也一二日吐之者腹中飢口

不能食

表寒乘虛入胃

三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食

表熱乘虛入胃也

朝食暮吐以醫吐之故也此為小逆

太陽病吐之但太陽病當惡寒今反不惡寒不欲近

衣此為吐之內煩也

熱邪入裏

病人脈數數為熱當消穀引食而反吐者此醫發其

汗令陽氣微膈氣虛脈乃數也數為客熱不能消穀



以胃中虛冷故吐也

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便

反澹腹微滿鬱鬱微煩先其時自極吐下者言不因醫

吐下經所謂得吐則快得與調胃承氣湯胃邪若不

爾者不可與半裏曾不能下邪在半表但欲嘔胸中痛

微澹者此非柴胡症以嘔故知極吐下也等證此欲嘔

自極吐下而來非柴胡症也何以知之以

太陽病六七日表證仍在脈微而沉裏反不結胸下

其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便不利者

下血乃愈所以然者以太陽隨經在裏故也抵當

湯主之太陽陽主上焦下焦與裏主

而在太陽陽之裏以少腹滿而微知

而小便不利則屬氣化不行其表蓋以脈微非抵當症又

笑然表症仍在何焦不先解其表蓋以脈微非抵當症又

治血將結胎之知邪在當下焦不先解其表蓋以脈微非抵當症又

抵當湯方

蝨蟲足去翅水蛭十熬各三大黃酒浸桃仁二十個

右四味以水五升煮取三升去滓溫服一升不下

再服



太陽病身黃脈沉結少腹鞭小便不利者為無血也。  
非濕熱不行之故不可斷為血症。小便利者為利其人如。

狂者血證諦也。抵當湯主之。蓋胃中瘀血與膀胱結。

少腹俱滿。但以小便利。傷寒有熱少腹滿應小便不利。今反利者為有血也。

當下之不可餘藥。宜抵當丸。易湯為丸。熱雖甚而未。

其制以緩治之。不可餘藥。謂桃仁承氣。則未宜。

抵當丸方。過之酌於二者之間。而得其真矣。

水蛭 二十個

蠱蟲 二十個

大黃 三兩

桃仁 二十個

右四味分為四丸。以水一升煮一丸。取七合服之。

晬時當下血。若不下更服。

太陽病。小便利者。以飲水多。必心下悸。水停。小便少。

者必苦裏急也。水下焦停

問曰。病有結胸。有藏結。其狀何如。答曰。按之痛。寸脈

浮。關脈沉。名曰結胸也。結胸者。邪結在胸。藏結者。邪

虛入裡所致。下後邪氣入裡。與陽相結。以陰受之。則入

五藏故爾

何謂藏結。答曰。如結胸狀。飲食如故。時時下利。寸脈



浮關脈。小細沉緊。名曰藏結。舌上白胎滑者。難治。藏

一證難於辨識。借結胸以詳其脈。而明外邪甚者。結

為難治。其脈上寸浮關沉。與結胸無異。而更加小細

緊者。以關居上。下二焦之界。外邪由此而內。邪困

由此而此。上實下虛。受之要衝。所以邪由在此而反

於中也。此症全以外來之勢。方熾。單舌上白胎滑。兩

解之。法俱深重。其互結之勢。然亦不外乎溫中。裡

藏結。無陽症。不往來寒熱。其人反靜。舌上胎滑者。不

可攻也。散邪俾陰氣內消。客邪外散。如是斯可矣。

病發於陽。而反下之。熱入。因作結胸。病發於陰。而反

下之。熱入。因作痞也。此明所以致結胸與痞之故。發熱惡

寒之症。則熱入於陽位。而作結胸。無惡寒之症。則熱入

於陰位。而作痞。此明所以致結胸與痞之故。發熱惡寒之

熱惡寒之症則熱入於陰位而作痞症所以成結胸

者以下之太早故也結胸者項亦強如柔痙狀此胸之

外下之則和宜大陷胸丸

大陷胸丸方

大黃半斤 葶歷子熬 芒硝 杏仁各半升去皮尖熬黑

石四味擣篩二味內杏仁芒硝合研如脂和散取

如彈丸一枚別擣甘遂末一錢匕白蜜二合水二

升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取

下為效

結胸證其脈浮大者不可下下之則死此言結胸症脈沉者為在裡則可下若脈浮大心下雖結而在表者猶多下之則表邪內陷其禍立至故下之則死

結胸證悉具煩躁者亦死津液苟或遷延觀望必至

煩躁正虛邪實故亦必死

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下

之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖下之不為逆必

蒸而振却發熱汗出而解本症仍在即若心滿而

不痛者此為痞指出不痛二柴胡不中與之宜半夏

瀉心湯

半夏瀉心湯方

此即小柴胡湯以生薑易乾姜以紫

半夏半升

黃芩

乾姜

甘草

炙

人參

各三兩

黃連

一兩

大棗

十二枚

石七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫

服一升日三服

傷寒六七日

結胸

熱實

明熱實二字形容結胸之狀甚

散脈沉而緊

心下痛

按之石

鞭者

或非云實結胸中而不知

也胸中陽氣之所聚也邪熱當胸而結直至心下石鞭

知

知

知

知

知

知

知

知

之沉痛則脈不沉而聚也邪熱當胸而結直至心下石鞭

知

知

知

知

知

知

知

知

大陷胸湯主之



大陷胸湯方

大黃 六兩

芒硝 一升

甘遂 一錢  
為末

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯

兩解但結胸無大熱者此為水結在胸脇也胸為清

表裡但結胸無大熱者此為水結在胸脇也胸為清

氣蒸而為水清者變濁矣結胸本無他物氣與水所停也

是為水結但頭微汗出者水氣上大陷胸湯主之

朱奉議曰水結胸  
小半夏加茯苓湯  
之