

新刊西學集成

八



醫學集成卷之八

後學 義烏 傅滋 續註

牙病六十七

丹溪云

牙疼或出血屬熱胃口熱有風有寒有虫有濕

熱矣

按東垣云齒者腎之標骨之餘上觀諒於脾土足陽明之脈貫絡也手陽明惡寒飲而喜熱足

陽明喜寒飲而惡熱七甚則齒動脫作痛不已有惡寒者有惡熱者有惡寒惡熱者有惡熱飲

少寒飲多者有惡熱者有動搖痛者有齒齦腫痛者有齒齦腐者有齒齦有

為疳疳者有血而痛者有齒齦腫痛者有齒齦腐者有齒齦有

為疳疳者有血而痛者有齒齦腫痛者有齒齦腐者有齒齦有

其本而察之脈疾非參者未之有也



實熱腫痛調胃乘氣加黃連又方升麻白芷防風荆

芥蒲苛桔梗并草之類或為未綿又方胡桐淡射香

擦之○上引牙痛灸足三里下引牙痛灸三間各

在小大指次指本牙大痛胡椒華撥升麻寒水石薄

奇○走馬牙疳乾姜棗燒存性枯礬為末付

節療云牙床腫痛動搖或黑爛脫落世人皆作賢虛治

此屬陽明經溫熱蓋齒雖屬腎而主於牙床上下床

屬陽明大腸與胃猶木生於土也腸胃傷於美酒厚

味膏粱目滑之物致溫熱上攻則牙床不清而為腫

為痛或出血或生虫故齒不得安而動搖黑爛脫落

也宜瀉明之濕熱則牙床清寧而齒自安固矣

東垣治一婦人齒痛甚口吸涼風則暫止閉口則復作
乃濕熱也用黃連胡相淚苦寒消竒荊芥辛涼治濕
熱為主升麻行陽明為使牙者骨之餘以旱魃骨灰
瀉之為佐射香少許入肉為引用細末擦之痛減半
又以調胃承氣去硝加黃連治其本二三行而止

附一

寒中

風邪客腦則腦痛項筋急袒露則痛

虫蝕色變痺痛

用蟾酥又方巴豆烟熏之

牙疼

生草烏尖芒硝等分為末擦之又方消竒荊

芥細辛為末擦漱又方蟾酥塗綿上陰乾如米粒許
寒牙縫○牙齦腫頂針刺出血如血汚難刺者烙鐵
物烙真齒又灸頰車二穴

清胃散

治牙痛 川歸

黃連 二分 生地 三分

升麻

牡丹皮 五分

右剉姜水煎服

羌活散

麻黃 節 去根

羌活 半 錢 防風 半 錢 細辛

升麻

訶胡

蒼朮 各 五 分 白芷 三 錢 黃連

骨灰 二 錢 桂

為末漱淨擦之

牙疼

土茯苓 五 分 青蘞 三 錢 水 二 椀 煎 一 椀 熟

漱又方烏頭熟艾葉二株川椒十粒濃煎漱出痰効



治王散氣

草薺穢木鱉子為末搐鼻

風氣走注痛

藁本剪草細辛熱漱

骨槽風

皂角不蛀者去子入杏仁一放在原子

位燒存性為末入青鹽少許搗之

牙痛

巴豆一粒大蒜一瓣杵爛為丸綿裹一丸塞

鼻中左入右半時即去之久則藥汁入耳內二次刻

二方

倒摘刺取刀烟綿蘸塞痛處即止

走馬牙疳一時腐爛即死以婦人溺桶中白垢火煨一

錢銅綠三分射香一分半再研付

風疳牙

此藥一被去核入巴豆一粒合起灰煨出

火毒研細以紙擦入孔中十數次効又方天仙子燒
灰以竹筒抵牙熏之即死或韭菜子如法熏之皆可
取牙 草烏草撥各一兩半川椒細辛各三兩右末每少許
揩之牙自落

一方 皂角研上蛾子或白蛆或草烏川椒細辛

白芷散

治大寒犯腦牙疼

草豆蔻

麻黃各半錢黃芪

升麻各一錢吳茱萸

白芷

各四分

川歸

熟地

各五分

藁本

三分

桂枝

二分

羌活

八分

為末
擦之

牙痛出血不止

調胃承氣蜜丸服之



腎虛痛

八味丸

浮腫虛壅而痛

三因安腎丸

擦牙方

去風生血黑髮滋腎

川歸

川芎

地黃

青鹽

石膏

各一兩

細辛

半兩

為末擦之

牙縫出血者

槐櫟嫩葉杵爛付牙關

牙疼

萊豆六粒胡椒七粒韭菜根一錢右同杵

爛用綿裹如豆大咬牙上痛甚者先用燒酒漱後付

○鼻病六十八

丹溪云

鼻為肺之竅因心肺上病而不利也有寒有熱



寒邪傷於皮毛，氣不利而壅塞，熱墊清道，寒則表之，熱則灸連。面鼻紫黑而為陽中之陽，鼻居面中，一身之血運到面鼻者為至清至精之血，多酒之人酒氣熏蒸，面鼻得酒血為極熱，血得冷污濁凝結不行，故也。治宜化滯血生新血四物加酒炒片芩酒拌紅花、茯苓、陳皮、甘草生薑煎調，五靈脂末服，氣弱加芪酒制。

酒齧鼻乃血熱入肺

治同前方

或用桐油入黃連以天

吊藤燒油熱付之，又方：礞黃入蘿蔔內煨乳香、輕粉、烏頭尖酥調付，或鴨嘴膽藥付，或以一拖為末，蜜蠟

凡彈子大空心膏一丸白湯下
或曰酒食者皆禁
所宜抑氣也
或曰酒食者皆禁
所宜抑氣也
或曰酒食者皆禁
所宜抑氣也

總鼻塞肉乃肺氣盛 枯礬末脂綿裹塞鼻數日自

消或瓜蒂末綿裹塞或木通細辛附子蜜丸綿裹納

鼻中或吹風通聖散加三棱山茱萸煎酒浸炒

末肺之

鼻淵

脂移乾於腦則辛頰鼻淵通聖散一兩薄荷
黃連各二

錢

雜著云鼻塞不開者鼻或但寒月多塞或畧感風寒便



塞不時發者世俗皆以為肺寒而用解表開利辛
溫之藥不効殊不知此是肺經素有火邪鬱甚則喜
得熱而惡先寒故遇寒使塞遇感便發也治法清肺
降火為主而佐以通氣之劑若如常鼻塞不聞香臭
者再審平素只作肺熱治之清金瀉火消痰或丸藥
湯化或不藥輕調緩服久服無不効矣此予所親見
而治驗者其平素原無鼻塞舊證一時偶感風寒而
致鼻塞聲重或流清涕者作風寒治之

鼻小微赤及生瘡

辛夷研末入腦射少許綿裹納

之或以批把蘸去毛煎湯調消風散

或半耳內后

之或白鹽常擦之

麗澤通氣散

治鼻不聞香臭

羌滑

劉滑

防風

升麻

葛根

各三錢

炙甘草

蒼朮

各二錢 川椒

白芷

各一錢

麻黃

留節一錢

冬加

黃連

黃柏

右剉加姜棗煮水煎服

防風湯

治鼻淵

黃芩

人參

甘草

川芎

麥門冬

防風

各半

右為末湯

調下

治鼻淵并臭

俗名挖腦沙

沉香

少許

宿砂

二錢白

雄黃

皂角

各火

白牛毛

澄葉

各二

右為末吹

入有少血加花子

驗方

絲瓜藤連蒂三尺燒為末酒下或殼亦可

鼻赤又生瘡

白龍丸末逐日洗面如燥豆法更甚

以時以湯洗去又宜間服龍虎丹一貼又方黃柏苦
參檳榔末付或青黛槐花杏仁研付或乳汁調杏仁
末付

鉛紅影

治風熱上攻面鼻赤赤刺癢疹俗呼肺風

舶上硫黃白礬

各半

為末黃丹少許梁與病面色同

每上半錢津液塗之兼服升麻湯下瀉青丸

○ 蚬血六十九

諸血證辨法

瀉瀉弱為亡血細弦瀉按之居血

脫血浮弱按之絕為下血煩數者吐血沉弦必衄沉

為吐血太陽大而浮必衄吐血脈輕在肌肉尺自滑

睛暈黃眵赤上乳為失血瀉為少血脈來懸鉤為衄

血常所至而搏血衄身熱者死腸澼下膿血弦絕

則肝滑大則生吐血唾血脈滑小者生弦強者死

血溫身熱脈躁者死熱則血氣脈沉小留連或微者

易治浮大洪數者難治

凡血證身熱脈大者難治大邪勝也身涼脈靜易治正氣復也

衄血大抵與吐血同火載血上錯經妄行衄血者血出於鼻也河間

云云考陽熱常鬱於足陽明而上熱則血氣行焉
經云氣逆甚則吐血暴聲內逆肝肺相傳血溢
一取天府穴又足少陰腎之脉從腎上貫肝入肺中
循喉嚨其病則飢不欲食面如土色咬衄則有血夫
氣者陽也血者陰也氣主煦之血主濡之今血多行
上出於口鼻者皆是陽盛陰虛有升無降其血隨火
上越故也

涼血行血為主犀角地黄湯入鬱金

蓋犀角能解熱毒又
云無真抑金以山

花代之又云可內經謂身熱則死寒則生亦是大

槩言之豈無熱生而寒死者乎必兼症詳之可也

一方

荊芥穗研服或用蘿蔔上半截杵汁服又滴鼻孔并

灸大椎穴

在頂後第一椎上
針入五分灸隨年啞

門穴

在頂後又髮際
五分針入三分



二穴俱能止或用寒水紙於腦脇大椎三處貼之

本草以萱草根研汁一盞入姜汁半盞細呷之治衄

衄血吐血上行 山茶花為末入童便姜汁好酒調

服加鬱金尤妙又方鬱金末童便姜汁酒調服

經血逆行或血腥或吐血或唾血服韭汁最好

雜著云凡酒色過度損傷肺腎真陰咳嗽吐痰衄吐咳

咯血等證誤服參芪等日溫之藥則病日增世人不

識徃上服之致不效者多矣

東垣云傷寒衄血者仲景言不可發汗為脉微也若浮

緊者麻黃湯浮緩者桂枝湯已微者二藥俱不可用

宜黃芩為藥湯雜病見血多責其熱如衄血出於肺

以犀角升麻梔子黃芩芍藥生地紫生丹參阿膠主

之或曰實者犀角地黃湯虛者小續中湯加黃連主之吐血衄血皆可治

治一貧者虛弱氣促精神短少衄血吐血以麥門冬二

分人參歸身二分黃芪甘草各一錢五味五被作一

服水煎熱服愈繼而至冬天居大室卧大熱坑而吐

血再求治此又虛而有火熱在內上氣不足陽氣外

虛當補表之陽瀉裡之熱夫冬寒衣薄是重虛其陽

表有大寒壅遏裡熱火邪不得舒暢故血出於口憶

仲景傷寒論有云太陽傷寒當以麻黃湯發汗而不

