

43

841

薛醫產

上



薛氏女科卷一

目錄

無子論

受胎日期

巢氏病源論

臟腑分經

妊婦隨月調理

妊婦脉論

受胎脉

診脈訣

調經通論

虛癆

經閉

崩漏

帶下

調經十八論

調經問答

胎前問答

產後問答

逐月胎形并服藥驗方

薛氏女科卷一

無子論

婦人無子。或勞傷血氣。或月經閉絕。或崩漏帶下。或
右寸浮。命門火則為陽絕。或尺脉微。血少或少陰微。虛寒緊。即左寸
或尺寸俱微弱者。皆絕產脉症也。婦人深居閨閣。血
氣不調。凡胎前產後。及崩帶諸症。比男子十倍難醫。
或七情不節。或飲食失宜。或胎創未愈。而遽合。或登
廁風入陰戶。皆並為患。而成痼疾。蓋婦女尺脉有力。
而右手脉大。皆常理也。若腎脉微。或浮。或斷。絕不勻。

或滑或肝脉沈而急。此皆經閉不調之候。

受孕日期

凡受孕以婦人經絕日之奇耦而定男女。經絕一日三日五日而受孕者為男。經絕二日四日六日而受孕者皆女。經絕六日後。雖交媾而不受孕。

巢氏病源論

母之腎臟係於胞。胎母之真氣。子之所賴也。故婦人妊娠一月。名胎胚。足厥陰肝脉養之。精血凝也。二月為胎形。足少陽胆脉養之。成胚也。三月陽神為三魂。

手心主心胞絡脉養之男女分也四月陰靈為七魄
始受水精以成血脉手少陽三焦脉養之形象具也
五月始受火精以成氣足太陰脾脉養之筋骨成五
臟脩也六月始受金精以成六腑足陽明胃脉養之
毛髮生也七月始受木精以成骨手太陽_{少陰}心脉養之
精開竅通以遊其魂兒能動左手也八月始受土精
以成膏草手陽明大腸脉養之元神充足以遊其魄
兒能動右手也九月始受水精足少陰腎脉養之三
轉身也十月始足臟腑閏節入神受氣全第象成也

臟腑分經

五臟屬陰 心肝脾肺腎

心 手少陰屬丁火 喜苦惡鹹

腎左 命門右 足少陰屬癸水 喜鹽惡甘

肺 手太陰屬辛金 喜辛惡苦

脾 足太陰屬己土 喜甘惡酸

肝 足厥陰屬乙木 喜酸

心包絡 手厥陰屬丙火 惡辛

六腑屬陽 胆胃大腸小腸膀胱三焦

小腸 手太陽 心与小腸相為表裏

膀胱 足太陽屬壬水 腎以膀胱為腑

大腸 手陽明屬庚金 肺與大腸相為表裏

胃 足陽明屬戊土 脾以胃為腑

胆 足少陽屬甲木 肝以胆為腑

三焦 手少陽 與心色絡相為表裏

陰陽交媾。胚胎始凝。所藏之處。名曰子宮。一系在下。上有兩

歧。一達左腎。一達右命門。精勝血主。陽受氣於左子宮。而成

男。精不血主。陰受氣於右子宮。而成女矣。褚氏云。男女交合。陰

血先至陽精必衝。血裹精，入為骨。男形成矣。陽精先施，陰骨衝精，勝血，入為肉。女形成矣。父少母老，產女必瘦。須養血補脾，示而嫁。母壯父衰，生男必瘦。須壯脾，節色待壯而婚。懷孕須當保護，如鄰家脩造，亦能犯其胎氣。令男破形殞命。刀犯者，形必傷。泥犯者，竅必塞。打擊者，色青黯。繫縛者，必拘攣。應驗如此，慎之哉。

黃帝曰：人生病癲疾者，何也？岐伯曰：此名胎病。兒在母腹時，其母受大驚，氣上不下，精氣并居，令子發為癲病也。解顱者，頭縫不合，乃腎氣不足。蓋腎主骨髓，腦

為髓海。腎不足而腦髓枯。故顙門不足合也。羸弱者。
脾胃不和。飲食不化。血氣衰弱。不榮於肌膚也。小兒
在胎。或遇寒。或食熱乳。令兒伏熱。以致不食。故羸弱
也。心氣虛乏而神不足者。血氣少也。肺主氣。心主血。
血氣流通臟腑。循行經絡。產後則血氣傷。臟腑損。而
統領諸經絡之心。亦因勞傷而驚悸恍惚也。

妊婦隨月調理

一月足厥陰脉養胎。不可以針灸傷之。蓋此經內屬
于肝。主筋血。一月之內。血初塞否。寒多則痛。熱多

李時珍曰雞

屬木而骨反

里者從翼變

坎也受水木

之精氣也

煩人音分肝

腎血分之病

為宜

則驚。或舉重腰痛。腹滿飽急。猝有所下者。當服此方。

烏雄雞湯

烏雄雞甘平。無毒。

烏雄雞

一隻。治水。常食法。

吳茱萸

五

生薑

五

甘草

五

茯苓

二

阿膠

五

人參

五

白芍

五

白朮

五

麥冬

五

五

五

五

右先以水一斗二升煮雞汁六升入藥

煮汁三升加酒三升并阿膠同煮共取汁

三升徐服

補胎方

曾傷一月胎者宜預服此方

生薑

烏雄雞

一升

大麥

五

細辛

五

防己

五

五

五

吳茱萸方 生地方 白朮方

右藥以水七升煮汁三升分三服寒多倍加
細辛茱萸熱多去細辛茱萸加天花粉有憂
思加柏子仁三合去大麥食忌生菜薑棗桃
李雀肉又方加人參

二月足少陽脉養胎此經內屬胆主精二月始陰陽
踞經有寒不成有熱即痿若胎中風寒有所搖動心
胸悶滿臍下懸急腰背強痛猝有所下者當服此方

艾葉湯

丹參方 當歸方 人參方 艾葉方 阿膠方

麻黃方 升麻方 生薑方 大棗十二枚

右用酒三升水一斗煮為減半去渣入阿

膠同煎取三升分三服

黃連湯 曾傷二月胎者服此

黃連方 人參方 吳茱萸方 生地方 生薑方

右用醋七升煮取三升分四服日三夜一每

十日服一料若覺不安再加烏梅半升

三月未有定議見物而化手少陰主心脉養胎也經

內屬心。妊婦忌悲哀思慮驚動。寒則大便清。熱則小便難。若仆傷筋脈。腹滿疼痛。胛背痛。宜預服後方。

雄鷄湯

雄鷄一隻

甘草炙方

茯苓方

阿膠方

人參方

黃芩方

白朮方

白芍方

大棗七枚

生薑炒方

麥冬志心

右用水一斗五升煮鷄汁減半入藥再煮減半

加酒三升并阿膠再煮取三升分四服日三次夜

一次又方用當歸川芎各方

茯神湯 曾傷三月胎者服之

茯神 方 丹參 方 龍骨 方 阿膠 方 當歸 方

甘草 方 人參 方 赤小豆 方 炙甘草 方

右用醋一斗煮三升分四服日三夜一七日

後再服一劑如腦痛加桑寄生 方

四月手少陽脉衰忌針灸此經內輸三焦若中風寒則身發寒熱胸背痛胎上心煩猝有所下小便如淋宜服此方

菊花湯

菊花 方

麦冬

一升 去心

麻黄

去節 方

阿膠

炒 方

姜 方

當歸 方

甘草

方

半夏

炒 方

人參

方

大棗

十三箇

右用水八升煮四升入酒三升并阿膠同

煮取三升分三服

調中湯

白芍 方

生姜

方

李根皮

方

川芎

方

川斷

方

柴胡 方

白朮

方

厚朴

方

枳實

方

烏梅

一升

當歸

方

黃芩

方

芍藥

方

甘草

方

大棗

方

右用水一斗煮三升分四服日三夜一八日