

陳氏小兒痘疹方論

薛氏醫按

吳郡薛 已註

汪郡魏一元校

嘗謂小兒病症雖多而瘡疹最爲重病何則瘡疹之病蓋初起疑似難辨投以他藥不惟無益抑又害之況不言受病之狀孰知畏惡之由父母愛子急於救療醫者失察用藥差舛鮮有不致夭橫者文中每思及此惻然於心因取家藏已驗之方集爲一卷名之曰小兒痘疹方論刻梓流布以廣古人活幼之意顧不遑歟

和安郎判大醫局兼翰林良醫陳文中謹書

論痘疹受病之由

夫小兒在胎之時乃母五臟之液所養成形也其姦不知禁戒縱情厚味好啖辛酸或食毒物其氣傳於胞胎之中此毒發爲瘡疹名曰三穢液毒○一五臟六腑穢液之毒發爲水泡瘡○二皮膜筋肉穢液之毒發爲膿水泡瘡○三氣血骨髓穢液之毒發爲膿血水泡瘡三毒旣出發爲疹痘瘡也子母俱忌食葱韭薤蒜醋酒鹽醬獐兔雞犬魚腥等物世俗未曉將爲發舉往往不顧其後誤傷者多矣

論痘疹治法

凡小兒瘡疹未出已出之間有類傷寒之狀增寒壯熱身體疼痛大便秘結此正病也若無他疾不必服藥

愚按痘疹若小兒眉尾平和自有勿藥之喜蓋其腸胃軟弱易爲虛實故必不得已折其太過益其不足可也

凡瘡疹先分表裡虛實如表裡俱實者其瘡易出易靨表裡俱虛者反是表實裡虛者其瘡易出難靨表虛裡實者亦反是若始出一日甚至十日渾身壯熱

大便黃稠乃表裡俱實其瘡必光澤起發滿肥且易
壓也

愚按治痘疹之法與癰疽無異若邪氣在裡而實
熱者用前胡枳殼散元氣怯而虛熱者用參芪四
聖散虛弱者用紫葦木香湯虛寒者用參芪內托
散虛寒內脫者用木香散若邪氣在表而實熱者
用麻黃甘葛湯此要法也餘見各症

凡瘡疹已出未出之間或瀉渴或腹脹或氣促謂之
裡虛急用十一味木香散治之

愚按經云真氣奪則虛邪氣勝則實實謂邪氣實

而真氣虛也然倒靨瀉渴等症若喜熱飲食手足
竝冷或不食嘔吐者是爲陽氣虛寒也用辛熱之
劑補之喜冷飲食手足不冷或唇舌黑裂者陽氣
實熱也用苦寒之劑瀉之

凡瘡疹已出未愈之間不光澤不起發不紅活謂之
表虛急用十二味異功散治之

愚按張翼之云吐瀉少食爲裡虛陷伏倒靨灰白
爲表虛二者俱見爲表裡俱虛用異功散救之甚
至薑附靈砂亦可用若止裡虛減官桂止表虛減
肉苳蔻若能食便閉而陷伏倒靨者爲裡實輕用

射于鼠粘子食鹽用前胡枳殼散下痢吐瀉能食
爲裡實若用實裡則結癰毒紅活綻凸爲表實若
用補表則潰爛不結痂凡痘一見癰點便忌葛根
湯恐發得表虛也

凡痘瘡已出未愈之間不光澤不起發不紅活或腹
脹或瀉渴或氣促謂之表裡俱虛急用十二味異功
散送七味肉苳蔻丸治之

愚按前症審係表裡虛寒急用前法緩則不救○
一 小兒出痘不起發紅活腹脹瀉渴皆以爲不治
施院使謂表裡虛寒用十二味異功散一劑即起

發紅活諸症頓退又用參芪內托散貫膿而靨○
儒者薛戒甫子五歲出痘三四日下紫血日數滴
至八日不止而瘡不起御醫錢春林謂脾氣虛寒
用木香散二劑用丁香十一粒人參五錢一日服
之次日痘皆起而有膿由是血漸止二十餘日而
愈○一小兒起發紅活但不時作痒口乾作渴便
血面赤發熱先君謂腸胃有熱先用濟生犀角地
黃湯加柴胡一劑諸症漸退形體倦怠此邪氣去
而形氣虛弱耳用四君子湯加當歸黃芪紅花二
劑而安○一小兒痘瘡赤痛煩熱作渴或便血或

衄血先君用犀角地黄湯而血愈又用紫草快癍
易加黃芪芍藥而愈後瘡痕色白用四君歸芪治
之而痊○一小兒出痘吐血其痘赤痛如錐或瘡
出血余謂肝火熾盛用小柴胡湯加生地一劑隨
用濟生犀角地黄湯一劑頗愈又用芹菜汁而痊
○一小兒痘瘡下血而不起發先君謂氣血不足
用紫草快癍湯加參芪歸朮治之血止瘡起但貫
膿遲緩用八珍湯倍加參芪數劑瘡靨而根白痒
此氣血虛而熱也用八珍湯二十餘劑而愈○一
小兒痘疹大便下血小便甚赤瘡顯色赤發熱飲

冷先君謂熱毒鬱滯先用八正散一劑後用解毒
防風湯一劑頓愈又飲芹菜汁而全痊○一小兒
痘正發而便血倦怠少食作渴飲湯余謂倦怠便
血此脾虛而不能攝血也少食作渴此脾虛而津
液短少也用五味異功散加升麻紫草治之而愈
○一小兒便血腹脹困倦發熱口乾飲湯四肢逆
冷先君以爲脾氣虛寒不能攝血用五味異功散
加丁香十粒炮薑五分二劑血止痘貫而靨○一
小兒七歲患痘瘡腹脹八九日矣先君云當急補
脾土不信仍服消毒之藥忽大便下血甚多而歿

○一小兒作渴泄瀉發熱飲冷唇舌皸裂瀉糞穢臭先君以爲內熱所作用前胡枳殼散一劑稍愈又用清涼飲加漏蘆乳母服之兒頓安

凡小兒斑駁疹毒之病俗言疹子是肺胃蘊熱因時氣薰發於外狀如蚊蚤所咬赤則十生一死黑則十死一生大抵遇春而生發至夏而長成乃陽氣薰蒸故得生成者也臟腑調和血氣充實則易出易靨蓋因內無冷氣外常和煖也凡痘疹熱渴切不可與瓜柿蜜水等冷物及清涼飲消毒散等藥恐損脾胃則腹脹喘悶寒戰咬牙而難泊蓋咬牙者齒稿也乃血

氣不榮不可妄作熱治

愚按前症若兼吐瀉手足指冷者屬內虛寒而外假熱也急用木香散如不應異功散若大便不通渴欲飲冷者則前所禁蜜水之類又當用矣但宜審其熱之虛實若屬虛熱者雖欲水拒之而不飲當用人參白朮散熱渴自止屬實熱者自甚索水且喜而飲之當以犀角磨水服諸症即解其後亦無餘毒之患矣北方出痘不拘冬夏若喜冷者再不用藥但與水飲無有不愈蓋北方地燥而又睡熱炕故也○一婦人患時疫將愈更出痘瘡大

起發體倦痛甚則昏憤煩渴飲湯不思食用十全
大補湯及朱砂末其痛頓止食進體健仍用前湯
倍加參芪十餘劑而貫膿又數劑而愈○一妊婦
發熱作渴遍身骨節作痛用仙方活命飲二劑諸
症稍愈至十一日出痘百餘顆形氣甚倦用紫草
木香散又出少許但口乾作渴用人參白朮散而
渴止用八珍湯加柴胡丹皮而貫膿後去丹皮柴
胡倍加參芪數劑而痘靨○一男子年將三十出
痘根窠赤痛發熱作渴服紫草飲之類前症益甚
痘裂出血余用小柴胡加生地犀角二劑諸症頓

減又用聖濟犀角地黃湯而貫膿再用八珍湯而
結痂○一小兒煩燥飲冷不止先君用濟生犀角
地黃湯頓愈後渴而喜熱又用當歸補血湯而痊
惟倦怠少食用七味白朮散而痊○一小兒患此
飲冷不止或痘眼痛先君用濟生犀角地黃湯并
芹菜汁而頓愈

凡痘瘡出不快多屬於虛若誤謂熱毒壅盛妄用宣
利之劑致臟腑受冷榮衛滯滯不能運達肌膚則瘡
不能起發充滿後不結實成痂痒塌煩躁喘渴而歿
愚按前症亦有各經熱盛壅遏而出不快者亦有

毒甚痘疔而不能發起者亦有餘毒而潰痒者當
細審其因而藥之○一小兒九歲出痘六日痒塌
寒戰院使錢密菴用十一味木香散二劑貫膿用
參芪托裡散而靨後痕白作痒用十全大補湯而
愈○一小兒痘瘡膿未滿而赤作痒余謂氣血虛
而有熱欲用溫補之劑不信乃服清熱之藥至十
三日瘡痕色赤虛煩作渴腹痛不食手足逆冷而
歿○一小兒未週歲痘瘡焮痛出血哭不能已診
其母有肝火先用小柴胡加山梔生地與母服子
飲數滴頓愈又用加味逍遙散而痊○一小兒出

痘內有痘疔數枚雖挑破出黑血熱毒不解餘痘
不發皆以爲不治先君以仙方活命飲徐灌一劑
痘疔解而諸痘亦愈○一小兒痘疔患在脣間色
黑大痛挑出黑血仍復堅痛皆以爲不治先君用
隔蒜灸數壯痛止色淡而軟挑出黑血甚多灌以
活命飲患處及諸痘貫膿而愈

凡小兒纔覺傷風身熱是否瘡疹便服四味升麻葛
根湯

愚按痘疹未明而元氣實者最宜前湯若元氣虛
者又當詳治恐發得表虛而痘難出也○一儒者

年三十餘因勞後倦怠發熱服補中益氣湯數劑
發赤點以爲癰另服升麻葛根湯一劑更加惡寒
仍服益氣湯四劑至九日出痘甚多余用八珍湯
加黃芪白芷紫草四劑至二十日膿始貫用十全
大補湯月餘而靨

凡痘疹始出一日至五七日之間雖身熱或腹脹足
稍冷或身熱瀉渴或身熱驚悸腹脹或身熱出汗者
服十一味木香散

愚按前症屬脾氣虛寒假熱非此藥不救如未應
佐以六君子專補脾氣更不應加木香補骨脂肉

豆蔻兼補腎氣○一小兒第五日不紅活至九日
質膿不滿余謂氣血虛弱用十全大補湯治之庶
無後患不信至脫痂痕作瘳色白至十四日而歿
○一小兒第七日膿清不滿形氣倦怠飲食少思
大便不實用托裡散二劑手足指冷咬牙作渴用
木香散倍用參芪一劑諸症頓退又用參芪四聖
散四劑而愈

凡瀉水穀或白色或淡黃煎十一味木香散送七味
肉荳蔻丸治之瀉止者住服不止者多服

愚按前症若察其外症若唇青指冷睡而露睛口