

丸料加麥冬五味子治之而愈後因勞怒吐紫  
血塊先與花蕊石散及獨參湯漸愈每勞則咳  
血肺脾腎三脉俱虛大洪數投補中益氣湯及  
六味丸全愈



胃火寸隣脉滑數無力惡心口乾不喜食胃有虛火也二陳薑汁炒黃連麥蘖枳木一二服後加人參

胃弱氣口脈緩弱或遲無力或虛大嘔吐不食屬胃虛有寒必過服寒涼或生冷所致宜香砂六君子湯加厚朴蒼朮甚者加炮薑

胃中痰氣口脈滑實嘔吐不食體厚多鬱屬濕痰仍宜吐之吐定二陳二木香附川芎開鬱

行氣

血鬱氣口脉芤，胃間作脹，口作血腥，或胃脘痛，面色痿黃，乃胃口有瘀血，宜荳汁加酒飲二三盃，覺心下膈爲佳。後以越鞠加血鬱藥炒梔子倍之。此過食炙燭，厚味多怒人有之。

脾傷脾傷則四肢惰怠，飲食不運，宜補以健之，非參、木、白芍，不能補脾。非山楂、麥糵、枳實，無以助其健運。明哲類而推之也。

食滯關脉沉緩，能食不能運化，停滯心下痞悶，噯氣嘸酸，如敗卵臭，乃脾弱食滯也。宜消

健脾二陳枳木厚朴山楂麥蘖食下宜補中  
氣平時食不消化枳木最妙隨症加減瘀加  
半夏火加黃連梔子寒加砂仁

脾久病宜補中久病後或吐瀉後食不消化脈  
澁或弦而無力屬脾家陰血少津液不能潤  
濡以致轉化失常宜養血潤燥健脾下焦通  
利津液四布自復四肢怠墮面黃手心熱脉  
緩大無力自屬內傷補中益氣湯正藥久病  
不食或食不消化痰多或過服壯藥致損

脾胃、六君子湯最捷、

脾胃忌苦寒、脾胃兩傷、納化皆難、或吐或瀉、面  
色瘦黃、體倦不支、參苓白朮散佳、病後調理  
最妙、百病皆以胃氣爲主、况病後乎、昧者不知、  
謬以黃柏知母、用滋陰氣、苦寒傷胃、轉變  
他症矣、

老年或久病、脾胃不和、食少不磨、或吐或瀉、  
補脾藥中、加砂仁、肉蔻、破故紙、妙良由下焦  
元陽虛、不能薰蒸、惟行降令、如金中無火也、

二神丹治五更腎瀉、大腹奇驗，亦是此意。  
薛立齋法補脾不若補腎，用八味丸以補命  
門，相火虛則神其母也。健脾藥不應用之屢  
驗，淡見者去桂附即不妙。

胃中濕痰宜升舉肥人體倦，脾胃不和，食少飽  
悶，胃中有濕痰也。宜燥之，二陳、二木、香附、厚  
朴少佐枳實，氣下行加升柴。丹溪謂升柴二  
木二陳湯能使大便潤而小便長，殆爲濕痰  
鬱于中焦以致清陽不升、濁陰不降，痞塞填

滿二便阻塞而設二木燥脾濕二陳化痰升  
柴引清氣上升清氣一升濁氣自降鬱結開  
通津液四布濕流燥潤而小便長矣非至精  
至神孰能臻此妙境未學膚見謬指爲迂或  
謂古法不宜于今誠爲可咲

瘦人健脾兼養血瘦人脾胃不和傳化失常大  
便乾燥口時燥心下飽悶多屬血虛宜健脾  
兼養陰血忌滲涌分利白术白芍陳皮炙甘  
草麥芽厚朴薑製黃連當歸知母麥冬花粉

之類

健脾大義養胃必用參术、健脾必用枳术、健者運也、動也、脾氣不運而助其力以健運也、與天行健之健同、

平土、脾胃屬土、土氣太過曰敦阜、人之中焦濕熱盛、卽是有餘、須平胃五苓之類平之、此邪盛也、若後病或稟賦怯弱、生冷油膩傷其脾胃、而虛悶痞滿不食者、必以白术爲君、茯苓陳皮、枳朴等和中藥爲佐、脾胃喜香甘、常以

陳土炒白术炒麥蘖炙甘草陳皮炒扁豆人參加薑棗煎服養胃進食殊驗喜食而運行遲者以枳木加神曲山楂二陳隨症加減宿砂白豆蔻辛香俱能快膈開胃第性稍溫恐積溫成熱無火者宜之胃弱面青白淡黃手冷脉緩少加于參芩木草中最妙二三服而止食少迷悶輒欲小便倦怠者卽是元氣下陷補中益氣湯倍升柴膈間痞悶不食面慘脉沉自是氣鬱當從鬱結治

虛則補母，補脾胃藥湏入養心藥，蓋火能生土也。古方用益智，正是此意。

脾既不能健運，傳化失常，胃膈痞悶，悉由七情拂鬱，饑飽失時，膏梁厚味，釀成痰火，以致脾爲所困，力不能勝，乃爾。必以白朮補脾，和中滲濕爲君，枳實消導，化痰清火爲臣，二味乃健脾之至藥也。然所感不同，爲病亦異。余每因人加減驗有六法，神而明之，存乎人，又不可執一也。昧者偶得一效，輒局信之，不知宜于此者，必防于

彼妙在合宜耳、

益氣健脾丸、脾弱不能運化、四肢倦怠、面色痿黃、口淡耳鳴、食少宜此。

人參

三兩

白朮

三兩

陳皮

半兩

炙甘草

八錢

枳實

半兩

半夏

半兩

陳皮

白朮苓

二兩

大便濁加山藥、扁豆炒蓮肉、甚者加肉豆蔻化痰健脾丸、脾胃弱而有痰者宜之、

人參

白朮

各三兩

枳實

一兩

半夏

一兩

陳皮

膽星

各一錢

一

兩

伍

蛤粉

一兩

赤茯

兩半

半

神麌糊丸

清火健脾丸

脾胃弱食少嘈雜惡心有火症

者宜之、

白术

三兩枳實

一兩半夏

陳皮

各壹兩伍錢

炒梔子

一兩炒黃連

五錢

水丸

舒鬱健脾丸

多抑鬱人心下不舒食少倦怠

婦女用此最宜、

白术

四兩

枳實

二兩

香附

五兩

川芎

一兩

陳皮

五錢

神麴各兩半

神麴糊丸

養榮健脾丸

血少腸胃枯澀、口乾便祕、皮膚

乾燥、食不能運、婦人經血乾涸、色淡來少、

人參

白朮

各四兩

枳實

半兩

當歸

白芍

各三兩

撫芎

一兩

麥門冬

二兩

柏子仁

一兩

生地煎湯熬膏丸

健脾丸如無別症、祇是食後不便傳化、因而

食少用此

人參

白朮

各四兩

枳實

三兩

山楂

一錢

麥芽

陳皮

兩

神麃糊丸

易老法用荷葉煮陳米飯爲丸

取上升之義最妙

二陳湯

見痰門

越鞠丸

見鬱門

補中益氣湯

見內傷門

平胃散 治中焦濕盛嘔吐痰水，冒膈痞滯脾

胃不和飲食不其

厚朴

炒陳皮

湯洗去白

茅山蒼木

米泔浸一宿去

五兩皮晒乾

甘草兩

生薑兩

汁三小棗一百枚核

用水五升煮乾搗作餅子晒乾爲末，每服二錢，鹽湯點服。久瀉用烏梅生薑湯調。

六君子湯 治脾胃不和而有痰。

二陳加人參白朮薑棗煎，隨症加減。

參芩白朮散 治脾胃虛弱，飲食不進，嘔吐瀉利。大病後扶助脾胃，極妙。

人參 白朮 白朮 去白朮 山藥 白扁豆 去壳

體炒各一  
兩五錢

甘草

桔梗

開提

薏苡仁

蓮肉

各一  
兩

右爲細末每服二錢棗湯調下

余常加炒麥芽一兩砂仁三錢山楂肉五錢  
爲丸每每獲效有痰加半夏八錢

一人曾用有効蓮肉蒼朮各四兩同上藥入  
洗淨猪肚中縫緊煮極爛搗爲丸想此人必  
脾弱多燥結乃補潤之古方道寧純陽丹法  
同此但藥多燥又有三棱蓬朮恐非脾弱者