

外科大成卷之四

太醫院御醫燕越祁坤廣生甫

輯著

不分部位小疵部

何謂小疵若名腫毒大症也若大瘡風濕等症也

此皆小症不可紊亂於大毒之內故另分之

無名腫毒

無名腫毒者以其隨處而生不按穴次不可以命名也皆由風邪寒熱客於經絡之所致但其因風邪內作者則無頭無根因氣血相搏者則有頭有根因風寒而成者則腫堅而色白因熱毒而成者則腫嫩而色赤治法有表症者散之有裏症者下之

外兼敷貼等藥總不外乎首卷腫瘍之例並宜參考。

灸曲池穴甚効穴見首卷灸門

漏蘆湯

治癰疽疔腫不問陰陽初起者及初潰紅腫尚未消盡者並濕爛疥瘡等毒

漏蘆一錢五分 紫花地丁 荆芥 當歸

連翹 薄荷 白芷 升麻各一錢

麻黃三錢 大黃二錢 生甘草四分

水二種煎八分食遠熱服蓋衣取微汗渣再煎溫

服次日麻黃用二錢大黃用錢半甘草用六分溫  
服第三日則麻黃大黃甘草各用一錢溫服如其  
紅腫尚未消盡照第三日方再三二服無不愈者  
是方也如不欲汗則麻黃少用溫服之如大便不  
實及不欲下者則少用大黃不用亦可隨病上下  
在食前食後服 如便毒服利藥正氣傷皮厚未  
穿者服此一汗不斫而穿

飛騰神駿膏

治癰疽腫毒瘰癧鼠瘡

麻黃

去節淨  
用一觔

杏仁

泡去皮尖砂鉢內研如  
泥入水再研澄去濁

防風去苦四兩地骨皮去骨四兩甘草四兩燈草一大把

黑鉛一塊木别子肉十四箇頭髮一大團洗淨

共入大銅鍋內入水二桶炭火煎減半取汁渣再煎二次絹漚淨并一處復將燈草頭髮黑鉛同汁煎至成膏去此三味再煎稠收確內香甜久貯不壞每服三錢熱酒調服隨飲至醉爲度蓋卧出汗避風一日次日食猪蹄補之此方於初起時及將潰時服之神驗

軍門立効散

治癰疽諸毒對口附骨疽等

皂角刺

三錢炒熱入

乳香

五七分炒香化再入

天花粉

三錢

甘草節

一寸長九箇

川椒

三十粒

黃酒二鍾煎一鍾溫服未成者即散已成者即破

已潰者不宜服

一用皂刺

三錢

乳香

七分

花粉

一兩

甘草節

二錢

炒製如法酒煎服治紅腫焮痛便秘者甚捷

壺公妙劑散

一切

諸毒

乳癰便毒筋骨疼痛不問新久悉皆神驗

川山甲

炒

葫蘆巴

槐花

黑丑

末頭

當歸

等分

三  
名  
腫  
毒

函三堂藏板

爲末每服五錢用溫酒調成塊挑入口內隨用溫酒送下隨飲幾盃以助藥力

樂衛返魂湯

赤芍

木通

白芷

何首烏

枳殼

烏藥

當歸

各一錢

小茴香

五分

甘草

三分

水一鍾酒一鍾煎八分溫服

初起堅硬如石者加川芎麻黃獨活葱頭水煎熱服出汗 胃寒生痰者加半夏 鬱熱生痰者加桔梗久不愈食少色痿者涼藥太過也去木通減

當歸倍加陳皮厚朴甚者再加白豆寇 肺癰吐  
癰內癰等症倍加忍冬藤此藤治內癰之神藥也  
補加大附子利用酒大黃 隧痰失道陽少陰多  
者加升麻以除其寒 久潰無膿時流薄血壞肉  
如絮努肉如突者宜之外用枯礬朴硝末滲之忌  
用刀針蝕藥

老弱者患于上部去木通恐導虛下元氣血盛者  
減當歸多能生血恐再結不已泄瀉者先服蠟礬  
丸米湯下瀉止再服 腰痛經年不愈者加草薢  
玄胡索

脚氣加檳榔木瓜川山甲 熱痰咳嗽加紫蘊

疝氣嘔逆加木香 此藥救壞症活死肌弭患於

未萌之前拔毒於既愈之後扶胃本而不傷元氣  
更不分經絡但漫腫堅硬不紅不痛者用之悉驗  
托裏溫經湯

治寒覆皮毛鬱遏經絡熱伏榮中不得伸越聚毒  
腫痛惡寒發熱或相引肢體疼痛者

麻黃

防風

蒼朮

白芷

升麻

葛根

人參

當歸

白芍

甘草

再服去麻黃防風加牛旁子連翹

麻黃苦溫防風辛溫發散者也升麻苦平葛根甘平專陽明解肌者也血留則痛歸芷辛溫破血散滯濕盛則腫蒼朮苦溫瀉溼裏之邪參草甘溫白芍散寒調中托裏水煎熱服蓋臥之使陽氣伸而汗出其腫自消去麻防加旁翹其痛自止

加減瓜婁散

治內癰腦疽背腋諸毒癰癰便毒乳岩等症成者卽消已成者速潰

大瓜婁

一箇子多者佳少者用二箇杵爛

當歸 三錢

沒藥 二錢

乳香

甘草 三錢

金銀花 五錢

生薑 五錢

用無灰酒二碗煎一碗服 將潰者加皂角刺五

錢 乳癰腦疽加蒲公英土貝母各五錢潰後用

參芪補之

滌風散 熨風腫痛疼

羌活

防風

白芷

吳萸

細辛

官桂

芫花

當歸

芍藥

各五錢

爲粗末赤皮葱

連鬚切碎半碗

用醪醑拌勻炒熱帛包於

瘡上熨之稍冷易之以痛止爲率

移險散

南星

白芨

草烏

黃柏

各二兩

文蛤

炒一兩

爲末調如糊隨血圍匝如墻壁可移險處就不險

處

南星

白芨

白歛

白芷

貝母

等分

水調此藥敷前圍藥之內提起內毒制之有理

葫蘆化毒丹

治一切腫毒熱癰

大黃

黃柏

遠志

等分

為末用猪胆汁和成錠雄黃為衣陰乾用時以米醋磨如墨以鷺翎蘸藥頻塗患處

醒肌膏

治腫毒惡瘡及風氣腫疼鶴膝風冷濕痛腰痛脚氣痛婦人產後受風經絡冷痛

廣膠

四兩用葱薑取汁各一碗浸膠過宿文火煎膠化入

硫黃

未一兩

草烏

未一兩

芡粉

一兩

薑粉

一兩

煎成膏再加

蟬酥

錢一

麝香

分四

乳香

錢二

沒藥

錢二

各末和勻頓滾水內刷絹帛上貼之以熱鞋底熨

之俟痛止變麻木則死肌活矣 一刷皮紙上用

時隨大小剪貼熨之宜與首卷牛膠蒸法參考

取薑葱粉法

葱薑各杵汁三二碗薄鋪磁器內晒乾成粉

滲雪膏

治一切風熱攻注頭面四肢腫痛

朴硝二升於臘月中入新瓦罐內冲熱水令滿

攪勻掛簷下俟硝滲出罐外陸續收之用

人乳調敷

瑞龍膏

敷一切腫毒對口乳癰便毒紅腫煖痛者

不問未成已成悉驗

鮮鯽魚

大者一尾

鮮山藥

如魚長一條去皮

先將魚入石柏內杵爛次入山藥再杵如泥量

加冰片和勻攤敷腫處綿紙蓋之黃酒潤之

凡腫毒已成者如純陽症則孔似蜂窩用貝葉膏貼之日換七八次善能止痛呼膿生肌完口更無粘連之苦 半陽半陰症者則漫腫無頭微紅微熱用紺珠膏貼周圍腫處中畱頂塗玄珠膏再以黑膏蓋之則餘腫自消膿從孔出內服托裏之劑

純陰症者內服辛熱大補之劑外用神妙拔根方

以疎其毒

已上諸方俱見首卷

### 丹毒

丹毒者爲肌表忽然變赤如丹塗之狀也經曰少陰

司天客勝則丹疹外發及爲丹燦然二症亦有紅  
白乾濕痒痛之殊故用藥則分表裏補瀉之異如  
色赤而乾發熱作痛者爲丹毒屬肝心之火宜化  
斑解毒湯△色白而濕爛流黃水痒痛不時者爲  
風丹屬脾肺濕熱宜除濕胃苓湯△痒而搔之起  
塊成餅成片皮色不變者爲冷膜故天陰則劇風  
中亦劇晴煖則減身暖則瘥由風邪外襲熱鬱於  
肌膚也宜藿香正氣散發之外以枳殼煎湯浴之  
忌用風藥○再如丹毒由胃氣虛極致令虛火遊  
行於外者又宜補以降之用人參

錢五當歸白朮各一

錢五分 水煎服之。○又如女子十五歲而經脉未通

者多發丹疹此由血有風熱乘之也治宜涼血虛則補之慎投風藥

化斑解毒湯 治三焦風熱上攻致生火丹延及遍

身而作痒痛

玄參 知母 石膏 黃連

牛旁子 人中黃 升麻 連翹 各一錢

甘草 五分

水二鍾淡竹葉二十片煎八分服

除濕胃苓湯 治脾肺濕熱致生火丹作爛疼痛者

防風

蒼朮

白朮

赤茯苓

陳皮

厚朴

猪苓

枝子

木通

澤瀉

滑石

各一錢

薄桂

甘草

各三分

水二鍾燈心二十根煎八分服

藿香正氣散

治冷膜由風寒外襲者

藿香

白朮

白芷

桔梗

紫蘇

陳皮

半夏

大腹皮

茯苓

厚朴

甘草

水二鍾生薑三片紅棗二箇煎八分服