

瘡瘍經驗全書



瘡瘍經驗全書目錄

第三卷

胃疽鼠疽圖說方二

脾癰圖說

右搭肩發圖說方四

兩肩兩脇癰疽發圖說

血潰流注疽圖說方三

癰發圖說

委中毒圖說方二

腿遊風圖說方三

又圖說

三串毒圖說

右搭肩發圖

左右甲說圖

癰瘡圖說方三

臂疽圖說方

腎癰圖說方三

陰毒瘡圖說方十

左右便毒圖說方

穿襠發圖說方四



女陰蝕瘡圖說方二

冷漏濕毒流注圖說方二

坐馬癰圖說方三

附骨癰圖說見上

鶴膝風圖說方三

人面瘡圖說

脚手發背圖說方二

脚拐毒圖說

跟疽圖說方一

血風瘡圖說方三

腎氣遊風圖說方二

小腸流注圖說方二

紫疥瘡圖說方四

貼骨疽圖說方一

臟毒症圖說方三

膝腿毒圖說方二

肱疽骨槽疽圖說

骨癰疽圖說

骨疽瘡圖說

鞋帶瘡圖說方二

風疔瘡圖說方一

裏外廉瘡圖說方五



飛遊毒圖說方二

楊梅瘡圖說方十八

雀子班圖說方二

大麻風毒圖說方八

冷疳圖說方一

眉疳瘡圖說方一

赤遊丹圖說方二十二

附痔漏症方五十二

紅絲瘡圖說方一

癰瘡圖說方十

諸瘤圖說方七

天泡瘡圖說方三

癰瘡圖說方九

頰疳瘡圖說方一

鼻痔圖說方九



南京中医药大学图书馆版权所有

瘡瘍經驗全書卷之三

宋燕山寶漢卿輯著

天都洪瞻巖
桐川陳友恭
全校

圖論方

上肩疽下鼠疽



此毒因怒氣上攻于心酒後房事下傷于腎宜服加味托裏散

桔梗

厚朴

白芷

人參

黃芪

當歸

本草綱目卷之三

官桂

川芎

荊芥

黃芩

烏藥

防風

連翹

香附

枳殼

天花粉

石水煎服

胸膈滿悶加陳皮砂仁

熱盛加小柴胡黃芩玄參

咳嗽加麥冬地骨五味杏仁桑皮

口乾煩燥加麥冬前胡乾葛烏梅

寒多加厚朴防風藿香再服黃凡丸通氣散仍貼玄武膏金經膏

如膿出盡時服內補散三四貼

膿未盡時服排膿內托散

小便赤澀用五苓散加黃連燈心膿之

其毒從小便中出

更服乳香護心散日進五服

又服黃凡丸日進三服

開胃散

治發背寒氣入胃不欲飲食

砂仁

枳殼

陳皮

茯苓

肉桂

甘草



北京中醫藥大學圖書館藏


麝香

厚朴

右水煎服

仍用神異膏貼之

三串毒



此毒上下生之其形雖一而中間皮好但肉潰爛初起紅色亦不大痛曰漸潰爛此症之來亦屬憂情所感嚴寒酷暑所遇積毒于臟腑或年老男婦性度怕熱而亦患此者想平居坐臥濕地而然也若無外症得生若飲食日減泄瀉發熱勢難生矣

治法與發背諸癰同


腎俞發及脾癰



此症下腎俞雙發因飲熱酒行房怒氣傷脾受濕而得也陽發于
 外可治痰發陰發陽于腎膜膿稀者爲虛難治若老少婦人性氣
 溫和飲食謹節又無六情惱懷而亦患此者乃受地之濕氣或暑
 月以冷水沐浴而然脾癰發于左膊之間初發可用艾火灸之急
 服追行湯汗之即散治法服藥同前蠟凡丸甚宜服之

發肩搭右

發肩搭左



此症少陽經少血有相火尤甚于厥陰發于左搭肩骨上生者以動之處人可治難安串於右搭肩者必難治也此症由於風寒之來以脉斷之邪在表其症大小便如故飲食如常口能知味其不在裏也不惡風只燥熱脉不浮知不在表若表裏既和則邪在經絡中凝於經絡其癰斯出身半已上風從受之故云八風之變法當却寒邪調和經絡中氣血則氣血通暢自愈

摻藥

鷄黃皮炒 血竭 花蕊石 冰片

右爲細末濕用乾摻乾用清油調搽

加味麻黃桂枝湯 形實色黑背生經腫脾骨下通脉浮數而洪緊

食則嘔

食貝

生附子錢一錢瓜蒌仁錢五分羌活錢一錢甘草節錢六分人參錢一錢青皮錢一錢

黃芪二錢半夏六分白朮一錢山藥一錢

水二鍾姜三片煎服 冬天加黃柏

牛膠欬 截癰疽惡瘡險處服之使毒氣不攻於內不傳惡毒

牛皮膠四兩明好石右用酒一碗入膠內重湯煮令膠溶透者

用酒煎米湯調和服之

白芷升麻湯

白芷一錢升麻五分桔梗一錢甘草二兩生地二兩黃芩二錢


黃芪一錢連翹錢各二紅花一錢歸稍二錢官桂三分當歸一錢

生黃連一錢五分右十三味水酒各一碗煎至半碗服之須睡

龍情養心神不可妄想以動心火




左 右 串



此症發於左搭肩骨上生在移動之處可治難安串在右搭肩必
 難治矣可用雞黃皮及綿絮焙乾為末濕則乾搽乾則清油調搽
 如症發於右搭肩骨上生在動移之處可治難安串在左搭肩者
 亦難治之用藥搽搽依前左搭肩藥治之
 另有良方在前左串右二形圖後看方治之

兩肩兩脇癱疽發



凡兩肩兩脇邊成癱疽因血虛而氣亦虛切不可服補陽之藥
 熱劑即補陽也倘受熱劑則虛熱愈盛易致傷骨膜切慎切慎宜
 服十六味流氣飲內疎黃連湯治法與發背癱疽同
 湯劑附子薄桂烏頭之類禁用

血潰流注疽



此症多生膏梁形重之人有此症者好食煎炒炙博糖蜜之類其疽大者如雞子形像猶如紫李其腫不紅肉串經絡之間流注骨節之內遍身痠疼百節疼痛用內托散加木瓜一白芍連翹再服乳香護心散黃凡丸外用圍藥敷之不可遲也凡用藥以意消息切勿執方對症夫子曰疾固也

癰發


此症屬陰多生骨節之間初生如梅子大在於皮肉之間內不疼
不痒無力之人二十日始作紅腫有力人一月方作紅腫內先潰
爛皮面上紫黑色破後口不能收時常作痛出臭膿水必成其漏
則難治也急服排膿托裏散

排膿內補散

人參內補散

人參膏

五香連翹湯



蠟凡丸

護心散

更用猪蹄湯頻洗之

未潰之先用鐵箍散敷之能消其一半

瘡 癰



大抵下部之症以蒼朮為主佐以黃柏之辛行以青皮加以甘草
隨症用引經之劑則得効矣此毒受在脾腎經痛不可忍用內托
流氣飲治之

蒼朮

黃柏

青皮

甘草

芍藥

當歸

白朮

檳榔

川芎

羌活

獨活

白芷

木瓜

牛膝

杜仲

冬加薄薑

夏加黃芩

姜三片煎服

內托清氣飲

人參

茯苓

白朮

官桂

陳皮

木瓜

紫蘇

枳殼

甘草

芍藥

當歸

蒼朮

羌活

獨活

川芎

白芷

姜三片棗二枚煎服

再服紫蘓流氣飲

三香和氣飲

搽藥用腿遊風及婦人癰瘡藥通用



北京中医药大学图书馆藏