

未1

74

改良外科圖說

上海江東書局印行

華亭高梅溪先生輯

2864

第一善本

良改外科圖說

上海江東書局印行

論醫

圍藥貼紙

內托復煎散

忍冬酒

神效托裏散

麥冬散

梔子湯

三和湯

癰疽疔腫發渴惡心方

丁附五香湯

乳撥散

紫芷散

千金烏龍膏

烏獲追膿散

平肌追膿散

金絲萬應膏

咬頭膏

小降式

瘡名賦

開刀法

內疎黃連湯

蠟礬丸

化堅湯

歸耆湯

加味四七湯

大麥冬湯

托裏溫經湯

久梅毒方

消腫散

止疼散

追毒錠子

洪寶丹

粗料油煎

長肉膏

昇藥式方

刀剪形圖

消毒潰堅湯

流氣飲

神功活命湯

猪蹄湯

犀角散

柿蒂湯

黃耆六一湯

替針透膿散

內托營衛湯

十全大補湯

奪命散

隔皮取膿散

真君妙貼散

痘毒四箍散

煉松香法

太乙膏

三仙丹

治瘍提綱

參耆內托散

千金托裏散

發背初起方

透膿散

桑枝散

健脾散

六神散

復元通氣散

安神散

金極散

刻效散

水龍收毒法

驪龍散

痘毒摻藥

製黃丹法

麒麟竭膏

煎方參薑飲

寶氏論

參耆歸木膏

護心散

又方

牛膠飲

五味子湯

加味四君子湯

托裏溫中湯

酒製大黃散

柞木湯

又方

拔疔圍藥

海浮散

一艾二苗散

痘毒圍藥

長玉紫金膏

大降丹

全生煎

灸瘡法

內疎黃連湯

清心內固金粉散

發背不起方

竹葉黃耆湯

蜜花散

加味治中湯

清涼飲子

消毒散

青金膏

瘰癧痰核圍藥

刮毒丹

去惡肉方

發背圍藥

生肌長肉紅玉散

千鎰膏

八卦降式方

活絡開凝湯

黃耆雞首煎

奇功飲

養營湯

五柴胡飲

三陰煎

大營煎

參團飲子

甘露飲子

發髻毒方二

發耳

發肩瘡

卷二

顏癰

漏睛瘡

腮疽

神效灸癰

腎癰

刀針線灸烙論

左右串

坐馬癰附骨疽

返本湯

附理中

補中益氣湯

七福飲

養心湯

左歸丸飲

豬腎養危飲

利膈湯

鬚疽方二

頂疽毒方二

上下眼丹

面風毒

鴉喙瘡

對口瘡

臙瘡

陰蝕瘡下疳

上肩疽

兩脇癰疽發

貼骨疽

保元湯

六君子湯

七味白朮散

貞元飲

異功散

右歸丸飲

通邪煎

六和湯

疥癩毒方二

風毒頸癰

發頤毒

補益湯

育珠退熱湯

疎肝散毒湯

開結散

建中湯

金匱腎氣丸

開閉泄毒湯

防風通聖散

耳風毒方二

風毒疽

穿腮槽風

峻補煎

聖愈湯

十全大補湯

壽脾煎

郁氣丸

葦莖湯

掃廣飲

大防風湯

耳脹痛

頂門癰

培中湯

歸脾湯

生脈散

逍遙飲

加減一飲煎

牡丹皮湯

凝膚湯

復元活血湯

耳根癰

眉風毒

石疽

頭後蜂窠

寒瘡

腿遊風

小腸流注

脾癰

冷漏濕毒流注

市疽

頰疽

枕疽

瘰癧瘰核

陰囊毒

穿檔發即橫

左右搭肩發

紫疥瘡

市疽

醫家切戒
四時平脈
肺以下左側說
經旨問答
寒熱內外
五聲死
色聲心序
服藥有法
膽導法

七診
藏病
藏系心連
針灸日忌
怪脈
五體死
急治餘證
藏指膿水紙法
禁忌食物

元門脈訣
肝腎起五類
氣海隔膜
五行生剋
五臟死
五竭
坐臥宴息法
白保護法
炮製法

左右手圖
五臟相入
脾胃胞系
五善
五體敗
五傷死
安慰方後法
用藥加減
附子不可輕用

脈息節要
腑臟正面
闌門水穀
七惡
五證死
五不稱脈
煎藥法
割腐肉
總論病家大畧

七表八裏
腑臟背面
右腎命門
相訣生死
五色死
五視死
服藥治法
蜜導法

自序

余嘗讀醫書之經者七日。景之玉函金匱也。甲乙也。中藏也。岐黃問答之脈也。上古諸書本乎一貫。內外無分。蓋明于此者。必明於彼。善乎彼者。必善乎斯也。又有如脈學本草。湯液骨度經脈經絡筋經。以及奇經八脈等。竝不分某為某科。自宋代以後。醫書漸繁。而分內外及各科名式。但外科惟有膏丹敷貼之法。刀鍼之異耳。余於乾隆甲辰秋。由杭至川。道光丙戌冬。回至鄉里。四十餘年。歷游六七省。尋訪明師。搜求古訓。集成十餘種。精粹其外科。一曰金鍼。一曰花蜜。若圖說一書。摘花蜜之要言。與竇氏原稿合而為一。非敢希圖行世。博取微名。原不過使徒輩易於記誦。至於瘡瘍之藥。最難于降藥。一方不但得方難。且脩合更難。余覓五六方。惟大降藥方。羈留於杭城。六七年。大費重貲。適值奇緣。而得焉。諺云。千金易得一祕。難求信不誣矣。爰述其原委。弁於書首。

省

道光甲午秋華亭高文晉序於春暉草堂

華亭 高文晉梅溪氏輯

葉樹 金鼎言雲洲 全校
秦賢 張炳銓西亭

上海 王文源紫陵 參閱
秦賢 王繩石祖樵

論醫

癰疽之候雖發於外而病根實在於裏。能別陰陽虛實。經絡營衛。死證可活。大證化小者。此為上工。其次預明五善七惡。循理用藥。數貼矣。開感遵方法。見明則見善則效。此為中工。若畧讀幾卷。執拘自是。耳食閑話。滔滔不竭。一味卑躬。奉使旁人。叫好。華衣轎馬。向昧者稱能。類聚消食。發散雜奏。成方不辨。陰陽虛實。咸稱易治。希圖取利。於目前焉。知命絕于日後。及問脈理。病因證之順逆。藥屬茫然。此等雖名下工。其實非醫也。然而天下之大。草野之間。豈無道賢逸士。若能細求經理。探討良言。海上實有仙方。家傳豈無神祕。即上工遇之。亦當為之遊一籌矣。

瘡名賦

上古治法原不重乎瘡形。但決在近世好奇。不得不立諸名號。近時看證。先鳳眉。近於印堂。在兩眉之內。魚腮。毒患在夾車。穴之。脚足脛後。名稱魚肚。前曰。臍瘡。此名。中指間號曰。天蛇頭。旁云。蛙頭。疔。黑疔。緣藏耳竅。久有乳巖之名。也。然女寡婦所生。宗肝。骨槽風聚。牙狀。人面瘡。生。膝蓋。陰。大。全。偏有。胸疽之號。又名。神。含。疽。乳。灘。奶。癰。疔。黑。疔。緣。藏。耳。竅。久。有。乳。巖。之。名。也。然。女。寡。婦。所。生。宗。肝。骨。槽。風。聚。牙。狀。人。面。瘡。生。膝。蓋。陰。大。全。偏。有。胸。疽。之。號。又名。神。含。疽。乳。灘。奶。癰。疔。黑。疔。緣。藏。耳。竅。久。有。乳。巖。之。名。也。然。女。寡。婦。所。生。宗。肝。名。則曰。虎。頭。瘡。生。骨。上。已。乃。云。鶴。口。難。治。若。無。膿。少。血。水。者。舌。吐。蓮。花。管。緣。心。熱。大。成。毒。流。玉。枕。盡。屬。陰。虧。此。症。全。屬。內。馬。刀。更。變。生。於。耳。後。牛。皮。癬。患。在。項。間。詳。瘡。癰。經。輪。石。榴。疽。生。曲。池。穴。之。內。楊。梅。毒。匿。陰。挺。也。後。有。論。再。考。上。馬。癰。下。馬。壯。乃。左。右。之。分。別。詳。外。科。便。醫。疽。透。腦。疽。緣。部。位。之。參。差。詳。大。扁。擔。毒。挑。於。肩。上。箭。袋。瘡。掛。於。臍。邊。上。同。虎。口。毒。乃。屬。外。邪。所。致。鵝。掌。風。或。緣。結。毒。而。發。科。法。生。見。外。科。便。醫。疽。透。腦。疽。緣。部。位。之。參。差。詳。大。扁。擔。毒。挑。於。肩。上。箭。袋。瘡。掛。於。臍。邊。上。同。虎。口。毒。乃。屬。外。邪。所。致。鵝。掌。屬。肝。虛。科。內。外。眼。三。流。注。脈。遲。可。救。必。須。症。補。多。翻。花。瘡。出。血。難。療。若。醫。鼻。痔。全。憑。外。法。詳。治。後。倘。過。痘。瘡。須。顧。元。虧。詳。外。科。四。下。瘡。濕。熱。淫。邪。血。前。陰。虛。火。心。發。背。雖。分。九。處。命。處。足。尻。骨。上。細。詳。在。後。宜。參。楊。醫。大。全。又。有。上。中。三。部。之。名。手。搭。高。低。二。樣。須。審。陰。陽。各。別。臟。毒。腸。風。聚。毒。前。病。在。重。後。病。在。酒。鼓。肺。大。辨。昇。外。鼻。中。乳。蛾。有。雙。單。之。號。詳。內。科。四。咽。喉。有。虛。實。之。分。另。有。論。上。疔。有。十。種。藏。經。瘤。分。五。經。詳。疔。有。九。樣。科。花。蜜。並。參。外。癰。有。六。名。後。有。論。繡。毯。風。子。癰。囊。癰。俱。生。囊。上。科。脫。落。懸。癰。海。底。漏。擋。疽。總。患。肝。前。龍。泉。疔。發。人。中。穴。熱。邪。內。鬱。鶴。膝。風。流。足。骹。寒。濕。下。凝。忌。針。狗。污。髻。髮。是。胎。元。道。毒。種。得。知。梅。花。頑。癬。乃。濕。犯。清。陽。火。丹。與。熱。毒。同。

方黃水瘡與肥瘡一類。治法亦同。腳根生瘍。古有漏蹄之號。頭旁生毒。俗呼肩掛。疽之名。欲解狐臭。即猪清肺平肝。最要若治汗斑。驅風理濕。卻宜膏蛇毒。黃蟾疔。出於宗金鑑。外科。蜈蚣毒。蜈蚣瘡。號出瘍科。詳外科。以上幾種俱佛頂。痼因生百會。項中。猛疽。緣患。中喉陰疽。發於腿間。色不紅。久云咬骨。疽。疫毒生於耳際。潰號失營。挾鴨蛋生於季腋之下。是田螺患在大指之間。赫癰。幽癰。在臍之直上。魚口。左便毒。名橫痃。在右又分腿之兩邊。挾棍瘡。生脚骨。潰有驢眼之稱。地間府發。鬚中。爛有羊獃。疔之號。玉百脚。肉刺。毛出於江湖之口。紫粉。瘰癧。瘰癧。條分。癰。選粹之書。肺癰。肚癰。腸癰。照經。更。全。而施治。貼骨。癰。附骨。疽。鑽骨。疽。按脈理以推詳。方宜溫補。頭曰膳拱。脰曰四淫。耳內流膿者。號曰停耳。目曰眼搭。足曰脫疽。經內。唇口堅硬者。號曰齰唇。以上幾條俱詳。若夫棉花。瘡。雀口。毒。透頂。穿鼻。蜂管。物。在陽。合。盤。楊梅。在。蠅。頭。笑。陽。腐。鐵。樹。開。花。通。頭。腐。裂。俱。均。是。楊。梅。瘡。雅。號。石。發。爛。發。煙。發。嚴。發。連。子。發。蜂。窠。發。百。萬。朝。風。昏。稱。發。背。凶。名。詳。德。宜。與。冬。爪。癰。黃。爪。癰。分。腿。癰。之。大。小。委。中。毒。膝。眼。毒。言。陰。毒。之。難。醫。詳。外。科。破。傷。風。湯。火。瘡。不。與。瘍。科。共。例。詳。外。科。知。須。手。發。背。足。發。背。卻。與。外。證。同。條。小。腸。癰。肚。臍。先。凸。走。馬。疳。最。多。牙。齒。必。搖。至。於。赤。遊。風。白。遊。風。螳。螂。子。乃。小。兒。常。患。上。詳。同。陰。挺。陰。菌。鈕。扣。風。是。婦。人。所。生。後。詳。在。治。法。在。分。虛。實。按。脈。細。察。偽。真。或。補。或。攻。須。投。的。當。用。奇。用。偶。務。有。君。臣。幸。勿。心。粗。膽。大。自。然。漸。漸。精。明。

外科應用刀剪針各式物件全圖

外科

刀剪針

各式物件圖

小

中



大

大針
以白銅為佳



此剪入瘡口內剪腐不刺痛

方頭剪




六頭剪
用銀針打

治管銀針




此剪杭州大井巷張小泉最妙



鉗直



灸版



烹筒

押舌



劍針




探肛筒

昇藥筒



灸草




剪夾


牙藥超



灣刀
口在內



長針



藥竿




柳葉刀

口在此



小剪



拖刀



三稜針

過肛針

筆刀

銀絲

勾刀

刀口

六頭匕

烙錢

六頭剪口在外純鋼打

小烙錢

勾雙

穿肛針套

治癰疽之綱

治癰疽之法必須先觀形象細察病情。營血不傷根脚必無收束。衛氣若旺瘡頭最易發高。作渴昏迷瘡家所忌。痰喘音啞醫者宜防膿血膠粘者腐肉定於易去。青膿真穢者元虧毒甚難療。瘡肉有衣斷非善候。癰形板片不食莫勞。凡白硬根堅脈陰者。如沉清虛證也。用景岳參薑飲加黃耆肉桂紅腫高軟脈陽者。如大浮陽證也。用全生方加白芍穀芽。若漫腫無頭元氣虛而不能化毒者。活絡開凝在所必用。日久不潰陽氣衰而不能速腐者。黃耆雞首煎切勿遲投。惡寒返本湯保元湯發熱培陰補益湯膿出反痛是氣血並虛峻補真元散瘡肉不長乃脾氣衰頹培中湯益本欲嘔作嘔胃家中氣虛寒奇功散內托便滑腹痛脾胃陰邪交扭附子理中湯飲食不甘乃土氣式微之故生薑麥冬六君湯精神疲倦膚中宮脾胃弱衰返本湯新方陰虧宜用育珠湯熱盜汗還求聖愈湯不寐煩躁歸脾湯養營湯均可選用。渴家淋閉補中湯益氣七味湯遲服堪憂疎肝散毒麥味治潰瘍寒熱往來針大補保元湯瘡癰疽變患不測生脈散乃投脈細歸脾湯能止血流麥冬五味口乾是要藥白朮乾薑寒泄卻靈方。若夫七情成毒不出乎鬱怒憂思激傷肝臟勞形苦志漸損心脾及御女以傷腎臟之真陰真陽總以足三陰為要領。再審其元氣虧乏之何如如嗔怒不已動及肝陽以致氣隨血泣而患癰瘡馬刀癰者宜宗五柴胡七福散真元散開結散等方。或培中州氣血為主。若桃夭賦晚血滯三陰及腫泣離羣悲傷八脈以致厥陰論事營衛失行而患乳巖翻花者則用甘溫育陰之劑如壽脾煎逍遙散景岳三陰煎外如

萬葉阿膠若按算運籌頻勞太過偏損心脾而患乳疽海底管漏者則用甘溫培中之品如保元湯歸脾湯之類若金谷荒蕪志圖恢復及心存君國綏解無聊雖有失營失精之分總不外乎心脾二損營衛乖離之故須議養心湯異功散建中湯都氣丸之類若先天賦弱精海不充血涸於氣而成骨疽疥漏者法宜氣血雙培兼乎益腎若萌芽太早動種藍田虛火常熾熾成痔瘍肛漏者切勿瘡藥兩歧須崇顧本治法陽亢陰勝壯水為主如加減一陰煎大營煎左歸飲之類陰虛陽越導火宜先如右歸腎氣等丸加黃節至於變遷延染之毒如傷寒遺熱肺液大傷三消變痼真陰已涸而發肺胃腸癰者有攻瀉補元之法如葶藶散肺癰丹參圓散子猪腎散之類若下元虛損三氣襲足骨漸粗俗呼鶴膝風者壯年用羌獨參烏柏陳桑已髻齡及髻髮之年咸施鹿角六味丸等法若情戀燕毒潛陰壅及其衣同榻乃發疥瘡治分在內在外觸毒感毒之因用通邪煎開閉湯掃廣飲凝膚湯之類其餘四時春夏瘡癰用銀花土貝連翹不蔓橘皮甘草杏仁赤芍如過風淫化熱加以甘寒用土貝赤茯苓公英之品溫淫火旺參入純苦同毛慈菇橘葉苦丁茶暑逼氣分佐藿香菊花鮮荷葉以開解熱潛營間投西翠不佩蘭茱萸之芬芳秋來施辛涼以化毒冬間投溫散以催消若夫疔毒為殃加入地丁草金線癰濕邪變癰乃投羌活獨活烏前口蓋腐爛者甘露撒最宜時毒便溲者六和湯極妙痧後有瘰須邀防風通聖散咽喉腫痛乃投利膈湯靈方道遙散治婦人百病保元湯醫痘後諸瘍若跌撲瘀凝氣留作痛欲成瘡者又當用流動之品如桃仁湯復元活血飲取其循經通絡而不滯也如元氣怯弱者仍培氣血為主不可擬定一法總之瘡瘍凝泣關於心營毒化在於肺衛收功全仗乎中州妙處不多千金一訣故施治雖有溫涼補托之不同而變化手法始終貫有

寶漢卿論

人以五臟六腑為根本五臟不和則九竅不通六腑不和則留結為癰故癰者六腑不和之所生疽者五臟不和之所致六腑主表其氣淺故癰皮薄而腫高五臟主裏其氣深故疽皮厚而腫堅皆由六氣七情而成也然瘡瘍皆火之厲須分內外而治其本經曰膏粱之變足生大疔其源在裏發於裏也受持諸虛言內結而發諸虛未到從何道出皆自從虛而出也如太陽經虛從背出少陽經虛從鬢出陽明經虛從髭出督脈經虛從脛出經曰地之濕氣感則害人皮膚筋脈其源在表感則內行若脈沉實當先疎內預結其源脈浮大者當先托其裏恐邪氣傷內又有內外之中邪氣至感遇入經絡乃生癰腫經曰榮氣不從逆於肉理乃生癰腫治法大要托裏疎通榮衛三法托裏治其外之用疎通治其內之行榮衛治其中內之外者脈沉實發熱煩躁外無焮赤痛深在內邪氣沉裏故先疎通臟腑故先托裏防其內然內外之中者外無焮惡之氣血亦臟腑宣通知其所在經當知榮衛周體有腫瘍潰瘍今之癰疽是也內外俱虛宜大補氣血為主後行五香散者當防虛實之失其瘡之發先發紅腫為氣血鬱積蒸肉

化為膿其痛多在結作之時膿潰之後腫退肌寬痛硬漸減若發痛者虛也宜補之有穢氣觸者宜和解之風寒逼者宜溫散之以手掩腫上熱則有膿不熱則無膿況癰疽有表裏虛實用藥有補瀉溫涼稟受之厚薄形志之苦樂隨年歲時令而加減則病易療若內候用寒涼之藥而外敷貼冷藥然欲望其消散是借寇兵也其害不淺大凡陽滯於陰脈浮洪弦數陰滯於陽脈沉細弱流陽滯以寒治之陰滯以熱治之細詳其意陽滯陰滯作熱治寒治求之寒熱固可作陰陽論於陰於陽分明是氣是血也氣為陽行脈外血為陰行脈內相並分派周流循環一身無停止謂之一呼脈行三寸一吸脈行三寸呼吸定息共行六寸一身通行八十一丈得熱則行速而太過得寒則行遲而不及五味之厚七情之偏過氣為滯津液稠厚積而久止為飲為痰滲入脈內血為所亂因而凝濁運行逆澀或為涕瀉此陰滯於陽也正血滯於氣也凡血病今人或藥以助邪病上生病血之病日增溢出血外隊道溢塞升降有妨運化失令此陽滯於陰也正氣滯於血也病有寒熱則稟受之素偏虛邪之離合豈可以陽為熱陰為寒也浮洪弦數氣病之脈也為可遽作熱論沉細弱流血病之脈也為可遽作寒論此萬病之根本豈止癰疽而已大凡腫瘍時作毒氣上攻治之潰瘍後當作陰虛補之若老年潰後發嘔不食者多用人參黃耆白朮膏大補取效佐藥隨時症加減劉守真謂諸症瘡瘍而嘔者此濕氣侵於胃也藥中宜倍白朮王海藏謂吐者有物無聲乃血病也有食入則吐有食已則吐嘔者有物有聲氣血俱病也張仲景云嘔多雖有陽明症勿下之噦者無物有聲乃氣病也謂之逆者既逆也大自下而上衝胃口作聲者病後胃虛所致陰火虛也病至此當作凡矣但理無定在病有萬變為醫須隨時取中見可而進經曰知其要者一言而終不知其要流散無窮何謂情因是也何謂要治法是也治法惟東垣丹溪能轉其要悉詳載於外科新錄五善七惡具焉蓋煩燥時嗽腹痛渴甚或泄痢無度或小便淋瀝一惡也膿血大洩腫焮尤甚膿色敗臭痛不可近二惡也喘粗氣短恍惚嗜睡三惡也不能下食服藥而嘔食不知味四惡也目視不正黑睛緊小白睛青赤腫神上視五惡也肩項不便四肢沉重六惡也聲嘶色脫唇鼻色青頭目四肢浮腫七惡也動息自寧飲食知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消色鮮不臭三善也神彩精明語聲清明四善也體氣和平五善也然有症合七惡而皮緊急如善者有症合五善五皮后虛如惡者此不可不察又曰飲食如常實熱而大小便秘內外看相應肌肉好惡分明善也發渴而喘睛明睛角面鼻大小便滑目中不了肉黑而陷面青唇黯已潰肉青痰吐嘔逆惡也凡同志之士乞再推明改削毋隱毋畧

灸瘡瘍法

凡人患瘡瘍之症不拘何處其色鮮紅者為陽淡紅者為陰自有寒熱之分用手按患處熱如大烘者是頭聚或用濕綿紙貼患上先乾者為頭聚即用筆點記切蒜片如錢厚放患處置艾壯於上以火燬之若蒜片枯焦再易之待將畢三五壯着貼肉上灸為

佳。至少者。以二十一壯為期。頭頂上五壯七壯為期。艾炷止可如豆大。但而心為陽中之陽。其陽症不可灸者何。恐火氣內侵。勢益昌大。以火濟火。故戒之。惟陰症可灸。鬱氣濕熱。積毒偕大。以拔之。然以火濟水。自有相生之妙。臨灸畢。用口吹火。至滅。其大功。借氣得以入內。其症易散。設或灸不能即散者。灸連故也。雖不能全散。大能解毒。易潰膿。易斂瘡口。功難盡述。惟臟毒坐馬。難。以蚯蚓泥作餅。代蒜片艾炙之。以熱為度。易之如前。共十四壯為期。若附骨疽。癰毒入骨髓。擇天氣晴明和暖。辰神不犯吉日。午時灸至申時止。徐問病者骨中熱否。若果骨中熱方効。若灸不拘壯數。忽寒爆起者。是病根脫矣。即止之。凡灸須飲食半飽。并飲好酒。以通經絡。以和氣血。再令善笑談者。以亂其痛。亦妙方也。體虛者禁灸。

大抵病有淺深。効有遲速。亦有陰虛陽實。呼吸轉移。醫者須要膽大。心小。膽欲大者。有決斷之才。識見之明。當刺則刺。當攻則攻。不宜攻刺者止之。則能知標本。心欲小者。有救急之義。無苟取之心。富者辭之。傷廉貧者取之。傷惠須見利思義。斯稱醫職。近有。利己害人之徒。妬賢嫉能。驚嚇病家。深圖厚賂。初無定論。巧言於能。誇毀前醫。毫無識症。立方之見。起死回生之功。徒貪財排訕。耳竟有何益。其心不仁。莫甚于此。亦有病家輒聽其言。不分賢愚。自取其禍。與前醫何干。庸工之悞也。戒之慎之。亦有庸醫妄。投藥劑。輕用針刀火灸。勢愈重。殊將調反。怨後醫之不能捷効。噫。病不可急治者。而治之徒傷命耳。廣於治病者。豈能遂病家之心乎。亦有富家不念貧醫。恃豪傲慢。前恭後踞。良醫斷不肯屈。恣自壞自耳。又有輕命重財。不顧珍寶之樂。待全愈。伸謝。豈誠語哉。又有愈後伸謝痛財。以致醫者不能救。本良可歎也。須當各盡其道。方無愧於心。若遇極貧患病之人。普施藥劑。再助柴米。救其一命。則世業益隆。子孫豈無賢能者興乎。予因貧困。不能普施。極貧醫藥。持書此。

圖法貼紙妙訣

凡用圖藥。多加工夫攪千餘下。其藥自稠。輕手圍之。留孔必須如鵝子形狀。須用薄紙貼之。務要扯碎貼上。免崩裂疼痛之苦。待。圖藥晝乾。再用調藥餘汁潤之。以助藥力。況藥乾不能入肌肉。借濕以通竅耳。宜深詳之。

開刀手法

千金不傳

凡瘡瘍之起。疼痛。固屬於心火。久而陽氣升上。蒸肉化為膿。若不三思。原其膿之有無。遂爾開刀。則鮮血突出。膿從何來。致患者。前寒發熱。日夜疼痛。無法可止。或患症富家。多請醫者調治。內相妬忌。惟以開刀為首功。多獲厚謝。全不顧患者。噫。若用此心。以。仁術為盜徒矣。子孫豈能世其業哉。先將指頭按患上。隨手而起。四畔悉軟。觀其頭聚。擇辰神不犯吉日。將刀頭向上。開之。方不。致傷新肉。取出刀。再搥綿紙條。潤油度之。使膿水齊會。半日扯出。則膿水易乾。外貼呼膿膏。四圍再用搜膿散敷之。以上二法。誓不輕傳者。予慕軒岐得天地之心而善醫。仲景得軒岐之心而廣法。豈可擅利於一己。而害眾生乎。近見同道之友。

往往不善於圖樂惟利口聳人故意不待症熟輒肆開刀或同業妬忌以先開刀為首功多致患者不起哀哉此業也能生人能殺人況醫司人命故君子不可不慎也必須先去貪嗔之心次敦真實之念富不過求極貧不取稍有餘資再助以藥米之費免其日給之憂所謂作善降祥冥冥之中神明鑒察自己雖貧此心豁裕天道昭昭李子順孫森出斯業永得相承亦善乎司馬溫公曰積金與子孫子孫未必能守不若積陰德於冥冥之中為長久計大哉斯言也魏魏莫及近觀貪利之徒驚嚇病家集利致富身沒之後天道禍淫所得隨所失子孫喪亡世業即斬不亦報乎昔張彥明為醫視人之疾舉切吾身推誠極救未嘗以財為較一日城中大火週圍殆盡煙焰中獨存其居以此見天道有陰扶顯助之靈又有陸汝脩醫病至夜深而回路遇鬼卒百入其中有長文者一神黃袍披身汝脩見之五首投地汗如雨下驚懼不勝神曰毋恐吾乃瘟神也汝有恒心不以富貴貪賤二其念今加瘟氣滿人間用藥治之以參蘇飲為要日後汝當壽顯歸家焚香告天曰貧富皆人用藥一心神今顯應民得全生三日之內滿城皆疫乃馬頭瘟也眾名醫不能治汝脩日製藥餌及千服裹之先與貧者服之頓愈芳名遍傳求之如市家業富饒六子五壻悉果貴顯學者能以張陸二公之心為心何患道之不行子孫不顯者哉此麟日切於身心者也焉敢少忽遂并梓行諸攤疽發背總方秘傳試驗

消毒潰堅湯 治八法癰腫瘰癧惡瘡乳癰疽等症○

黃耆 二錢 人參 五分 甘草 五分 連翹 防己 酒洗 陳皮 黃連 酒炒 黃柏 酒炒各一錢 生地 酒洗 桔梗 五分 枳殼 炒 猪苓 各五分

參耆內托散○人參 黃耆 炒 當歸 酒洗 白朮 炒 橘紅 甘草 升麻 川芎 生地 酒洗 羌活 厚朴 姜汁 腫瘍加連翹 羌活 潰瘍加芍藥 甘草 酒毒加酒炒 連 氣加香附 痰加瓜蔓仁 發熱加 小柴胡 酒炒 黃芩 渴加天花粉 惡心加半夏 生薑 解毒加金銀花 甘草 節 在太陽上加羌活 陽明經上加鼠粘子 白 芷 升麻 少陽經上加柴胡

參耆歸木膏 良老氣虛宜服○人參 黃耆 白朮 土拌 當歸 各一兩 一味 胃不和加陳皮 二錢 水四碗煮稠膏 以牛膝 二錢 煎湯入竹瀝 勻之加姜汁 內疎黃連湯 嘔呃心逆發熱而煩脈沉而實腫硬麻木而皮肉不變色根像深大病源在內臟腑秘結當急疏利○黃連 芍藥 當歸 山梔 檳榔 木香 薄荷 連翹 茯苓 黃芩 桔梗 甘草 絡一 右除木香檳榔為末外餘挫每一兩水煎八分入檳香二末和服之吃三服後加大黃一錢再加二錢以利為度

甘草 絡一 右除木香檳榔為末外餘挫每一兩水煎八分入檳香二末和服之吃三服後加大黃一錢再加二錢以利為度

內托復前散 腫破於外根盤不海形症在表其浮痛在皮肉邪氣盛而必侵於內須急服內托以救其裏也 黃耆 防風

地骨皮 芍藥 黃芩酒炒 白木 人參 茯苓 甘草 羌活各等分 先用茅山蒼木一斤

剉片以水五升煎一升入前藥十二味再煎至三四鍾濾汁作四五服終日用之能除濕散鬱熱使胃氣和平若大便秘煩熱躁

少服內疎黃連湯如微利煩熱已退却服復前散半料使榮衛俱行邪氣不能內侵也

內疎黃連湯 癰疽服解毒補養氣血托裏排膿自無疼痛○ 黃耆 人參 白木 當歸 川芎

芍藥 梹節 黃連 連翹 白芷 羌活 陳皮 獨活 金銀花 防風各等

竹瀝加服 痰中有血加童便藕節汁 秘傳十六味流氣飲 未成速消已成速退疼痛漸減前十二味名托裏內補散○人參 當歸 官桂五分 川芎

防風 白芷 桔梗 黃耆 炙草 厚朴 木香 白芍 大腹皮 烏藥

枳殼 蘇葉各一錢不退熱加茯苓白木地黃 不進飲食加香附砂仁 疼痛加乳香沒藥 水不乾加知母貝母

瘡不穿 加皂角刺 大便閉加大黃枳殼 咳嗽加陳皮枳殼半夏杏仁薑 小便閉加麥門冬車前子木通滑石燈草

瘰癧加羌活夏枯草連翹 青皮柴胡黃芩 右為末每六錢酒調下不飲酒者木香湯代之米飲亦可詳其所用之藥皆發散

風毒調理氣血排膿止痛長肉生肌等藥氣不和加氣藥為主血不和加血藥為主輕重量人氣稟用之服藥後飲酒以助藥力

千金托裏散 一切腫毒○人參 官桂 甘草 川芎 白芷 芍藥各一錢 木香 沒藥三分

乳香二分 當歸五分 連翹一錢 防風 厚朴各二錢 生薑五片 臨服加酒一盃

護心散 又名乳粉托裏散 癰疽初發便服毒氣不攻惡心煩悶吃嘔喘嗽以至瀉泄急服之○

真乾菜豆粉二兩 乳香五錢研 和勻甘草湯調下此藥不時呷之使藥味長流胸膈間則毒氣不能攻心

清心內固金粉散○辰砂 人參各二錢 白茯苓三錢 菜豆粉四兩 雄黃一分 甘草二分 朴硝五錢 白芷五錢

冰片 麝香各一分 皂角一分 各另研每二錢蜜調下 太藤五兩 甘草一兩 水五碗煎至一碗再加無灰酒煎服

忍冬酒 凡初起時便當服此○ 杉煎服 散及惡毒瘡腫通身等惡症○通明礬為末 黃蠟七錢 貴人加木香

蠟礬丸 一切症服此○ 不止○青皮炒三錢 訶子五 散及惡毒瘡腫通身等惡症○通明礬為末 黃蠟七錢 貴人加木香

平人加紫蘇葉 右作六服 姜五片煎 丸如桐子大每服五十丸溫湯下日三服未破內消已破易合蠟性實大

腸瘻性解諸毒○ 錢 右作六服 姜五片煎

神功活命湯

一切惟賴利口聾人故意不待症熟輒肆

甘草節六錢 穿山甲六錢 金銀花三錢 貝母七分 防風六分

赤芍二分

歸尾一錢 君子不可不慎也必須先去

乳香一錢 陳皮二分 天花粉一錢 老酒煎如欲瀉加大黃熱加黃

芩山梔

在背俞角轉轉祥冥之中神明鑒察在胸次加瓜蒌仁在四肢金銀花為君前時須用大瓦罐以紙密封

瓶口勿令泄氣服時須隨瘡必能守不若積陰酒者服藥後飲酒幾盃此藥並無酒氣不傷臟腑氣血忌酸薄酒并鐵器服藥

後身宜側睡自有回生之妙如毒清不宜服也

發背初起

○穿山甲四片 牛皮膠四兩 右二味為末用酒二碗調和從容服盡永無大患不能飲酒者酒瓦清飲湯下

又方

凡人中熱毒眼花頭暈口乾舌苦心驚背熱四肢麻木覺有紅暈在背後即取槐子一大把揀淨鐵鍋內炒褐色好火酒一

碗煎滾去槐子熱服待汗出即愈未退再服

發背發不起

○川山甲 蛤粉 礞末 五錢酒下

神效托裏散

癰疽發背腰乳腸癰腫毒熾痛憎寒壯熱狀若傷風○黃芪 鹽水炙 金銀花 當歸 粉草炙 酒煎服

木香散

又名化堅湯瘡難消又不能作膿痛不止及小兒痘後生癰米湯下○地骨皮 五錢 木香 五錢 穿山甲二錢五分

瘡膏三分

每二錢酒下

豬蹄湯

一切發背等症用此洗之能消毒氣去惡肉凡瘡有口急用之○香白芷 黃芩 赤芍藥 露蜂房內有小

當歸

羌活

生草

地骨皮

先將雄豬前蹄一隻白水四碗煮熟去蹄取汁澄去面上油膩取清汁加前藥

前三四滾取汁將敗筆或軟絹蘸藥湯徐徐洗之須要避風并人口中氣

透膿散

不用開刀服之一日夜自透出一頭○蛾口瘡用出子

右將一杖燒作灰用酒調服切不可用二枚三枚若服一枚只一頭多服則多生頭矣

牛膠飲

惡症患險處服之使毒氣不攻於內不傳惡症○牛皮膠 淨洗四兩 好酒一碗入膠內重湯溶透攪勻加酒隨意飲盡

以醇為度不能飲酒者酒煎沸湯下

竹葉黃耆湯

諸症大渴○淡竹葉二兩 生地八兩 黃耆 當歸 川芎 人參 甘草 黃芩

麥門冬

芍藥

石膏各三兩

右作十服水煎

麥冬散

體熱煩渴不止○黃耆 黃芩 麥冬各一兩 升麻 赤茯苓 赤芍藥 玄參 當歸

甘草

知母

天花粉各一

生地三兩

右剉每約八九錢水煎熟甚加淡竹葉燈心

此為試讀

需要完整PDF請訪問: www.ertongbook.co