

校正醫宗必讀

錦章圖書局
印行
卷八

傷風

經曰虛邪賊風陽先受之入曰內傷開指雖有大風奇毒亦不能入之能入者謂之傷風也

傷風之症其初起時人則覺身熱頭痛也故曰傷風先受之

惡寒發熱為陽邪其行最速其傷人也必從俞穴而入故其因寒風邪能入已受風者常暖其後使之透熱則必清

消暖散經文所謂寒虛寒犯因寒若其人素有痰熱發於太陰陽明之經內有寒氣則風邪易於外束若為之招引

焉然所謂風寒火熱火借風威互相鼓煽也治實之法秋冬與之辛溫春夏與之辛涼解其肌表從汗而散治虛之法

固其新氣並解風邪若果與虛散或汗多亡陽或虛虛虛皆治之過也治風火之法辛涼外如甘苦內和勿與苦寒

恐正不得申邪不得解耳

神虎散 治傷風頭痛鼻塞聲重 蒼朮 薑本 白芷 細辛 羌活 川芎 甘草 水鍾半 薑三片 葱白

三葉煎八分煎服

川芎水調散 治傷風頭目昏痛鼻塞聲重 薄荷葉 川芎 羌活 甘草 白芷 防風 細辛 桂

高本藥服二錢茶調下

參蘇飲 治傷風發熱頭痛咳嗽喘滿 人參 蘇葉 乾葛 半夏 前胡 桔梗 枳殼 陳皮 茯苓

甘草 治傷風發熱頭痛咳嗽喘滿 人參 蘇葉 乾葛 半夏 前胡 桔梗 枳殼 陳皮 茯苓

消風散 治四時感冒發熱惡寒頭痛聲重 羌活 麻黃 前胡 白芷 陳皮 甘草 水鍾半 薑三片 葱白 一葉煎八分服

人參敗毒散 治頭痛發熱惡寒鼻塞聲重 人參 羌活 桔梗 枳殼 前胡 獨活 川芎 茯苓 枳殼

水鍾半 薑三片 煎服

柴胡升麻湯 柴胡 前胡 升麻 桑白皮 赤芍藥 黃芩 石膏 刺芥 水二鍾 薑三片 煎服

豆豉二十粒煎一鍾服

傷。又恐愈疑其水兩者並衛而較重脾者以脾土上交於心下交於腎故也。若腎大虛而勢因驚者又不可拘更知滋腎之中佐以砂仁沈香壯脾之中參以五味肉桂隨時活法可耳。又如無陽則陰無以生無陰則陽無以化宜不可偏也。然東垣曰甘溫能除大熱又曰血脫補氣又曰獨陰不長春夏之溫可以養育秋冬之寒不能生長虛者必補以人參之甘溫陽生陰長之理也。且虛癆證受補者可治不受補者不治故易可治之癆神良藥者所聖十友用參者七丹溪專注滋陰所述治癆方常用參者亦十之七不用參者非其新傷必其輕淺者耳。自好古肺熱傷肺節齋服參必元之證印定後人眼目甘用苦寒直至上嘔下瀉猶不悔悔良可悲已。幸李類湖汪石山詳為之辨而宿習難返貼禍未已。不知肺經自有執者肺脈按之而實與參誠不類宜若火來乘金者肺脈按之而虛金氣大傷非參不保前哲有為言曰土旺而金生勿拘拘於保肺水壯而火熄毋及清心可謂周達內經之旨。漢魏根本之治者也。

傳屍勞瘵虛癆其毒積久則生惡蟲食人臟腑其證蒸熱咳嗽胸背痛兩目不明四肢無力腰膝酸疼臥而不寐或面色皸白或兩頰時紅當懷念於夢與鬼交同氣而覺多傳傳其甚而液門大可畏也。法當補虛以復其元務盡以絕其根若疑其蟲雖病者不生亦可疑其傳症耳。凡近視症病者當宜試補虛者須服補藥宜佩安煎香及麝香則蟲鬼不敢侵也。

吐血上盛下虛血隨氣上注當順氣降則血歸經矣經行脈來微軟精神困倦是氣虛不能攝血有九精神不傷胸中滿痛或吐血塊用生地黃亦有藥當歸丹皮丹參桃仁大黃之屬從大便導之血以上出為逆下出為順前非大虛泄瀉者皆當行之以轉逆為順此金底抽薪之妙法若吐血已多因傷虛乏者不可行也吐多而急欲止之生地黃當歸丹皮亦為要藥湯入藕汁童便各一鐘血餘皮二錢墨灰五分調勻熱服熱氣傷肝者丹皮芍藥木香之屬勞心者連子精米柏仁遠志棗仁茯神之屬酒傷者乾薑茯苓花側柏荊芥穗之屬飲食傷胃者白朮陳皮甘草錢芽砂仁之屬吐血色黯脈遲而寒者理中勞力者地子吐衄者加白朮野芩之

致嗽血吐唾中有少血散漫者此腎虛火炎之血也六味地黃湯如紅縷在痰中嗽出者此肺血也二冬二貝白

咯血不嗽而血從咯出此腎血也

可憂八月初五復發肺之洪者少為細數者多者中寒疾動余曰或在戊午少陰司天兩尺不應今又當不應而反
大寸當浮大而反沉尺寸反者死肺至癸卯十二日死計期當死於十六日果能食者過期死十六十七二日皆金
未過期也十八日交寒露又值火日經曰手太陰氣絕而日為丁日死言火日也寅時乃氣血注肺之時不能注則絕
必死十八日寅時矣

汪望洋之孫年方舞象發熱咳嗽頭眩二冬二母知相令連不啻百劑病勢日增余於其脈右脈虛弱乃知脾肺
氣虛大不生土之候也遂用補中益氣加五味子以仁薑桂至三錢十劑而減兩升乃安醫初又發令其服補中丸一
年諸證永痊矣

吳門趙君發熱乾咳呼吸喘急始用蘇子降氣不感乃服八味丸喘益急迎余余視其兩頰俱赤六脈數大此補肝溫
熱也以逍遙散用牡丹皮一兩以仁五錢連連兩劑喘急頓止以地黃丸料用參冬五味煎膏及龜膠為丸
至十劑而康

給諫張君在吾邑作令時令即吐血發熱遺精盜汗形肉衰削先有醫士戒之曰勿服人參若誤服之無藥可救矣
兩月弗效召余診之余曰此脾肺氣虛之候非大劑參薑不可嘗疑曰前有醫者戒之甚嚴而兄用之甚多何相懸
也余曰此醫能任決效否曰不能也余曰請易參五斤毋製其肝期於三月可以報効陳論甚為信而從之遂用
六君子間用補中益氣及七味丸瘳之日輕一日累如所約

尚寶卿須白華林下多養且有暴怒吐血甚多係急寒余以六君子納參一兩乾薑一錢木香八分四日而血止後
因怒氣復大作余曰先與平肝疏導當大補然復得秋脈所謂早見非時之脈當其時不能再見矣果如期而瘳
大宗伯鍾子乙卯春有少妾吐血熱先用清火燉用補中俱不見效迎余治之余曰兩尺沈實少腹按之即痛詢之

果熱此熱傷血經年弗效乃為熱熱甚而吐血陰陽之甚也乃與四物湯加鬱金桃仁穿山甲大黃少許下黑血
升餘少腹痛仍在史以前藥加大黃三錢煎服又下黑血塊及如桃膠塊內者三四升腹痛乃止虛傳異氣與獨參湯
飲者三日而熱減六七服十全大補湯百餘日而瘳復如常

刑部主政張君心太過因食海鮮吐血有痰喉間如鯁日喘煩熱喜其六脈不鼓惟左寸濡而細右關大而數思慮

十全大補湯

治諸虛百損，飲食不進，久病體弱。

肉桂、桂枝、甘草、人參、白朮、

杜仲、茯苓、熟地、

每服六錢水二鍾，薑三片，棗肉二枚，煎一鍾服。

小建中湯

桂枝、芍藥、甘草、

生薑、大棗、水一斗，煎至六升，去滓，內饴糖，更上微火，凝化溫服，酒蜜加具。

禁此湯以其甜也，加黃耆、名黃耆健中湯。

八味地黃丸

治腎虛，腰膝痠軟，頭暈目眩，耳鳴，遺精，白濁，小便頻數，夜夢，

熟地黃、山茱萸、

乾山藥、牡丹皮、

白茯苓、

澤瀉、

熟附子、

肉桂、

蜜丸、

每服三錢，溫酒下。

還少丹

大補元陽，

乾山藥、

牛膝、

山茱萸、

白茯苓、

五味子、

巴戟、

仲地、

酒柏、

香附、

為末、

煉蜜丸、

如桐子大、

每服三錢、

溫酒或鹽湯下、

酸棗仁湯

治心腎不安，

怔忡、

恍惚、

夜臥不安、

精血虛、

脾胃泄瀉、

酸棗仁、

五加皮、

連志肉、

黃耆、

桂枝、

芍藥、

水二鍾，薑三片，

煎一鍾，日三服、

白水散

治脾胃虛寒，

嘔吐泄瀉、

食少胸滿、

白朮、

杜人參、

草果、

厚朴、

甘草、

水二鍾，

薑五片，

煎一鍾服、

小甘露飲

治脾胃虛弱，

身黃咽痛、

黃芩、

升麻、

牡丹、

山梔、

桔梗、

水二鍾，

溫肺湯

治肺癆虛寒，

胸膈冷痛、

人參、

甘草、

半夏、

肉桂、

橘紅、

涼肺湯

治肺癆實熱，

咳嗽喘急、

知母、

貝母、

天門、

冬蟲、

黃芩、

鐘半、

溫腎丸

治腎虛，

腰膝痠軟、

頭暈目眩、

耳鳴、

遺精、

白濁、

小便頻數、

者、

五加皮、

山藥、

為末、

用雄羊腎兩對、

酒煮爛、

入酒及地黃膏為丸、

如梧子大、

每服五錢、

寧腎湯 治腎虛寒熱腰膝耳聾 生地黃赤茯苓各五錢 支麥冬連志各一握 知母粉黃柏粉水鍾連煎八分服
人參養榮湯 治脾肺俱虛發熱惡寒倦怠泄瀉遺精腰膝無力論其脈但用此湯 白芍藥五錢 人參 陳皮 黃耆

蓮桂心 當歸 白木桂甘草炙熟地黃 五味子炒去心八錢 連志肉桂 水二鍾薑三片煎服
逍遙散 治血虛不調經水不調口乾盜汗 白茯苓 白朮 白朮 當歸 白芍藥 熟地黃 甘草 水鍾半
薑三片煎八分服

清骨散 治骨蒸熱 銀柴胡五錢 胡黃連 桑九 蔓華 連青蒿 地骨皮 知母 甘草 水二鍾煎一鍾
食連服

三才封髓丹 治心火 天門冬熟地黃 人參 黃藥 砂仁 甘草 水鍾半
錢肉桂 茯苓 酒一鍾煎二三沸去渣空心送下 為末麵糊丸桐子大每服五

生脈散 治氣短 人參 五錢 麥門冬 五味子 水一鍾煎八分服
豬脂丸 肌體羸瘦服之即肥其效如神 牡蠣 白朮 黃耆 為細末以豬肚一具煮爛研如膏和丸如

桐子大每服三錢米飲送下日三服
調中益氣湯 黃耆 人參 甘草 當歸 白朮 五味子 柴胡 白芍藥 升麻 橘皮 水鍾

米煎八分食前溫服
蘇子降氣湯 治虛陽上攻氣不升降痰涎壅盛胸膈噎塞并久年脚氣至致 水二鍾薑三片煎一鍾服

蘇子 炒半夏 乾姜 前胡 甘草 厚朴 橘紅 當歸 水二鍾薑三片煎一鍾服
人參飲子 脾胃虛弱氣虛倦怠吐血 人參 五錢 五味子 黃耆 麥門冬 白芍藥 當歸 水二鍾

甘草 水二鍾煎一鍾食遠服
大阿膠丸 治吐血衄血 阿膠 卷柏 生地黃 大剉 續斷 蘇子 五味子 柏子仁 芎藭 水二鍾

人參 麥門冬 治防風 芎藭 兩 乾山藥 熟地黃 為末煉蜜丸如彈子大煎麥門冬湯啗一丸

今更上邊南北...
令更上邊南北...
令更上邊南北...

北斗 勅吊

用黃紙一箇新筆淨水研透
研砂書此符書時念北斗前咒

甲一匙虎長芽一匙安息香 桃仁去皮 扶柳去皮 五生犀角 木香 甘遂 降真香 乾漆炒 阿膠酒浸 生薑

丸能穿山甲一匙 金蝎乾 蛇蝎研 蛇蝎研 右為末每服五錢大用酒心四十九粒東向燒香桑絲 小稍各二葉長七

寸生葉青七葉青一匙 一小握白 連根五葉洗之石栴內 同杵用 井水一碗半煎取一盞入薑便一盞內 藥末煎取

七分入麝一字月初旬 五更空 溫服即以被覆取汗思 汗中有細蟲數布拭之即焚其灰少 時必濕以淨桶盛急

甜瓜列 火焚之並收入磁瓶中雄黃煮 之以瓦油煮 乾燒定 泥固埋深山中絕人行處

道藏經曰每值庚申日其夜不睡守之至曉屍虫不能為害三 庚申三 屍長絕至 夜叩齒三十六遍左 手摩心呼 三

屍之名上屍彭蠡出中屍彭蠡出下屍彭蠡出今不得為常以庚申去手甲且 日去足甲每 年七月十六日將所去

手足甲燒灰和水服之三屍九虫皆滅

[illegible]

所行之氣志屬於肺轉輸二臟以制於生金者悉屬於脾故腹脹不外此三經也但陰陽虛實不可不辨大抵陽証
之熱熱者多實陰証之寒寒者多虛先脹於內而後脹於外者為實先脹於外而後脹於內者為虛小便黃赤大便結
結為實小便清白大便溏泄為虛消數有力為實弦浮微細為虛色紅氣粗為實色悴聲短為虛凡諸實証或六淫外
感或飲食內滯陽非急迫其至必暴卒成于數日之間若是虛証或情志多鬱或酒色過度日積月累其來有新無成
於經月之後然治實煩易理虛恒難虛人氣脹者脾虛不能運氣也虛人水腫者土虛不能制水也水難制于脾實則
既於腎腎本水藏而元氣為馬命門火衰既不能自制陰寒又不能溫養脾土則陰不從陽而精化為水故水腫之証
多屬大寒也丹溪以為濕熱宜養金以制水使脾無賊邪之患涼水以制火使肺得清之之機夫制火固可保全獨不
慮其害土乎惟虛者宜之若陽虛者宜不蓋其病數更有不明虛實者守下則脹已之一法難得少寬於一時真
愈表未幾而腫脹皆作遂致不救殊可嘆也余于此証察其實者直有陽明反掌收功的涉虛者溫補脾胃新大虛者
其有不實亦不大虛者先以清利見功繼以補中調攝又有標實而本虛者瀉之不可補之無功極為危險在病名
有鼓脹與蠱脹之殊鼓脹者中空無物腹皮細急多屬氣也蠱脹者中實有物腹形充大非虫即血也在女科有氣
分與血分之殊氣分者胸心堅大而病發于上先病水腫而後經斷血分者血結胞門而病發于下先因經斷而後水腫
在治法有理肺與理脾之殊先喘而後脹者治在肺先脹而後喘者治在脾以上諸法此其大畧也若大虛實混淆陰
陽疑似貴在臨証之頭神而明之其免于實實虛虛之害乎

死證腹脹者身熱者死 腹脹寒熱如瘧者死 腹大脹四末清脫形瘦甚為逆 腹脹使血脈大時絕者死
昏黑或腫肝傷 缺盆平心傷 膈突脾傷 足心平腎傷 背平肺傷 陰囊及莖腫腐者死 胃後腹脹
而有青筋者死 大便滑泄水腫不消者死 水腫先起于腹後散四肢者可治先起于四肢後歸於腹者死
脉法盛而紫 大堅以盛 遲而滑皆脹滿 沉而濡 浮而速 弦平緊皆水腫 二病之脈實大者可治虛微者
難治

醫案

大學 夏月好飲水一日太宗師發旋自早起候至未中其寒風所逼感寒計十餘碗歸寢便腹悶不能食越夕日

腹如抱甕氣高而喘余視之曰皮薄而光水停不化也且其脈堅實其病暴成法當利之遂以舟車丸每服三錢香薷湯送再劑而二便通決如渠復進一錢五分腹減如故用六君子十貼即愈

廣州府大 大怒之後復大醉至明日目下如臥舍居七日而肢體皆腫不能轉側二便不通煩悶欲絕余診之脈堅且

大當逐其水用疎鑿飲子一服而二便快再服而四肢寬更以五皮飲服三日隨愈

武林文學錢實之酒色無度初腹脹冬杪通體腫急購吳背平在法不治迎余治之舉家叩首求救哀迫余曰我非

有起死金丹但當盡心力而圖之耳即用金匱腎氣丸料大劑煎服兼進理中湯服五日無效余欲辭歸矣其家曰自

知必死但活一日則求一日之福即使不起安敢歸乎勉用人參一兩生附子三錢牛膝茯苓各五錢三日之間小

便解下約有四十餘碗腹有塊大舉家拜曰皆再造之恩也約服人參四兩附子一兩蓮桂各一兩餘半載而痊

都憲李東吳精勞多戰肢體脹滿以自知醫輒用胃苓湯加枳殼三月以來轉加痞悶余診其脈沉濡而軟視其色黃

白而枯此虛證也宜大溫大補始信爭之甚力僅用參二錢精覺寬舒欲加桂附執不肯從余曰證生虛寒喜行

攻伐已見既堅良言不納雖有扁倉豈能救耶越兩月果腹大如鼓

歸叔太傅徐據稟稟黃素壯病餘肥甘過厚腹脹氣阻余診之脈沉而濡按之不甚虛宜以利氣之劑少佐參苓于

多歧之說旦暮更醫余復診曰即畏寒不用攻擊之劑決不可投也後與他醫商之仍用理脾破氣之劑而安

光祿卿吳伯玉夫人患腹滿而痛喘急異常大便不通飲食不進醫者用理氣利水之劑二十日不好余診之脈大而

數右尺為甚令人按腹手不可近余曰此大腸癰也脈數為膿已成用黃耆皂刺白芷之類加參根一兩煎一碗頓服

之未中痛甚至夜半而潰血大下下常不支即與獨參湯稍加更與十全大補一月而愈

五皮飲 治脾肺不能運行氣滿皮膚水停

大腹皮 治赤茯苓皮 生薑皮 陳皮 桑白皮 水鍾半煎八分

胃苓湯 治水腫

水鍾半煎八分

水鍾半煎八分

香蘇散 治水氣虛腫小便赤濁

橘紅 治防己 木通 紫蘇葉

水鍾半薑三片煎八分服

實脾散 治陰水發腫用以實脾 厚朴 白朮

木瓜 大腹皮 附子 木香 大茴果 白茯苓 乾

薑 水鍾半薑五片煎七分服

復元丹 治脾胃俱虛通身水腫小便不通

附子 木香 茵香 川椒 厚朴 獨活 白朮 橘紅

吳茱萸 桂心 澤瀉 肉果 檳榔

為末細丸桐子大每服三錢紫蘇湯送下

金匱腎氣丸 治腎虛腰痛小便頻數

白茯苓 附子 川牛膝 肉桂 澤瀉 車前子 山茱萸

山藥 牡丹皮 熟地黃

蜜丸桐子大每服四五錢空心白湯下

補中益氣湯 治中氣不足

赤茯苓 麥門冬 澤瀉 白朮 桑白皮 紫蘇 檳榔 木

導水茯苓湯 治通身水腫

瓜 大腹皮 陳皮 砂仁 木香 右為粗末每服五錢水二鍾燈草二十五根煎八分服連進三服

小水漸利

沉香琥珀丸 治小便赤澀

琥珀 杏仁 赤茯苓 澤瀉 草薢 郁李仁 沉香 陳皮 防

己 疏鑿飲子 治通身水腫

右為末蜜丸梧子大以麝香為衣每服二錢五分加至五錢空心人參湯送下

扶苓皮 檳榔 水鍾半薑五片煎九分服

商陸 赤小豆 羌活 大腹皮 椒目 木通 秦艽

散藥 治腹滿如石或陰囊腫大先用甘草嚼使用此

大戟 芫花 甘遂 海藻 為細末臘醋調

麝和藥攤綿紙上覆貼臍處以軟綿裹住

小胃丹 治花柳一服見效

以白朮骨丸如蘿蔔子大臨臥送下

十葉湯 見後集

大戟 芫花 甘遂 海藻 為細末臘醋調

大黃 二錢 粉 此 墨 牛 四 兩 青 皮 木 香

為末水丸如豆大空心服五九日三服痛者多服反煩滿宜初服二丸每服加二丸快利為度

大黃性寒 牽牛性寒 郁李仁性平 木香性溫 芒硝性寒 甘遂性寒 評曰增濕為土火熱能生濕土故夏秋

治一切因熱積聚
黃芩 黃連 川芎 薄荷 大黃 滑石 黑豆 為末水

枳殼酸 苦 寒 入胃 大腸 經 官桂辛 甘 大熱 入腎 脾 經 陳皮 檳榔 桔梗 白朮甘 平 入脾 經 五靈脂甘 溫 入肝 經 木香辛 溫 入脾 經

水二鍾生薑煎服

小
便
不
通
如
此
為
水

杏仁
甘遂
續隨子
研去油
附子
郁李仁
黑牽牛
五靈脂

石骨

用林屋下紮以今所用不獨異而不服有瘡痂身之患

天也所為至重上而為

東坡先生集卷之四

[illegible]

砂仁 二 枳實 炒 半 夏 五 泡 桑 葉 一 重 炒 母 芩 二 手 寫 陳 皮 三 為 末 蒸 餅 丸 如 桐 子

元皇下。

治中滿氣脹者忌用。