

重廣補注黃帝內經素問卷第十一

啓享字次注林憲孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

舉痛論

腹中論

刺要痛篇

舉痛論篇第三十九

新校正云按全元起本在第三卷名五藏舉痛所以名舉痛之義未詳按本篇乃黃帝問五藏

卒痛之疾疑舉

乃卒字之誤也

黃帝問曰余聞善言天者必有驗於人善言古者必有合於今善言人者必有厭於已如此則道不惑而要數極所謂明也

形氣五藏參應可驗而指示善惡故曰必有驗於人善言古者謂言上古聖人養生損益之迹與今養生損益之理可合而與論成敗故曰必有合於今也善言人者謂言形骸骨節更相枝拄筋脉束絡皮肉包

重廣補注黃帝內經素問卷第十一

啓亨次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

舉痛論

腹中論

刺要膏痛篇

舉痛論篇第三十九

新校正云按全元起本在第三卷名五藏舉痛所以名舉痛之義未詳按本篇乃黃帝問五藏

卒痛之疾疑舉

乃卒字之誤也

黃帝問曰余聞善言天者必有驗於人善言古者必有合於今善言人者必有厭於已如此則道不惑而要數極所謂明也

善言天者言天四時之氣溫涼寒暑生長收藏在人形氣五藏參應可驗而指示善惡故曰必有驗於人善言古者謂言上古聖人養生損益之迹與今養生損益之理可合而與論成敗故曰必有合於今也善言人者謂言形骸骨節更相枝拄筋脉束絡皮肉包

裹而五藏六府次居其中假七神五藏而運用之氣絕神去則之於死是以知彼浮形不能堅久靜慮於已亦與彼同故曰必有厭於已也夫如此者是知道要數之極悉無疑惑深明至理而乃能然矣

今余問於夫子令言而可知視而可

見。擗而可得。令驗於已而發蒙解惑可得而聞乎。

童蒙之耳解於疑惑者之心令一一條請示問端也

此伯再拜稽首對曰何道

之間也。

問

帝曰願聞人之五藏卒痛何氣使然。歧伯

對曰經脉流行不止環周不休寒氣入經而稽遲泣而不行客於脉外則血少客於脉中則氣不通故卒然而痛帝曰其痛或卒然而止者或痛甚不休者或痛甚不可按者或按之而痛止者或按之無益者或喘動應手者或心與背相引而痛者或脇肋與少腹

言如
發開

相引而痛者。或腹痛引陰股者。或痛宿昔而成積者。或卒然痛死不知人。有少間復生者。或痛而嘔者。或腹痛而後泄者。或痛而閉不通者。凡此諸痛各不同。

形別之柰何。

欲明異候之所起

歧伯曰。寒氣客於脉外。則脉寒。脉

寒則縮踡。縮踡則脉絀急。則外引小絡。故卒然而痛得。見則痛立止。

脉左右環故得寒則縮踡而絀急縮踡絀急則衛氣不得通流故外引於小絡脈也衛氣不入寒內薄之脉急

不縱故痛生也得熱則衛氣復行寒氣退辟故痛止見熱也止已也

因重申於寒。則痛久矣。

重寒難釋故痛久不消

寒氣客於經脉之中。與見氣相薄。則脉滿。滿則痛而不可按也。

按之痛甚者其義具下文則邪氣攻內故不可按也

脉既滿大血氣復亂按之寒氣客於

腸胃之間。膜原之下。血不得散。小絡急引。故痛。按之則血氣散。故按之痛止。膜謂鬲間之膜。原謂鬲肓之原。血不得散謂鬲膜之中。小絡脈內。血也。絡滿則急。故牽引而痛。生也。手按之則寒氣散。小絡緩故痛止。

寒氣客於夾脊之脉。則深按之不能及。故按之無益也。夾脊之脉者。當中督脈也。次兩傍足太陽脉也。督脈者。循脊裏。太陽者。貫督筋故深。按之不能及也。若按當中。則督節曲按兩傍。則督筋感合曲與感合皆衛氣。不得行過。寒氣益聚。而內畜。故按之無益。

寒氣客於衝脉。衝脉起於關元。隨腹直上。寒氣客則脉不通。脉不通則氣因之。故喘動應手矣。衝脉奇經脈也。關元穴名在齊下三寸。言起自此穴。即隨腹而上。非生出於此也。其本生出。乃起於腎下。也。置上者。謂上行會於咽喉也。氣因之。謂衝脉不通。足少陰氣因之上。滿衝脉。與少陰並行。故喘動應於手也。

寒氣客於背俞之脉。則脉泣。脉泣則血虛。血虛則痛。其俞注於心。故相引而痛。按之則熱氣至。熱氣至則痛止矣。背俞謂心

俞脉亦足太陽脉也夫俞者皆內通於藏故曰其俞注於心相引而痛也按之則溫氣入溫氣入則心氣外發故痛止

寒氣客於厥

陰之脉厥陰之脉者絡陰器繫於肝寒氣客於脉中則血泣脉急故脇肋與少腹相引痛矣

貫肝鬲布脅故曰絡陰器繫於肝脉急引脇與少腹痛也

厥氣客於陰股寒氣上及少腹

血泣在下相引故腹痛引陰股

亦厥陰肝脉之氣也以其脉循陰股入髦中環陰器上抵少腹故曰

厥氣客於陰股寒氣上及少腹也

寒氣客於小腸膜原之間絡血之中

泣不得注於大經血氣稽留不得行故宿昔而成積矣

言血爲寒氣之所疑結而乃成積

寒氣客於五臟厥逆上泄陰氣竭陽氣未

入故卒然痛死不知人氣復反則生矣

言藏氣被寒擁胃而不行氣復得通則已

也新校正云詳注中擁胃疑作擁冒寒氣客於腸胃厥逆上出故痛而嘔也

腸胃客寒留止則陽氣不得下流而反上行
寒不去則痛生陽上行則嘔逆故痛而嘔也

寒氣客於小腸。小腸不

得成聚。故後泄腹痛矣。

小腸爲受盛之府中滿則寒邪不居故不得結聚而傳下入於迴腸迴腸廣腸也爲傳導

之府物不得停留故後泄而痛

熱氣留於小腸。腸中痛。瘅熱焦渴則堅乾

不得出。故痛而閉不通矣。

故便堅也。帝曰所謂言而可知

者也。視而可見柰何。

謂候色也

歧伯曰五藏六府固盡有部

謂面上之分部

視其五色。黃赤爲熱。

中熱則色黃赤

白爲寒。

陽氣少血不上榮於色故白

青

黑爲痛。

血凝泣則變惡故色青黑則痛

此所謂視而可見者也。帝曰。捫而可

得奈何。

捫摸也以手循摸也

歧伯曰。視其主病之脉。堅而血及陷下

者。皆可捫而得也。帝曰。善。余知百病生於氣也。

夫氣之爲用虛

實逆順緩急皆能爲病故發此問端

怒則氣上。喜則氣緩。悲則氣消。恐則氣下。

寒則氣收。哭則氣泄。驚則氣亂。勞則氣耗思。

新校正云按甲乙經及太素驚作憂

勞則氣耗思。

則氣結。九氣不同。何病之生。歧伯曰。怒則氣逆。甚則

嘔血及飧泄。

新校正云按甲乙經及太素飧泄作食而氣逆

故氣上矣。

怒則陽氣逆上而肝氣乘脾故甚則嘔血及飧泄也何以明其然怒則面赤甚則色蒼靈樞經曰盛怒而不止則傷志明怒則氣逆上而不下也

喜則氣和。志達。榮衛通利。故氣緩矣。

氣脉和調故志達暢榮衛通利故氣徐緩

悲則心系急。肺布葉

舉而上焦不通。榮衛不散。熱氣在中。故氣消矣。

布葉謂布蓋之

大葉 新校正云按甲乙經及太素而上焦不通作兩焦不通又王注肺布葉舉謂布蓋之大葉疑非全元起云悲則損於心心系急則動於肺肺氣繫諸經逆故肺布而葉舉安得謂肺布爲肺布蓋之大葉

恐則精却。却則上焦閉。閉則氣還還。

則下焦脹。故氣不行矣。

恐則陽精却上而不下流故却則上焦閉也上焦既閉氣不行流下焦陰氣亦還迴不散

而聚爲脹也然上焦固禁下焦氣還各守一處故氣不行也 新校正云詳氣不行當作氣下行也

寒則腠理閉。氣不行。

故氣收矣。

腠謂津液滲泄之所理謂文理逢會之中閉謂密閉氣謂衛氣行謂流行收謂收斂也身寒則衛氣沈故皮膚文理及滲泄之處皆閉密而氣不流行衛氣收斂於中而不發散

也 新校正云按甲乙經氣不行作營衛不行

見則腠理開榮衛通汗

大泄故氣泄

人在陽則舒在陰則慘故熱則膚腠開發榮衛大通津液外滲而汗大泄也

驚則心無所倚

神無所歸慮無所定故氣亂矣。

氣奔越故不調理

新校正云按太素驚作憂

勞則

喘息汗出外內皆越故氣耗矣。

疲力役則氣奔速故喘息氣奔速則陽外發故汗出然喘且汗

出內外皆踰越於常紀故氣耗損也思則心有所存神有所歸正氣留而不行故氣結矣。

繫心不散故氣亦停留

新校正

腹中論篇第四十

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰有病心腹滿旦食則不能暮食此爲何病

岐伯對曰名爲鼓脹

心腹脹滿不能再食形如鼓脹故名鼓脹也 新校正云按太素鼓作穀

帝曰治

之柰何。岐伯曰。治之以雞矢醴。一劑知。二劑已。

按古李草雞矢

並不治鼓脹。惟大利小便微寒。今方制法當取用處湯漬服之。

帝曰。其時有復發者何也。

復謂再發言如

舊也。督。此飲食不節。故時有病也。雖然。其病且已。時

故當病氣聚於腹也。

飲食不節則傷胃。胃脉者循腹裏而下行。故飲食不節時有病者復病氣聚於腹中也。

帝

曰。有病腎脇支滿者。妨於食。病至則先聞腥臊臭。出

清液。先唾血。四支清。目眩。時時前後血。病名爲何。何

以得之。

清液清水也。亦謂之清涕。清涕者謂從竊漏中漫溢而下水。出清冷也。眩謂目視眩轉也。前後血謂前陰後陰出血也。

岐伯

曰。病名血枯。此得之年少時有所大脫血。若醉入房。

中氣竭。肝傷。故月事衰少不來也。

出血多者謂之脫血。漏下鼻衄。衄嘔吐出血皆同焉。夫醉則少大脫血。故肝傷也。然於丈夫則精液衰乏。女子則月事衰少而不來。

帝曰。

血脉盛。血脉盛則內熱。因而入房。髓液皆下。故腎中氣竭也。肝藏血。以少大脫血。故肝傷也。然於丈夫則精液衰乏。女子則月事衰少而不來。

治之柰何復以何術。歧伯曰。以四烏鰷骨一蘆茹二

物并合之丸。以雀卵大如小豆。以五丸爲後飯。飲以

鮑魚汁利腸中。

新校正云按別本一作傷中

及傷肝也。

飯後藥先謂之後飯按古本草經云烏鰷魚骨

蘆茹等並不治血枯然經法用之是攻其所生所起爾夫醉勞力以入房則腎中精氣耗竭月事衰少不至則中有惡血淹留精氣耗竭則陰萎不起而無精

惡血淹留則血渾著中而不散故先茲四藥用入方焉古本草經曰烏鰷魚骨味鹹令平無毒主治女子血閉蘆茹味辛寒平有小毒主散惡血雀卵味甘溫平無毒主治男子陰萎不起強之令熱多精有子鮑魚味辛臭溫平無毒主治瘀血血癥在四肢不散者尋文會意方義如此而處治之也。

新校正云按甲乙經及太素蘆茹作蕶茹詳王注性味乃蕶茹當改蘆作

蕶又按本草烏鰷魚骨冷作微溫雀卵甘作酸與王注異

帝曰病有少腹

盛。上下左右皆有根此爲何病可治不。歧伯曰病名

伏梁。

伏梁心之積也

新校正云詳此伏梁與心積之伏

帝曰伏梁

何因而得之。歧伯曰裏大膿血居腸胃之外不可治。

梁大異病有名同而實異者非一如此之類是也

治之每切按之致死。帝曰何以然。歧伯曰此下則因

陰必下膿血上則迫胃脘生鬲。俠胃脘內癰。

正當衝脉帶脈之部

分也。帶脈者起於季脇，迴身一周，橫絡於齊下。衝脈者與足少陰之絡起於腎下，出於氣街，循陰股其上行者，出齊下同身寸之三寸，關元之分，俠齊直上，循腹各行，會於咽喉，故病當其分則少腹盛，上下左右皆有根也。以其上下堅盛，如有潛梁，故曰病名伏梁，不可治也。以裏大膿血居腸胃之外，按之痛悶不堪，故每切按之致死也。以衝脈下行者絡陰上行者，循腹故也。上則迫近於胃脘下，則因薄於陰器也。若因薄於陰則便下膿血，若迫近於胃則病氣上出於鬲，復俠胃，脘內長其癰也。何以然哉？以本有大膿血在腸胃之外，故也。生當爲出傳文誤也。

新校正云：按太素俠胃作使胃

此久病也。

難治。居齊上爲逆。居齊下爲從。勿動亟奪。

若裏大膿血居齊上，則漸傷心

藏，故爲逆。居齊下，則去心稍遠，猶得漸攻，故爲從。順也。亟數也。奪去也。言不可移動，但數數去之，則可矣。

論在刺法中。

今經亡

帝曰人有身體髀股筋皆腫環齊而痛是爲何病。

歧伯曰病名伏梁。

此二十六字錯簡在竒病論中。若不有此二十六字，則下文無據也。

新校正云：詳此並無注解，盡在下卷竒

此風根也

此四字此篇本有
奇病論中亦有之

其氣溢於大腸而著於肓

肓之原在齊下故環齊而痛也不可動之動之爲水

溺濇之病

亦衝脉也齊下謂膀胱在齊下同身寸
之二寸半靈樞經曰肓之原名曰膀胱

帝曰夫子數言

熱中消中不可服高粱芳草石藥石藥發瘍芳草發

狂

多飲數溲謂之熱中多食數溲謂之
消中多喜曰瘍多怒曰狂芳美味也

夫熱中消中者皆富貴人

也今禁高粱是不合其心禁芳草石藥是病不愈願

聞其說

熱中消中者脾氣之上溢甘肥之所以致故禁食高粱芳美之草也通評

虛實論曰凡治消癥甘肥貴人則高粱之疾也又奇病論曰夫五味入於口藏於胃脾爲之行其精氣津液在脾故令人口甘此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥也肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉爲消渴此之謂也夫富貴人者驕恣縱欲輕人而無能禁之禁之則逆其志順之則加其病帝思難詰故發問之高粱米也石藥英乳也芳草濃美也然此五者富貴人常服之難禁也

歧伯曰夫芳草之氣美石藥之氣悍二者其氣急

疾堅勁故非緩心和人不可以服此二者

脾氣溢而生病氣美則重盛於

脾消熱之氣躁疾氣悍則又滋其熱若人性和心緩氣候舒勻不與物爭釋然寬泰則神不躁迫無懼內傷故非緩心和人不可以服此二者悍利也堅定也固也勁剛也言其芳草石藥之氣堅定

帝曰不可以服此二者何以然

歧伯曰夫熱氣剽悍藥氣亦然二者相遇恐內傷脾標疾也脾者土也而惡木服此藥者至甲乙日更論

熱氣剽盛則木氣內餘故心非和緩則躁怒數起躁怒數起則熱氣因木以傷脾甲乙爲木故至甲乙日更論脾病之增減也

帝曰善有

病膺腫新校正云按甲乙經作癰腫頸痛胷滿腹脹此爲何病何以得之

膺胷傍也頸項前也胷膺閒也歧伯曰名厥逆氣逆所生故名厥逆帝曰治之柰何歧伯

曰灸之則瘡石之則狂須其氣并乃可治也石謂以石鍼開破之

帝曰何以然歧伯曰陽氣重上有餘於上灸之則陽

氣入陰入則瘡。石之則陽氣虛。虛則狂。

灸之則火氣助陽。陽盛故入陰石之則陽

氣出陽氣出則治若不爾而灸石之則偏致內不足故狂須其氣并而治之可使全也。

并謂并合也。待自并合則兩氣俱全故可

勝負故不得全而瘡狂也。

帝曰善。何以知懷子之且生也。歧

伯曰身有病而無邪脉也。

病謂經閉也。脈法曰尺中之脉來而斷絕者經閉也。今病經閉脉反如常者婦人

姪娠之證故云身有病而無邪脉

帝曰病熱而有所痛者何也。

歧伯曰病熱者陽脉也。以三陽之動也。人迎一盛少

陽二盛太陽三盛陽明。入陰也。夫陽入於陰故病在

頭與腹乃脹脹而頭痛也。帝曰善。

新校正云按六節藏象論云人迎一盛病在少陽二盛病在太

陽三盛病在陽明與此論同又按甲乙經三盛陽明無入陰也三字

刺腎痛篇第四十一

新校正云按全元起本在第六卷

足太陽脉令人腰痛引項脊尻背如重狀

足太陽脉別下
項循肩髀內挾

脊抵脊中別下貫腎故令人腰痛引項脊尻背如重狀也 新校正
云按甲乙經貫腎作貫肺刺瘡注亦作貫肺三部九候注作貫腎

刺其郤中

太陽正經出血春無見血

郄中委中也在膝後屈處膕中央約文
中動脈足太陽脉之所入也刺可入同

身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯太陽
合腎腎主於冬水衰於春故春無見血也

少陽令人腰痛如以鍼

刺其皮中循循然不可以俛仰不可以顧

足少陽脉達髦
際橫入髀厭中

故令腰痛如以鍼刺其皮中循循然不可俛仰少陽之脉起於目銳眥上抵頭
角下耳後循頸行手陽明之前至肩上交出手少陽之後其支別者目銳眥下

入大迎合手少陽於頸下加頰車下頸合缺盆故不可以顧
新校正云按甲乙經行手陽明之前作行手少陽之前也

刺少陽成骨

之端出血成骨在膝外廉之骨獨起者夏無見血

成骨
謂膝

外近下骻骨上端兩起骨相並間陷容指者也骻骨所成柱膝髀
骨故謂之成骨也少陽合肝肝主於春木衰於夏故無見血也

陽明令人

腎痛不可以顧顧如有見者善悲

足陽明脉起於臍交頰中下循
臍外入上齒中還出俠口環脣

下交承漿却循頤後下廉出大迎其支別者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆又其支別者起胃下口循腹裏至氣街中而合以下髀故令人腰痛不可顧顧

如有見者陽虛故悲也

刺陽明於骲前三痏。上下和之。出血秋無見

血

按內經中誥流注圖經陽明脈穴俞之所主此腰痛者悉刺骲前三痏則正三里穴也三甲穴在膝下同身寸之三寸骲骨外廉兩筋肉分間刺可入同

身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯陽明合脾脾王長

夏主衰於秋故秋無見血

新校正云按甲乙經骲作骲

足少陰令人腰

痛。痛引脊內廉。

足少陰脉上股內後廉貫脊屬腎故令人腰痛引脊內廉也

新校正云按全元起本脊內廉作脊內痛太

素亦同此前少足太陰腰痛證并刺足太陰法應古文脫簡也

刺少陰於內踝上二痏。春無見血

後上同身寸之二寸動脈陷者中刺可入

痛者當刺內踝上則正復溜穴也復溜在內踝

同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯

厥陰之脉令人腰痛腰中

如張弓弩弦

足厥陰脉自陰股環陰器抵少腹其支別者與太陰少陽結於腰髀下狹脊第三第四骨空中其穴即中髎下髎故腰痛

如張弦者言強急之甚則中如張弓弩之弦也

刺厥陰之脉在腨踵魚腹之外循