

婦人產後病脈證并治第二十一

百日之內往往有此切勿大驚

問曰新產婦人有三病。一者病瘧。二者病鬱冒。三者

市醫師巫出生意

大便難。何謂也。師曰新產血虛多汗出。喜容中風故

令病瘧。

如口噤目窳舌吐出而手足牽引亡血復汗。

寒多故令鬱冒。

晝夜不醒如死手足溫鼻息如常一二

附子懷牛膝時時灌之一晝夜必愈。亡津液胃燥故

若服市醫香開藥枉殺母子二命矣。

大便難。

大承氣湯勻三盞得下止後盞下過甚以清米飲湯解之立愈。

產婦鬱冒其

脈微弱。

食少不可下也。

不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛

而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤

陽上出故頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽

氣獨盛。

虛火乘心。

故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食。

是闕文。

小柴胡湯主之。

服湯已。

病解能食七八日更發熱者此

能食乃可下。

當有若字者字必

為胃實大承氣湯主之。○產婦腹中疝痛。當歸生薑

羊肉湯主之。血氣虛痛并治腹中寒疝虛勞不足。○產後

腹痛煩滿。不得臥。枳實芍藥散主之。瘀血實痛枳實芍藥

散方。枳實燒令黑。勿太過。芍藥等分。右二味杵為散。

服方寸匕。日三服。并主癰膿。腸癰下死血以麥粥下之。俗名

兒枕塊痛。服下若失師曰。產婦腹痛。法當以枳實芍藥散。假令



不愈者。此為腹中有乾血。著臍下。宜下瘀血湯主之。

亦主經水不利。下瘀血湯方。大黃三兩。桃仁。蟅蟲。熬。

去足。各二十枚。右三味末之。煉蜜和為四丸。以酒一

升煎一丸。取八合。頓服之。新血下如豚肝。

後人五靈脂蒲黃攻

血名失笑散亦可用

產後七八日。無太陽證。少腹堅痛。此惡露

不盡。熱在裏。

太陽府可用下瘀血湯。枳實散失笑散等攻血。

結在膀胱也。

此血



結胞門病

不大便發熱切脉微實日晡時煩躁者不食食

則譫語至夜即愈

結尿

宜大承氣湯主之

宜攻尿勿攻血此分明產

婦腹痛有血有尿須詳審

產後風續之數十日不解頭微痛惡寒

時時有熱心下悶乾嘔汗出雖久陽旦證續在者可

與陽旦

陽旦證與方均缺無可考後人強以桂枝湯內加黃芩名陽旦湯大謬千金方以當歸及

紅砂糖加入桂枝湯內治產後諸虛感冒近是文宗之

產後中風病瘕者發熱

三字補

面正赤喘而頭痛竹葉湯主之。竹葉湯方。竹葉一把。
葛根生薑各三兩。防風桔梗桂枝人參甘草各一兩。
附子一枚炮。大棗十五枚。右十味以水一斗煮取二
升半。分溫三服。溫覆使汗出。頸項強用大附子一枚。
破之如豆大。煎藥揚去沫。嘔者加大半夏半升洗。○
產後下利及虛極。白頭翁加甘草阿膠湯主之。白頭

翁加甘草阿膠湯方。白頭翁甘草阿膠各二兩。秦皮

黃連藥皮各三兩。右六味以水七升煮取二升半內

膠令消盡分溫三服。白頭治熱利產後血虛生熱者

文按胎前產後聖人有證有方獨臨產不論非畧也
產乃天地生物自然之理不能為病試觀禽獸蟲魚
有難產者乎自世人作孽冤緣相報富紳家故意撒
矯早喚穩婆動手探喜信旁人七手八脚大驚小怪
致產婦驚惶血氣繚亂於是有瀝胞生討益生踏蓮
生螺蛳生交骨不開胞衣不下而出重資令穩婆刀

產後

割洋人用機器結果母子性命果報亦慘矣文杜製
二說叩求後聖播傳一婦人要心寬量大勿妒嫉陰
險虐使兒媳婢妾忤逆尊親臨產時心頭默會金剛
經大悲咒一句亦可忍住酸楚勿早令人知道必自
覺小兒轉身乃喚人預備包洗切忌穩婆近身動手
切切叩囑一臨滿足月備川芎五錢當歸二兩懷牛
膝一兩發作時濃煎代茶切忌吃人參餘達生保嬰
頗有可採處不多贅總之穩婆不動手探喜信產婦
自己放大胆稱心適意不必
旁人多出主意決無難產也

婦人雜病脈證并治第二十二

婦人之病。因虛。

血數脫

積冷。

陰氣盛

結氣。

受人制

為諸經水。

斷絕。異於男子者只此耳

至有歷年血寒積結胞門寒傷經絡。

凝堅在上嘔吐涎唾久成肺癰。

病見於上部足見肺癰要吃附子苡薏仁

散凝堅矣

形體損分在中盤結繞臍寒疝或兩脇疼痛。

臟相連或結熱中痛在關元。

病見於中

部脈數無瘡肌若



魚鱗

病見於皮膚

時著男子。非止女身。

以上三部病。男子亦有。不可泥煞婦。

病也。在下來多。

一月再見。經候不勻。令陰掣痛。

陰戶內痒。風濕生蟲。陰戶。

內痛。風寒。

少腹惡寒。

以蛇床子做坐藥。煖陰戶。內服附子湯。溫其藏。

或引腰

龍藏也。

脊下根氣街氣衝急痛。膝脛疼煩。

病見於下。

奄忽眩冒。

狀若厥癰。或有憂慘。悲傷多嗔。久則羸瘦。血虛多寒。

上下對調。文訂正。

此皆帶下。非有鬼神。

病見於心部。

三十六病。千變萬端。審

脉陰陽虛實緊弦其雖同病。

雖皆經水為病。

脉各異源。

既變

其雖起得安止上下對調文訂正。

自不行其鍼藥治危得安子當辯記勿謂不然。

婦病

養血溫經和肝脾為君雖有他證隨證加減一二味治之。

婦人咽中如有炙轆半吐不出吞不下總以

夏厚朴湯主之。

今名梅核氣病是也。

半夏厚朴湯方半夏一升。

厚朴三兩茯苓四兩生薑五兩乾蘇葉二兩右五味。

以水七升煮取四升分溫四服日三夜一服○婦人

藏躁。喜悲傷。欲哭。象如神靈所作。數欠伸。甘麥大棗

湯主之。甘草小麥大棗湯方。甘草三兩。小麥一升。大

棗十枚。右三味。以水六升。煮取三升。溫分三服。亦補

脾氣。

甘麥湯治失志若癲。補心脾要藥。醫不用惜哉。

婦人吐涎沫。醫反下之。

心下即痞。當先治其吐涎沫。小青龍湯主之。涎沫止。

乃治痞。瀉心湯主之。○問曰。婦人年五十。

經水當絕。所病

下血。

經水仍下。

數十日不止。暮即發熱。少腹裏急。腹滿。

掌煩熱。唇口乾燥。何也。師曰。此病屬帶下。何以故。曾

經半產。瘀血在少腹不去。何以知之。其證唇口乾燥。

故知之。當以溫經湯主之。溫經湯方。吳茱萸三兩。當

歸芍藥各二兩。人參桂枝牡丹皮阿膠生薑甘草各二

兩。半夏半升。麥門冬去心一升。右十二味。以水一斗。

煮取三升。分溫三服。亦主婦人少腹寒。久不受胎。兼

取崩中去血。或月水過多。及至期不來。○帶下經水

不利。少腹滿痛。經一月不見者。土瓜根散主之。土瓜

根散方。土瓜根。芍藥。桂枝。蟬蟲各三分。右四味杵為

散。酒服。方寸匕。日三服。服後手摩少腹婦人陷經漏下黑不

解。膠薑湯主之。

方缺大約膠艾湯中重加炮薑去瘀婦人少腹滿。如敦

疑不散者

顏色黑血

狀小便微難而不渴。生後者。此為水與血俱結在血

室也。大黃甘遂湯主之。大黃甘遂湯方。大黃四兩。甘

遂二兩。阿膠二兩。此方慎用。甘遂至二錢之多。防有譌也。慎用之。右三味。以

水三升。煮取一升。頓服之。其血當下。○婦人經水閉。

不利。藏堅癖。子藏似塊。中有乾血。下白物不止。礬石丸

主之。礬石丸方。礬石燒三分。杏仁二分。右二味末之。

煉蜜和丸。如棗核大。內藏中。

陰戶劇者再內之。

再內

妙方也。婦人不肯用。下白無善治法。

婦人六十二種風。及腹中血氣刺

痛。

血痛。每如針刺。纖纖。

紅藍花酒主之。紅藍花酒方。紅藍花一

兩。右一味。以酒一大升。煎減半。頓服。一半未去。再服。

○婦人腹中諸疾痛。當歸芍藥散主之。

言當以此方為君。隨證加

減婦人腹中痛。小建中湯主之。

二條真女金丹。問曰。應上文因虛也。

婦人病飲食如故。煩熱不得臥。而反倚息者何也。師

曰。此名轉胞。不得溺也。

有尿胞隨出。小便點滴不通。有尿胞倚側。到處滴尿頭者。

以胞系了戾。故致此病。但利小便則愈。宜腎氣丸主

之。腎氣丸方。乾地黄八兩。薯蕷山茱萸各四兩。澤瀉

茯苓牡丹皮各三兩。桂枝

今藥店用肉桂。大失製方之義。

附子炮。各

一兩。右八味末之。煉蜜和丸。梧子大。酒下十五丸。加