

浙江大學圖書館藏

傷寒續論卷下

清

長洲石頑張

璐路玉

銓

男

登誕先

倬飛疇

參詩

從學郭求友三較正

日本

大泉長菴前田安宅子仁

再訂

男

典子守

藏結結胸痞篇

問曰病有結胸。有藏結。其狀何如。答曰。按之痛。寸脉浮。關脉沉。名曰結胸也。何謂藏結。答曰。如結胸狀。飲食如故。時時下利。寸脉浮。關脉小細沉緊。名曰藏結。舌上白胎滑者難治。結胸者。陽邪結於陽也。藏結者。陰邪結於陰也。然胸位高。

藏位卑。其脉之寸浮關沉。兩俱無異。但藏結之關脉。更加小細而緊者。以關脉居上下二焦之界。外邪由此下結。積氣由此上干。實往來之要衝。所以病在下而脉反困於中也。若見舌白胎滑。則外邪固結於裏。其勢最重。以表裏兩解之法俱不可用。故爲難治。其不出方者。正欲人深究其旨而施治。非不治也。治之務在分解表裏錯雜之邪。使陰氣漸下而內消。客邪漸上而外散。庶可圖功於萬一也。藏結無陽證。不往來寒熱。其人反靜。舌上胎滑者。不可攻也。藏結之所以不可攻者。從來置之不講。以爲仲景未嘗明言。後人無從知之。不知仲景言之甚明。人第不參討耳。夫所謂不可攻者。乃垂戒之辭。正欲人詳審其攻之之次第也。試思藏已結矣。匪攻而結。何由開耶。所謂其外不解者。

尚未可攻。又謂下利嘔逆不可攻。又謂表解乃可攻痞。言之已悉。於此特出一訣。謂藏結無陽證。不往來寒熱。其人反靜。則證不在六經之表裏。而在上焦下焦之兩途。欲知其候。但觀舌上有無胎滑。有之則外感之陽熱。挾痞氣而反在下。素痞之陰寒。挾熱勢而反在上。此與裏證已具表證未除者。相去不遠。但其陰陽悖逆。格拒不入。證轉凶危耳。豈結胸膈內拒痛。而藏結腹內不拒痛耶。此而攻之。是速其痛引陰筋而死。不攻則病不除。所以以攻爲戒。是則調其陰陽。使之相入。而滑胎既退。然後攻之。則邪熱外散。寒氣內消。此持危扶顛之束手眼也。

病脇下素有痞。連在臍傍。痛引少腹。入陰筋者。此名藏結死。按病人素有動氣。在當臍上下左右。則不可發汗。素有痞

氣在脇下連臍傍則不可攻下。醫不細詢病家不明告因而貽禍者多矣。

已上藏結例

病發於陽而反下之熱入因作結胸。病發於陰而反下之因作痞。所以成結胸者以下之太早故也。

病發於陽者太陽表證誤下邪結於胸也。病發於陰者皆是內挾痰飲外感風寒中氣先傷所以汗下不解而心下痞也。凡結胸正在胸中此正太陽全盛之邪因誤下乘虛而入故曰熱入因作結胸是處方名為陷胸若痞則多偏胸脇而無正中結痛之候故但言因作痞而不用熱入二字其邪之盛衰可知是處方名為瀉心觀其主治則虛實迥然不侔則知表邪為陽裏邪為陰也明矣。或言中風為

陽邪傷寒爲陰邪。若有風傷衛氣氣受傷而反變爲結胸。寒傷營血血受傷而反成痞之理。復有誤認直中陰寒之陰。下早變成痞者。則陰寒本無實熱。何得有下早之變。設陰結陰躁而誤下之。立變危逆。恐不至於成痞。停日待變而死也。

太陽病。脈浮而動數。浮則爲風。數則爲熱。動則爲痛。數則爲虛。頭痛發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。客氣動膈。短氣躁煩。心中懊憹。陽氣內陷。心下因鞭。則爲結胸。大陷胸湯主之。若不結胸。但頭汗出。餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發黃也。脈浮而動數。雖主風熱。亦主正虛。虛故邪持日久。頭痛發熱惡寒。表終不解。醫不知其邪持太陽。未傳他經。反誤下。

之。於是動數之脉變遲。而在表之證。變結胸矣。動數變遲。三十六字。形容結胸之狀殆盡。蓋動數爲欲傳之脉。變遲則力綿勢緩而不能傳。且有結而難開之象。膈中之氣。與外實之邪兩相格闕。故爲拒痛。胃中水穀所生之精悍。因悞下而致空虛。則不能藉之以衝開外邪。反爲外邪衝動其膈。於是正氣往返邪逼之界。覺短氣不足以息。更煩躁有加。遂至神明不安。無端而生懊懣。凡此皆陽邪內陷所致也。

結胸者。項亦強如柔痙狀。下之則和。宜大陷胸圓。

結胸而至頸項亦強。證愈篤矣。蓋胸間邪結緊實。項勢常昂。有似柔痙之狀。然痙病身首俱張。此但項強。原非痙也。借此以驗胸邪十分緊逼。以大陷胸湯下之。恐過而不留。

卽以大陷胸圓下之。又恐滯而不行。故煮而連滓服之。然
後與邪相當。觀方中用大黃芒硝甘遂。可謂峻矣。而更加
葶藶杏仁。以射肺和。而上行其急。煮時又倍加白蜜。以留
戀潤導之。而下行其緩。必識此意。始得用法之妙。

結胸證其脈浮大者不可下。下之則死。

胸旣結矣。本當下以開其結。然脈浮大。則表邪未盡。下之
是令結而又結也。所以致死。此見一誤不堪再誤也。

結胸證悉具。煩躁者亦死。

亦字承上。見結胸證全具。更加煩躁。卽不下亦主死也。煩
躁曷爲主死耶。蓋邪結於胸。雖藉藥力以開之。而所以載
藥力上行者。胃氣也。胃氣亢溢於津液之內。汗之津液一
傷。下之津液再傷。至熱邪搏飲結於當胸。而津液又急奔

以應上。正有不盡不已之勢。胃氣垂絕。能無敗乎。此結胸諸法。見幾於早。兢兢以滌飲爲先務。飲滌則津液自安矣。傷寒六七日結胸熱實。脈沉而緊。心下痛。按之石鞮者。大陷胸湯主之。

熱實二字。形容結胸之狀甚明。見邪熱填實於膈間也。前條言寸脈浮。關脈沉。此言脈沉緊更明。蓋緊脈有浮沉之別。浮緊主傷寒無汗。沉緊主傷寒結胸。則知結胸非中風下早而成也。

傷寒十餘日。熱結在裏。復往來寒熱者。與大柴胡湯。但結胸無大熱者。此爲水結在胸脇也。但頭微汗出者。大陷胸湯主之。

治結胸證。所用陷胸之法者。以外邪挾內飲搏結胸間未

全入於裏也。若十餘日熱結在裏。則是無形之邪熱蘊結。必不定在胸上。而非結胸明矣。加以往來寒熱。仍兼半表。當用大柴胡湯。兩解表裏之熱邪。於陷胸之義無取也。無大熱與上文熱實互意。內陷之邪。但結胸間。而表裏之熱反不熾盛。是爲水飲結在胸脇。其人頭有微汗。乃邪在高。而陽氣不得下達之明徵。此則主用大陷胸湯。允爲的對。太陽病重發汗而復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。從心下至少腹鞭滿而痛不可近者。大陷胸湯主之。

不大便燥渴。日晡潮熱。少腹鞭滿。證與陽明頗同。但小有潮熱。則不似陽明之大熱。從心下至少腹。手不可近。則陽明又不似此大痛。因是辨其爲大陽結胸。兼陽明內實也。

緣誤汗誤下。重傷津液。不大便而燥渴潮熱。更加痰飲內結。必用陷胸湯。由胸膈以及胃腸。始得蕩滌無餘。若但下腸胃結熱。反遺膈上痰飲。則非法矣。

太陽少陽併病。而反下之。成結胸。心下鞭下利不止。水漿不下。其人心煩。

此條雖係併病。以其反下之而成結胸。當隨見所變之證。而歸重於結胸也。誤下之變。乃致結胸下利。上下交征。而陽明之居中者。水漿不入。心煩待斃。傷寒顧可易言哉。小結胸病。正在心下。按之則痛。脉浮滑者。小陷胸湯主之。小結胸病。正在心下。則不似大結胸之高在心上也。按之則痛。比手不可近。則較輕也。而脉之浮又淺於沉。滑又緩於緊。可見其人外邪陷入原微。但痰飲素盛。挾熱邪而內

結。所以脉見浮滑也。黃連半夏枳實。藥味雖平。而泄熱散結。亦是突圍而入。所以名爲小陷胸也。

寒實結胸。無熱證者。與三物小陷胸湯。白散亦可服。

寒實結胸。乃寒飲結聚。而無大熱也。意謂小陷胸半夏枳實。足以去其痰飲。又慮黃連難祛寒實。故又主白散。取巴豆之辛熱破結。貝母之苦寒開鬱。枳梗載之上涌爲的當耳。

已上結胸例

傷寒汗出解之後。胃中不和。心下痞鞭。乾噎食臭。脇下有水氣。腹中雷鳴下利者。生薑瀉心湯主之。

汗後外邪雖解。然必胃氣安和。始得脫然無恙。以胃主津液故也。津液因邪入而內結。因發汗而外亡。兩相告匱。其

人心下必痞鞭。以伏飲搏聚。胃氣不足以開之也。胃病故乾噫食臭。食入而嘔。餒酸也。胃病故水入而傍滲。脇肋也。胃中水穀不行。腹中必雷鳴而搏擊有聲。下利而清濁不分也。雖不由誤下。而且成痞。設誤下之。其痞結又當何似耶。

傷寒中風。醫反下之。其人下利日數十行。穀不化。腹中雷鳴。心下痞鞭而滿。乾嘔心煩不得安。醫見心下痞。謂病不盡。復下之。其痞益甚。此非結熱。但以胃中虛。客氣上逆。故使鞭也。甘草瀉心湯主之。

此條痞證。傷寒與中風互言。大意具見。可見病發於陰下之而成痞者。非指傷寒爲陰也。下利完穀。腹鳴嘔煩。皆誤下而胃中空虛之互辭也。設不知此義。以爲結熱而復下。

之其痞必益甚。故重以胃中虛。客氣上逆。昭揭病因。方用甘草瀉心湯者。卽生薑瀉心湯。除去生薑。人參而倍甘草。乾薑也。客邪乘虛結於心下。本當用人參。以誤而再誤。其痞已極。人參仁柔無剛決之力。故不宜用。生薑辛溫最宜用者。然以氣薄主散。恐其領津液上升。客邪從之犯上。故倍用乾薑代之以開痞。而用甘草爲君。坐鎮中州。庶心下與腹中漸至寧泰耳。今人但知以生薑代乾薑之僭。孰知以乾薑代生薑之散哉。但知甘草能增滿。孰知甘草能去滿哉。

傷寒五六日。嘔而發熱者。柴胡湯證具。而以他藥下之。柴胡證仍在者。復與柴胡湯。此雖已下之。不爲逆。必蒸蒸而振。却發熱汗出而解。若心下滿而鞭痛者。此爲結胸也。大陷胸湯

主之。但滿而不痛者。此爲痞。柴胡湯不中與之。宜半夏瀉心湯。

五六日嘔而發熱。爲太陽之本證。蓋嘔多屬陽明。然有太陽和氣未罷。欲傳陽明之候。有少陽和氣在裏。逆攻陽明之候。所以陽明致戒云。嘔多雖有陽明證。不可攻之。恐傷太陽少陽也。此本柴胡證。誤用下藥。則邪熱乘虛入胃。而膽却受寒。故於生薑瀉心湯中去生薑之走表。君半夏以溫膽。兼苓連以除胃中邪熱也。瀉心諸方。原爲瀉心下痞塞之痰飲水氣而設。此證起於嘔。故推半夏爲君耳。

傷寒大下後。復發汗。心下痞。惡寒者。表未解也。不可攻痞。當先解表。表解。乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連瀉心湯。

大下之後復發汗。先裏後表顛倒差誤。究竟已陷之邪。痞結心下。證兼惡寒。表邪不爲汗衰。卽不可更改其痞。當先行解肌之法以治外。外解已後。乃用大黃黃連攻其濕熱凝聚之痞。方爲合法耳。

脈浮而緊而復下之。緊反入裏。則作痞。按之自濡。但氣痞耳。心下痞。按之濡。其脈關上浮者。大黃黃連瀉心湯主之。心下痞而復惡寒汗出者。附子瀉心湯主之。

傷寒脈浮而緊。卽不可下。誤下而緊反入裏。則寒邪轉入轉深矣。外邪與飲搏結。故心下滿。鞭若按之自濡而不滿。鞭乃是濁氣挾濕熱痞聚於心下。則與外邪無預也。濁氣上逆。惟苦寒可瀉之。上條大黃黃連瀉心之法。卽爲定藥。若惡寒汗出。雖有濕熱痞聚於心下。而挾陽虛陰盛之證。