

S2653

673<3

十大册

卷陸

卷柒

卷捌

前陰 小便 淋症 遺精

後陰 大便 泄瀉 痢疾 脫肛 痔瘡

兩股 海底 腿部 足部

驗方新編

叁



驗方新編卷六目錄

前陰

男女交合精脫氣絕

陽痿陽物軟而不舉者是

陽舉易洩

陽物挺脹

陽物堅硬精自流出捏之則脆音痛如針刺

癆病火動陽物易舉

陽強不倒精自流出

老人腎硬

陽物被捆腫大

飛絲纏繞陽物腫痛

陽物縮入

陽物割斷

陰頭生瘡

陰毛生入腳趾

腎氣由臍下上衝心痛



小腹有塊直衝心胸叫號疼痛止覺筋硬

小腸氣痛腎子腫墜

腎子痛墜外現紅色

癰疔重墜囊大如斗

疝氣腫脹如斗

腎囊腫痛如斗

陰囊奇癢不止

陰囊陽物肛門作癢

陰囊腫如水晶

陰囊忽然腫大多因坐地所受風溼

陰囊扑損瘀血積滯

陰囊腫爛腎子落出

下部濕瘡

前後陰之間生瘡

小便

小便不通

口渴小便不通

小便不通遍身水腫

夫婦交合忍精不放及強忍小便以致不通或婦

轉胞小便閉塞

心熱如火一熱便入小腸大小便不快

小便不通氣衝心痛

小便白如米汁

小便短澀渾濁大便多而澹不思飲食

小便過多

夜睡遺尿

小便出血

小兒小便出血

小便出糞大便出尿

淋症

勞淋

氣淋

熱淋

血淋

石淋

五淋通治

五淋痛不可忍日久不愈

陽物堅硬精流不止痛如針刺

老人精敗淋痛

小兒淋症一日百餘次

增補石淋沙淋妙方

遺精

遺精諸方

疹後遺濁



南京中醫藥大學圖書館版權所有

驗方新編卷之六

前陰

男女交合精脫氣絕

男女交感樂極精脫而死切不可驚走下床男脫則女以口哺送其熱氣女脫則男以口哺送其熱氣一連數十口

呵之則必悠悠然陽氣重回矣再以人參附子湯灌之氣

之法先須閉口提丹田之氣上來盡力若貧者不能得參

急用黃芪四兩當歸黃兩附子五錢水煎服亦有生者

又方用人抱起坐之以人之口氣呵其口又恐不能入

喉急以筆管通其兩頭入病人喉內使女子呵之不必皆



中醫藥大學圖書館版權所有

妻妾也凡婦人皆可盡力呵之雖死去亦生

陽痿

陽物軟而不舉者是

千口一杯飲此方專治陽痿不舉一杯作二三百日緩緩

飲之能生精養血益氣安神其功不可盡述

高麗參好

參亦熟地

各五錢

沙苑蒺藜

淫羊藿

母丁香各

錢

遠志去心

沉香

各壹錢

荔枝肉

七個

右藥浸上好燒酒

勛三日後蒸三炷香久取起浸冷水中拔出火氣過二十

一日飲之

又方

麻雀

又名雀

肉冬月煮食功能起陽生

子其效無窮或用麻雀蛋煮食更為神妙

又方新鳳仙花子

即指甲

花子又名

鴉片煙

貳錢

蟾酥



中醫藥大學圖書館版權所有

八分真麝香

武分此味俟共

為一大丸外川葱白搗爛也

裹再加紙一二層川水泡溼放炭火中煨熱換紙再煨

至七次去葱紙將藥改為小丸如菜豆大每於將睡時

二時取二丸用酒化開敷陽頭上半時俟陽物舉起將藥

洗去然後行事堅而且久並能種子其效如神屢試屢驗

又方大附子壹個重壹兩

鴉片煙五分硫黃末

貳錢

山甲兩片炙將附子挖空以各藥納入用好酒半觔和附

子用文武火煮乾取出搗爛如膏先用

麝香

叁釐

放臍

眼再將此膏貼上應驗無比

文火者微火也武火者烈火也

又方

母

猪腹內子腸新瓦上焙乾為末每服一錢燒酒送下可管

一月 又方 蜂巢新瓦上焙枯爲末新汲水調服一二

錢終夜不倒極效

陽舉易洩

有人交合之初陽舉卽洩百治不效後用 大蚯蚓又名蟥

要韭菜十一條破開長流水洗淨加韭菜汁搗融滾酒中

服日服一次服至數日卽能久戰可望生子

陽物挺脹

甘草梢 貳兩 小黑豆 半升 煎濃湯服

陽物堅硬精自流出捏之則脆音痛如針刺

此名腎漏又名妬精或云生楊梅瘡多有此症用破故紙

韭菜子

各壹錢五分

黃柏

五分

煎服若不見效照後強中方

治之

癆病火動陽物易舉

皮硝放手心兩手合住其硝自化陽物即不舉矣以燒酒和泥敷陰毛上陽即復舉總之陽舉則相火妄動其病難愈必致貪色亡身不如不舉安心靜養為妙保生惜命者宜加意焉

陽強不倒精自流出

此名強中乃陽盛實熱不急治必發大癰難治用 生地

黃柏

知母

龍骨

大黃

枳壳

各壹錢

水煎服若胃



虛食少者則用

黃柏

甘草

砂仁

各壹錢

水煎服

老人腎硬

老人腎藏虛寒內腎結硬雖服補藥不效用羊腰子壹對

杜仲一片

長貳寸寬壹寸

煮熟空心食之腎自柔軟再用補藥調

陽物被捆腫大

一小兒被人用頭髮繫住龜頭少時氣閉腫大無法可

後將小兒坐冷水中卽刻縮小去髮卽愈

飛絲纏繞陽物腫痛不已

威靈仙

貳兩

煎膿汁泡洗卽愈

陽物縮入



方見卷十四傷寒門陰症傷寒內

陽物割斷

凡陽物割斷傷口不合急用所割陽物焙枯研末用酒沖

服立效

陰頭生瘡

名下疳

臘甘石

壹兩火煨醋洗再煨再淬五次

兒茶

叁錢

共研末香油調敷立愈

又方

婦人月經布

燒灰候冷

麻油調敷百發百中或加頂上

冰片少許更妙

又方先用

甘草

銀花

葱頭煎湯

洗淨用

生橄欖核一個

無則用鹽攪亦可燒存性

頂上梅

花冰片一分共為細末麻油調塗雖臭爛不堪敷之即愈



南京中医药大学图书馆藏

屢試如神 又方 大訶子燒灰爲末入麝香少許先用

荊芥 黃柏 甘草 葱白煎湯洗淨然後敷之雖爛

至一二寸用此亦妙並查癰毒門楊梅瘡方內服湯藥爲

妙 又方 銀青散 見癰毒諸方 敷之神效 又方 蠶屎燒灰

敷百藥不效者用此如神 又方 五倍子 研絲 搗爛

包敷雖腐爛不堪者亦效

陰毛生八腳虱

白菓嚼融擦之神效或用桃仁嚼融擦之亦可

腎氣由臍下上衝心痛小便不通

此名心疝用韭菜汁和五苓散 見內外備用諸方 藥末以小茴香

煎湯冲服 又方 眞雲苓 小茴香各四錢 共研末水爲

丸梧子大每服叁錢開水下服完卽愈其效如神

小腹有塊直衝心胸叫號疼痛止覺筋硬

此名橫梁疝最難醫治婦女患此最多用 補骨脂黃鍾

黑芝麻貳兩 拌炒篩去芝麻只將補骨脂磨末器 以酒

爲丸每服三錢開水送下或照後絲瓜方及丹溪方更妙

小腸氣痛腎子腫脹偏墜

名曰疝氣用 老絲瓜又名水瓜 又名綠瓜 瓦上焙枯研末熱酒冲

服重者不過三服卽愈雖氣痛衝心亦效 又方 凡疝

初起必發寒熱疼痛欲成囊癰者用新鮮地骨皮卽枸杞子根



南京中醫藥大學圖書館藏

生薑各四兩共搗如泥用紬包於囊上其癢異常一夕即消

永不再發 又方 陳皮 荔枝核炒焦 硫黃火中鎔化

去火 各等分共研末飯為丸如梧子大每服十四丸五九空

毒 心服酒下其疼立止痛甚者加五六丸不可再多雖氣痛

衝心三四服可以斷根此丹溪方也 又方 槐子壹兩

炒為末入鹽叁分空心熱酒送下腫消痛止

又方 雄黃五分飛淨為細末姜湯下止痛如神

又方 將兩腳第二指對捆一處用豆大艾火從第二腳

指頭上合縫處燒之立愈或在足大指外邊甲縫內中間

不上不下之處燒之亦可男女左右 又方 左腳裡側螺螄

骨上排起四指三陽交穴 艾火燒七次止痛如神並可

除根 又方 旱蓮草 五錢 又名墨斗墨東 酒煮服不論老少

近皆效 又方 栗炭燒紅放碗內加好燒酒半碗以碗

蓋住飲之雖痛不可忍亦可立止 又方 病在左用

荔枝核 一歲 壹粒 新瓦上焙枯研末空心好酒冲服病在右用

小茴香 五錢 鹽水炒研末空心服一日兩次甚效

又方 荔枝核 四兩 鹽水浸炒 小茴香 壹兩 鹽水炒 同研極細加紅白

二糖拌勻為丸如梧子大每服五錢一日三次四劑後即

可斷根 又方 穀樹葉 三月三日或五月五日採取每

用四錢煎湯服服後即時小解一二次立愈輕者一服重

者兩服全愈神效穀樹又名楮樹又名楮音垢樹又名穀皮

樹 又方 苦楮樹葉半觔煮滾放鑊內先熏後洗每日

數次其效甚速 又方 生石菖蒲 柑子葉 小茴香

各壹 搗極融爛置酒壺內加開水一碗將壺入鍋內隔水

兩 盪滾於患處隔衣頻頻熨之止痛如神 又方 青藥

錢 滾水送下立止三服除根 又方 葫蘆巴子 壹兩

鍋內炒黑研末每服三錢滾酒送下出微汗即消

又方 葶麻子 七粒 和飯搗為丸敷腳心左痛敷左右痛

敷右雙痛雙敷 又方 黨參 叁錢 當歸 酒洗 炙芪 各貳

川芎 川棟 小茴 橘核 荔枝 各壹 附子 肉桂 皮去

