

黃帝內經素問註證發微卷四

明太醫院正文會稽庠生元臺子馬詩仲化註證

通評虛實論第二十八

評論也。內論病有虛實之義故名篇。

黃帝問曰。何謂虛實。岐伯對曰。邪氣盛則實。精氣奪則虛。此先明虛實二字之義也。言人非無故而實。以邪氣盛則實耳。邪氣盛者。外感也。非無故而虛。以正氣奪則虛耳。正氣虛者。內傷也。

帝曰。虛實何如。岐伯曰。氣虛者。肺虛也。氣逆者。足寒也。非其時則生。當其時則死。餘藏皆如此。

此舉肺虛一藏。其生死必隨乎時。而可以例諸藏也。肺

主氣氣虛者肺虛也。氣逆者氣上行而逆。則在下之足。以無氣而寒。故此肺虛而非相尅之時則生。如春秋冬是也。如遇相尅之時則死。如夏時之火是也。餘藏虛者其生死亦如此而已。夫帝問虛實而伯先以虛爲對。未及於實也。

帝曰何謂重實。

重平聲後同

岐伯曰所謂重實者言大熱病氣熱脉滿

此言病有重實之義也。大熱爲病邪氣甚熱。

以後文寒氣暴上脉

滿而實照之則此氣熱者邪氣熱也非人之中氣也。

其脉甚滿是實而又實謂之

重實也。

素問指諸經篇卷四

帝曰：經絡俱實，何如？何以治之？岐伯曰：經絡皆實，是寸脈急而尺緩也。皆當治之。故曰：滑則從，澹則逆也。夫虛實者，皆從其物類始。故五藏骨肉滑利，可以長久也。帝曰：絡氣不足，經氣有餘，何如？岐伯曰：絡氣不足，經氣有餘者，脈口熱而尺寒也。秋冬爲逆，春夏爲從。治主病者。帝曰：經虛絡滿，何如？岐伯曰：經虛絡滿者，尺熱滿，脈口寒澹也。此春夏死，秋冬生也。帝曰：治此者，柰何？曰：絡滿經虛，灸陰刺陽。經滿絡虛，刺陰灸陽。

此節卽經絡俱實，絡虛經實，經虛絡實者，而擬其脈體，決其死生，分其治法也。經者十二經也，絡者十五絡也。

虛者。卽前精氣奪則虛也。實者。卽前邪氣盛則實也。經爲陽。絡爲陰。故經中亦有屬陰者。而以絡並之。則經皆爲陽。絡中亦有屬陽者。而以經並之。則絡皆爲陰。寸部爲陽。尺部爲陰。急脈爲陽。緩脈爲陰。滑脈爲陽。濇脈爲陰。脈熱爲陽。脈寒爲陰。今寸部急而見陽。是經實也。尺脈緩而見陰。是絡亦實也。所謂經絡俱實也。必其急緩之脈帶滑。則爲順而生。帶濇則爲逆而死。何也。大凡物類皆有虛實。必滑澤則生。枯濇則死。非特脈爲然也。故五藏骨肉滑利。所以其脈亦滑。可以長久而生也。若五藏濇滯。則其脈亦濇。必不能長久而死矣。何以異於物。

類也哉。其有絡氣不足，經氣有餘，是絡虛經滿也。惟經氣有餘，故脉口熱，唯絡氣不足，故尺部寒。春夏屬陽，合經與寸；秋冬屬陰，合絡與尺。惟脉口熱而尺部寒，故時逢秋冬，則陰氣盛，而脉口不宜熱，熱爲逆而死。時逢春夏，則陽氣高，而脉口宜熱，尺中宜寒，當爲順而生。卽主病者而治之，何經有餘，則寫之；何絡不足，則補之。其有經氣不足，絡氣有餘者，卽經虛絡滿也。滿者，實也。唯絡脉滿，故尺部亦熱滿。惟經脉虛，故脉口亦寒濇。春夏應經與寸，所以寒濇則死；秋冬應絡與尺，所以熱滿而生。不言治主病者，卽上文可以例推也。治主病者何如？絡

爲陰。今滿則灸之。虛則刺之。經爲陽。今滿則灸之。虛則刺之。由此觀之。則大抵灸主於寫。而刺則可補也。

帝曰。何謂重虛。岐伯曰。脉氣上虛尺虛。是謂重虛。帝曰。何以治之。岐伯曰。虛謂氣虛者。言無常也。尺虛者。行步惛然。

脉虛者。不象陰也。如此者。滑則生。濇則死也。

按甲乙經作脉虛。脉之下

缺一虛字。氣虛。氣之下多一上字。尺虛。三者並虛爲當。故下文以氣虛尺虛脉虛爲答。詳上文重實。以氣熱脉滿爲重實。此節脉虛氣虛尺虛爲重虛者。甚有理。不但尺寸俱虛爲重虛也。王氏似未當。還以甲乙經爲的。

此言病有重虛之義也。脉虛。氣虛。尺虛。謂之重虛。氣虛。

者。真氣不足也。故脉動無常。尺虛者。腎氣不足也。故行

步惛然。脉虛者。手太陰寸口所見之脉。按之不應手也。

如此三虛是謂重虛若帶滑利則生否則滯滯而死矣
帝曰寒氣暴上脉滿而實何如岐伯曰實而滑則生實而
逆則死。

此言氣寒而脉實者亦以滑爲生而滯爲死也帝言上
文氣熱脉滿已謂重實必滑則從滯則逆今者寒氣暴
上脉亦盛滿與氣熱脉滿者異其於滑滯逆從生死何
如伯言不問寒熱止論滑滯雖因寒而實必其脉滑而
爲順則生脉滯而爲逆則死也。

帝曰脉實滿手足寒頭熱何如岐伯曰春秋則生冬夏則
死。

此卽脉證雜見陰陽者而以時決其死生也。脉實滿者是陽脉也。頭熱者是陽證也。皆邪氣有餘也。手足又寒是陰證也。乃真氣又虛也。若此者真邪不分陰陽相雜。然春秋者陰陽未盛之時也。正平和之候故生。冬夏者偏陰偏陽之時也。脉盛頭熱者不能支於夏。手足寒者不能支於冬故死。

脉浮而濇。濇而身有熱者死。

此言證與脉反者死也。脉浮而濇乃肺脉之應於秋者也。而身有熱則火盛金衰主死。此前後無問答之語。疑爲錯簡也歟。

帝曰其形盡滿何如岐伯曰其形盡滿者脉急大堅尺瀦而不應也如是者從則生逆則死帝曰何謂從則生逆則死岐伯曰所謂從者手足溫也所謂逆者手足寒也脉字下有口字

此言陽病者當得陽脉陽證也身形盡滿乃陽病也氣口之脉急大而堅是陽脉也宜尺部則瀦而不相應耳然必手足溫者是陽證也故有是脉有是證則爲從而生否則脉雖急大堅而手足反寒是謂逆而死也

帝曰乳子而病熱脉懸小者何如岐伯曰手足溫則生寒則死帝曰乳子中風熱喘鳴肩息者脉何如岐伯曰喘鳴

肩息者。脉實大也。緩則生。急則死。

此言乳子脉與病反者。復有他證可驗。病證俱甚者。復有脉體可據。而決其死生也。乳子而病熱。陽證也。而脉則懸小。是陽證見陰脉也。然手足溫和。正氣猶存。脉雖懸小。特未大耳。故可以得生。否則手足寒而死矣。又乳子中風發熱。喘鳴肩息者。陽證也。脉當實大。惟實大中而緩則邪氣漸退。可以得生。若實大中而急。則邪氣愈增。其病當死矣。

帝曰。腸澼便血何如。岐伯曰。身熱則死。寒則生。帝曰。腸澼下白沫何如。岐伯曰。脉沉則生。脉浮則死。帝曰。腸澼下膿

血何如岐伯曰脉懸絕則死滑大則生帝曰腸澼之屬身
不熱脉不懸絕何如岐伯曰滑大者曰生懸澹者曰死以
藏期之

此言腸澼之屬有便血者有下白沫者有下膿血者隨
證隨脉而可以決其死生也腸澼者大小腸有所辟積

而生諸證故腸澼爲總名而下三者爲諸證也

生氣通天論曰

因而飽食筋脉橫解腸澼爲痔所以亦用

便血者大便

中下純血也

有等俗名腸風下血有糞前來者爲近血是腎肝有火糞後來者爲遠血是心肺有

火今茲腸澼便是血爲陰而下血爲陰證若身熱則火

血凡下血皆是

盛故主死身寒則火衰故主生其下白沫者非膿非血

而白沫下行。是肺氣受傷也。然亦陰證之類。故脉沉則生。以陰證宜見陰脉也。若脉浮則死。以陰證見陽脉也。

其下膿血者。赤白相兼。氣血俱傷。

靈樞邪氣藏府病形篇謂之痼泄。難經謂

之大痼泄。後世曰痼。然脉以懸絕爲死。正氣不足也。滑大則生。正

氣有餘也。帝問凡腸澼之屬。有身不熱。則證不死。脉不

懸絕。則脉不死。伯言終當以元氣爲主。故脉必滑大則

生。若懸澼則死。其死者。以藏期之。所謂肝見庚辛死。心

見壬癸死。肺見丙丁死。腎見戊己死。脾見甲乙死者。是

也。按脉訣云。下痢微小却爲生。脉大浮洪無瘥日。今屢治此疾。亦有滑大而生。沉小而死者。其懸澼之謂邪。

當以經言爲的也。

帝曰癰疾何如岐伯曰脉搏大滑久自己脉小堅急死不治帝曰癰疾之脉虛實何如岐伯曰虛則可治實則死

此言癰疾之脉得陽脉虛脉而生也癰疾者陽證也故搏大滑則陽證得陽脉所以病久自己若脉小堅急則得陰脉故死不治然癰疾之脉當有取于虛也必搏大滑中帶虛可治若帶實則邪氣有餘乃死候也

脉訣云恍惚之

病定癰狂其脉實牢保安吉寸關尺部沉細時如此未聞人救得正與此大義相合又按長刺節論第十一節則刺狂癰有法又以靈樞癰狂篇考之則義無餘蘊矣

帝曰消痺虛實何如岐伯曰脉實大病久可治脉懸小堅病久不可治

此言消痺之病得陽脉而生也。消痺者熱證也。故脉實

大雖病久亦可治。若懸小堅又至於病久則益不可治

矣。脉要精微論云痺成爲消中。靈樞五變論消痺可參看。

帝曰形度骨度脉度筋度何以知其度也。方盛衰論云診

度肉度筋度俞度又按靈樞有骨度脉度篇名而又有經筋篇名至於形度則無之今帝以爲問而下文無答

語乃他篇之錯簡也。

帝曰春亟治經絡夏亟治經俞秋亟治六府冬則閉塞閉

塞者用藥而少鍼石也。所謂少鍼石者非癰疽之謂也。癰

疽不得頃時回。亟音棘塞入声

此言三時治病各有所宜而冬時則用藥而不用鍼也。

春時治病治其各經之絡穴。夏則治其各經之俞穴。秋則治其六府。冬則閉塞。但用藥而不用鍼石。所謂冬時少用鍼石者。非謂冬時癰疽亦不用鍼石也。彼癰疽不得頃刻挽回。若不用鍼石以寫之。則內爛筋骨藏府。豈得不用鍼石哉。特謂他病。則冬時不用鍼石耳。

癰不知所按之。不應手乍來乍已。刺手太陰傍三痛。與纓脉各二。掖癰大熱。刺足少陽五。刺而熱不止。刺手心主三。刺手太陰經絡者。大骨之會各三。暴癰筋纒。隨分而痛。魄汗不盡。胞氣不足。治在經俞。

痛音賄。掖腋同。纒軟同。

此承上文而言治癰之法。有此三等也。凡癰疽痛無定

所故按之不應手亦無定時故乍來而乍已當刺手太

陰肺經之傍三痛蓋肺經之穴在胷中者曰雲門今日

肺經之旁則是足陽明胃經氣戶等穴也刺瘡曰痛三

痛者三次也

刺三次則有刺瘡者三

其曰纓脉各二者亦以胃經

之穴如人迎水穴在結喉旁一寸五分則是結纓之所

故曰纓脉各二者左右各二也有等腋下生癰其體大

熱當刺足少陽膽經之穴五痛宜是膽經之淵液穴也

腋下三寸宛宛中舉臂得之鍼三分禁灸

若刺之而熱不止當刺手厥陰心

包絡經即手心主之穴三痛宜是天池穴也

腋下一寸乳後一寸

鍼二分灸三壯

又刺手太陰肺經之經穴經渠

寸口陷中鍼三分禁灸

絡