

寒科
二

六科准繩



傷寒準繩卷二

金壇王肯堂輯 瘦樵程永培校

太陽病

發熱 惡寒 惡風
頭痛 項強 身體痛

〔黃〕經曰太陽之爲病頭項強痛而惡風寒不傳經者固有之然而傳者多矣如經言傷寒一日太陽受之脈若靜者爲不傳頗欲吐及煩躁脈數急者爲傳也又曰傷寒二三日陽明少陽證不見者爲不傳也太陽經治法有汗吐下溫和解調併刺俱有之蓋太陽所感非一傳變多端故也雖發汗解肌一法證有輕重脈有浮沉用藥必宜隨脈證用之庶造仲景之深意如發熱惡寒脈浮緊麻黃湯自汗惡風脈浮緩桂枝湯此脈證相應之定法也又如項背強八八反汗出惡風桂枝加葛根脈微而惡寒桂枝麻黃各半湯發熱惡寒熱多寒少脈微弱者桂枝二越婢一湯脈浮緊自汗出小便數心煩微惡寒腳攣急桂枝加附子湯又如汗後復宜汗者發汗遂漏不止惡風小便難四肢微急難以屈伸桂枝加附子湯服桂枝大汗出脈洪大者與桂枝如前法若如瘧狀日再發宜桂枝二麻黃一湯仲景汗劑二十七湯所治五十九證大宜精別如何而用青龍湯如何而用五苓散如何而用茯苓甘草湯之類蓋病有輕重治有急緩故也清碧杜先生曰傷寒陽熱之證傳經之邪變態不一辨之不精則汗吐下三法之治一差死生反掌矣

非比陰寒之邪中在一經不復傳變易於治也不過隨寒邪輕重用溫藥治之一定之法耳今之庸工好用熱劑而不知涼藥之妙且難也

〔汗〕桂枝湯 桂枝加葛根湯 桂枝加厚朴杏子湯 桂枝加附子湯 桂枝去芍藥湯 桂枝去芍

藥加附子湯 桂枝麻黃各半湯 桂枝二越婢一湯 桂枝二麻黃一湯 桂枝去桂加茯苓白朮湯

葛根湯 葛根加半夏湯 葛根黃連黃芩湯 麻黃湯 大青龍湯 小青龍湯 桂枝加芍藥人

參新加湯 麻黃杏仁甘草石膏湯 五苓散 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯 桂枝加桂湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯 桂枝附子湯 茯苓甘草湯 文蛤散 去桂加白朮湯 甘草附子湯

〔吐〕梔子豉湯 梔子甘草豉湯 梔子生薑豉湯 梔子厚朴湯 梔子乾薑湯 瓜蒂散

〔下〕調胃承氣湯 大柴胡湯 承氣湯 柴胡加芒硝湯 桃仁承氣湯 抵當丸 大陷胸湯 抵

當湯 大陷胸丸 白散 十棗湯 大黃黃連瀉心湯 附子瀉心湯

〔溫〕甘草乾薑湯 芍藥甘草湯 四逆湯 乾薑附子湯 茯苓桂枝甘草大棗湯 厚朴生薑甘草

半夏人參湯 茯苓桂枝白朮甘草湯 芍藥甘草附子湯 茯苓四逆湯 桂枝甘草湯 真武湯

小建中湯 炙甘草湯

〔利解〕小柴胡湯 柴胡加龍骨牡蠣湯 小陷胸湯 柴胡桂枝乾薑湯 半夏瀉心湯 生薑瀉心

湯 甘草瀉心湯 柴胡桂枝湯 桂枝人參湯 白虎湯 白虎加人參湯 黃芩湯 黃芩加半夏

生薑湯

〔調〕赤石脂禹餘糧湯 旋復代赭石湯 黃連湯

〔刺〕縱橫刺期門 服桂枝刺風池風府 太少併病刺期門 熱入血室刺期門 太少併病刺大椎

肺俞

太陽之為病脈浮頭項強痛而惡寒〔成〕經曰尺寸俱浮者太陽受病太陽主表為諸陽主氣脈浮

陽病發熱汗出惡風脈緩者名為中風太陽病上條所揭云云者是也後皆倣此○〔成〕風陽也寒陰也

而惡寒衛病則發熱汗出不惡寒而惡風以衛為陽衛外者也病則不能衛固其外而皮腠疎故汗出而惡風也傷寒脈緊傷風脈緩者寒性勁急而風性舒緩故也 太陽病頭痛發熱

汗出惡風者桂枝湯主之 太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯〔成〕

中風風併於衛則衛實而榮虛榮者陰也衛者陽也發熱汗出陰弱陽強也內經曰陰虛者陽必湊之故少氣時熱而汗出與桂枝湯解散風邪調和榮衛 太陽中風陽浮而陰弱

陽浮者熱自發陰弱者汗自出瑟瑟惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之〔成〕陽以候衛

浮者衛中風也陰脈弱者榮氣弱也風并於衛則衛實而榮虛故發熱汗自出也經曰太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強者是也瑟瑟者不足也惡寒之貌也淅淅者灑淅也惡風之貌也衛虛則惡風榮虛則

脈浮緩有汗為中風宜桂枝湯

傷寒準繩

卷二 太陽病



中醫藥大學圖書館藏

惡寒榮弱衛強惡寒復惡風者以自汗出則皮膚緩腠理疎是亦惡風也翕翕者煖煖然而病人藏無熱也若合羽所覆言熱在表也鼻鳴乾嘔者風擁而氣逆也與桂枝湯和榮衛而散風邪也

他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時發汗則愈宜桂枝湯主之時發熱自汗出謂有時而發熱自汗出有時而

止惟其時作時止故病留連而不愈也當其發熱自汗之時不可與藥當先其時作候其時止而後與之故曰先其時也素問曰當其盛而必毀因其衰也事必大昌其是之謂歟

桂枝湯方

桂枝三兩 去皮

芍藥三兩

甘草二兩 炙

生薑三兩 切

大棗十二枚 擘

右五味咬咀

以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍身縈縈微似有汗者益佳不可令如水淋漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物小促宋板作少從容

〔成〕經云桂枝本為解肌若脈浮緊發熱汗不出者不可與之常須識此勿令誤也蓋桂枝湯本專主

太陽中風必也皮膚疎濇又自汗風邪干於衛氣者乃可投之也仲景以解肌為輕以發汗為重故發

汗吐下後身疼不休者津液內耗也雖有表邪而止可解肌故須桂枝湯少和之也桂味辛熱用之為

君桂猶圭也宣導諸藥為之先聘是謂辛甘發散為陽之意蓋發散風邪必以辛為主內經所謂風淫

所勝平以辛佐以苦以甘緩之以酸收之是以芍藥爲臣而甘草爲佐也內經曰風淫於內以甘緩之以辛散之生薑味辛溫大棗味甘溫是用以爲使而此又不特專於發散以脾主爲胃行其津液薑棗之用專行脾之津液而和榮衛者也麻黃湯不用薑棗者謂專於發汗不待行化而津液得通矣

〔罷〕凡桂枝湯病證者常自汗出小便不數手足溫和或手足指稍露之則微冷覆之則溫渾身熱微煩而又憎寒始可行之若病者無汗小便數或手足逆身冷不惡寒反惡熱或飲酒後慎不可行桂枝湯也脈緊必無汗設有汗不可誤作桂枝證

〔許〕有人病發熱惡寒自汗脈微弱而浮三服湯而愈此方在仲景一百十三方內獨冠其首今人全不用何也仲景云太陽中風陽浮而陰弱陽浮者云云至翕翕發熱宜桂枝湯此脈與證仲景說得甚明後人看不透所以不敢用也 假令寸口脈微名曰陽不足陰氣上入陽中則灑淅惡寒也尺脈弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發汗也此謂元氣受病而然也又曰陽微則惡寒陰微則發熱醫既汗之使陽氣微又大下之令陰氣弱此謂醫所使也大抵陰不足陽往從之故內陷而發熱陽不足陰往乘之故陰上入陽中則惡寒舉此二端明白易曉何憚而不用桂枝湯哉

〔垣〕仲景治表虛製此湯桂枝味辛熱發散助陽體輕本乎天者親上故桂枝爲君芍藥甘草佐之如

脉浮緊無汗為傷寒
宜麻黃湯

陽脈瀋陰脈弦法當腹中急痛乃製小建中湯以芍藥為君桂枝甘草佐之一則治其表虛一則治其裏虛故各有主用也後學當觸類而長之以桂枝易肉桂治寒腹痛神品藥也如夏中熱腹疼少加黃芩去桂痛立止桂於春夏二時為禁藥

〔陶〕桂枝麻黃湯為當時傷寒設與過時之溫暑者何預焉若以此二湯通治春溫夏暍之病則誤之甚矣

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者名曰傷寒

〔成〕經曰凡傷於寒則為病熱為寒氣客於經中陽經怫結而

成熱也中風即發熱者風為陽也及傷寒云或已發熱或未發熱以寒為陰邪不能即熱鬱而方變熱也風則傷衛寒則傷榮衛虛者惡風榮虛者惡寒榮傷寒者必惡寒也氣病者則麻血病者則痛風令氣緩寒令氣逆體痛嘔逆者榮中寒也經曰脉盛身寒得之傷寒脉陰陽俱緊者知其傷寒也○但見惡寒即為在表此是要訣

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

〔成〕寒則傷榮頭痛身疼腰痛以至牽連骨節疼痛者太陽經榮血不利也內經曰風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱者寒在表也風并於衛

衛實而榮虛者自汗出而惡風寒也寒并於榮榮實而衛虛者無汗而惡風也以榮強衛弱故氣逆而喘與麻黃湯以發其汗

麻黃湯方

麻黃二兩
去節

桂枝二兩
去皮

甘草一兩
炙

杏仁七十個
泡去皮尖

右四味以水九升先煮麻

黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微汗不須啜粥餘如桂枝法○凡用麻黃去節先滾醋

湯略浸片時撈起以備後用庶免太發如冬月嚴寒腠理緻密當生用

一用麻黃後汗出不止者將病人髮披水盆中足露出外用炒糯米一升龍骨牡蠣藥本防風各一兩研爲細末周身撲之隨後祕方用藥免至亡陽而死此良法也

〔吳〕或云發汗必用麻黃亦有禁用者何也凡傷寒發於天令寒冷之時且其寒邪在表閉其腠理身疼拘急惡寒而無汗者須用麻黃辛苦之藥爲能開發腠理逐寒邪汗出而解也惟夏月炎暑之時爲禁用之藥故宜辛涼之劑以發之乃葛根葱白豆豉之類是也若麻黃加涼劑在內亦可用如通解散是也

〔成〕本草言輕可去實卽麻黃葛根之屬實謂寒邪在表汗不出而腠密邪氣勝而表實輕劑所以揚之麻黃味甘苦用以爲君者以麻黃爲輕劑而專主發散也風邪在表而膚理疎者必以桂枝解其肌今寒邪在經表實而腠密非桂枝所能獨散必專麻黃以發汗而桂枝所以爲臣也內經曰寒淫於內治以甘熱佐以辛苦者茲是類歟內經曰肝苦急急食甘以緩之肝者榮之主也傷寒榮勝衛固血脈不流必用味甘之物以緩之故以甘草味甘平杏仁味苦溫爲之佐使且桂枝湯主中風風則傷衛風邪併於衛則衛實而榮弱仲景所謂汗出惡風者此爲榮弱衛強故桂枝湯佐以芍藥用和榮也麻黃湯主傷寒寒則傷榮邪併於榮則榮實而衛虛內經所謂氣之所併爲血虛血之所併爲氣虛者是矣

故麻黃湯佐以杏仁用利氣也

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛汗不出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服服

之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也

〔成〕此中風見寒脈也浮則為風風則傷衛衛緊則為寒寒則傷榮榮衛俱病故發熱惡寒身疼痛也風并於衛者為榮弱衛強寒併於榮者為榮強

衛弱今風寒兩傷則榮衛俱實故不汗出而煩躁也與大青龍湯發汗以除榮衛風寒若脈微弱汗出惡風者為榮衛俱虛反服青龍湯則必亡陽故生厥逆筋惕肉瞤此治之逆也

傷寒脈浮

緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者大青龍湯發之

〔成〕此傷寒見風脈也傷寒者身疼此以風勝故

厥吐利無少陰裏證者為風寒外甚也與大青龍湯以發散表中風寒

大青龍湯方

麻黃

六兩去節

桂枝

二兩去皮

甘草

二兩炙

杏仁

四十枚去皮尖

生薑

三兩切

大棗

十二枚擘

石膏

雞子大碎

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓

溫服一升取微似汗汗出多者溫粉粉之一服汗者停後服若復服汗多亡陽遂一作逆虛惡風煩躁不

得眠也

〔成〕青龍東方甲乙木神也應春而主肝專發生之令為數榮之主萬物出甲開則有兩岐肝有兩葉

以應之謂之青龍者以發散榮衛兩傷之邪是應肝木之體耳桂枝湯主中風麻黃湯主傷寒中風脈

浮緊爲中風見寒脈傷寒脈浮緩爲傷寒見風脈是風寒兩傷也風兼寒寒兼風雖欲與桂枝湯解肌以祛風而不能已其寒或欲以麻黃湯發汗以散寒而不能去其風茲仲景所以特處青龍湯而兩解也麻黃味甘溫桂枝味辛熱寒則傷榮必以甘緩之風則傷衛必以辛散之此風寒兩傷榮衛俱病故以甘辛相合而爲發散之劑表虛腠疎則以桂枝爲主此爲表實腠理密者則以麻黃爲主是先麻黃爲君後桂枝爲臣也甘草味甘平杏仁味甘苦苦甘爲助佐麻黃以發表大棗甘溫生薑味辛溫辛甘相合佐桂枝以解肌風陽邪寒陰邪風則傷陽寒則傷陰榮衛陰陽爲風寒兩傷則非輕劑可獨除散也必須輕重之劑以同散之乃得陰陽之邪俱已榮衛之氣俱和是以石膏味苦辛微寒質重而又專達肌表爲使也大青龍發汗之重劑用之稍過則有亡陽之失經曰若脈微弱汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也又曰一服汗者停後服若再服汗多亡陽遂致惡風煩躁不得眠也

用者宜詳審之

〔吳〕大青龍湯仲景治傷寒發熱惡寒煩躁者則用之夫傷寒邪氣在表不得汗出其人煩躁不安身心無如之奈何如脈浮緊或浮數者急用此湯發汗則愈乃仲景之妙法也譬若亢熱已極一雨而涼其理可見也若不曉此理見其躁熱投以寒涼之藥其害豈勝言哉若脈不浮緊而數無惡風惡寒身

疼者亦不可用之也如誤用之其害亦復不淺所以脈證不明者多不敢用也

〔許〕仲景治傷寒一則桂枝二則麻黃三則青龍桂枝治中風麻黃治傷寒青龍治中風見寒脈傷寒見風脈三者如鼎立人皆能言之而不曉前人處方用藥之意故醫遂多不用無足怪也且脈緩而浮則中風也故奮奮惡風淅淅惡寒翕翕發熱仲景以桂枝對之脈浮緊而濇者傷寒也故頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡寒無汗而喘仲景以麻黃對之至於中風脈浮緊傷寒脈浮緩仲景皆以青龍對之何也予嘗深究三旨若證候與脈相對無不應手而愈何以言之風傷衛衛氣也寒傷榮榮血也榮行脈中衛行脈外風傷衛則風邪干陽陽氣不固發越而爲汗是以自汗是表虛故仲景用桂枝以發其邪芍藥以和其血蓋中風則病在脈之外其病稍輕雖曰發汗特解肌之藥耳故仲景於桂枝證云令半身縶縶微似有汗不可如水淋漓病必不除是知中風不可大發汗汗過則反動榮血邪氣乘虛襲之故病不除也寒傷榮則寒邪入陰血而榮行脈中者也寒邪居脈中非特榮受病邪自內作則併與衛氣犯之久則浸淫及骨是以汗不出而熱齒乾而煩冤仲景以麻黃發其汗又以桂枝甘草助其發散欲滌除內外之邪榮衛之病耳大抵二藥皆發汗以桂枝則發其衛之邪麻黃并榮與衛治之亦自有淺深也何以驗之仲景桂枝第十九證云病常自汗出者此爲榮氣和榮氣和者外不諧以衛

氣不共榮氣諧和故爾以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮衛和則愈宜桂枝湯又四十七證云發熱汗出此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風者宜桂枝湯是知中風汗出者榮和而衛不和又第一卷云寸口脈浮而緊浮則為風緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當發其汗是知傷寒浮緊者榮衛俱病也麻黃湯中并用桂枝此仲景之意也至於青龍雖治傷風見寒脈傷寒見風脈之病然仲景又云汗出惡風者不可服之服之厥逆便有筋惕肉瞤之證故青龍一證尤難用藥須是形證諦當然後可行故王實夫證止用桂枝麻黃各半湯治之蓋慎之也

〔陶〕熱盛而煩手足自溫脈浮而緊此傷風見寒脈也不煩少熱四肢微厥脈浮而緩此傷寒見風脈也二者為榮衛俱病法宜大青龍湯但此湯險峻須風寒俱甚又加煩躁乃可與之否則不如桂枝麻黃各半湯為穩尤不若九味羌活湯加石膏知母枳殼也

溫粉方

白朮

藁本

川芎

白芷各等分

右研為細末每末一兩入米粉

三兩和勻撲周身止汗若汗過多恐亡陽遂厥逆惡風煩躁不得眠故宜以此粉止之

太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝加葛根湯主之

按詩幽風狼跋云赤寫几几注云几几綯貌綯謂拘著鳥屨頭為行戒狀如刀衣鼻在屨頭言

太陽病項背強有汗者
葛桂湯

傷寒準繩

卷一 太陽病

六



拘者取自拘持使低目不妄顧視按此可以想見項背拘強之狀若作鳥羽釋則凡當音殊而於拘強之義反不切矣後證葛根湯者乃桂枝湯中加麻黃葛根也其證無汗故以麻黃發之此證有汗故去麻黃而曰桂枝加葛根湯也若有麻黃則亦葛根湯矣成氏不當設疑於注以眩後學故辯之

桂枝葛根湯方

葛根 四兩

芍藥 二兩

甘草 二兩

生薑 三兩切

桂枝 二兩去皮

大棗 十二枚擘

右七味以水一斗煮取三升去滓溫服一升

無汗者葛根湯

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

葛根湯方

葛根 四兩

麻黃 三兩去節

桂枝 二兩去皮

芍藥 二兩切

甘草 二兩炙

生薑 三兩切

大棗 十二枚擘

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫納諸藥煮取三

升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息及禁忌

本草云輕可去實麻黃葛根之屬是也此以中風表實故加二物於

桂枝湯中也

脉微身癢者桂麻各半湯

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自調一日二三度發脈微緩者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小



汗出身必癢宜桂枝麻黃各半湯

(成)傷寒八九日則邪傳再經又偏三陽欲傳二陰之時也傳經次第則三日傳遍三陽至四日陽去入陰不入陰者為欲解其傳陰經第六

日傳遍三陰為傳經盡而當解其不解傳為再經者至九日又遍三陽陽不傳陰則解如瘧發作有時也寒多者為病進熱多者為病退經曰厥少熱多其病為愈寒多熱少陽氣退故為進也今雖發熱惡寒而熱多寒少為陽氣進而邪氣少也裏不和者嘔而利今不嘔清便自調者裏和也寒熱間日發者邪氣深也日一發者邪氣復(宋本作有)常也日再發者邪氣淺也日二三發者邪氣微也內經曰大則邪至小則平言邪甚則脉大邪少則脉微今日數多而脉微緩者是邪氣微緩也故云欲愈脉微而惡寒者表裏俱虛也陽表也陰裏也脉微為裏虛惡寒為表虛以表裏俱虛故不可更發汗更下更吐也陰陽俱虛則面色青白反有熱色者表未解也熱色為赤色也得小汗則和不得汗則邪氣外散皮膚亦為癢也與桂枝麻黃各半湯小發其汗以除表邪○首一節至寒少止為自初至今之證下文皆擬病防變之辭當作三截看至欲愈也是不須治至吐也是宜溫之至末是小汗之麻黃發桂枝止一發一止則汗不得大出矣

桂枝麻黃各半湯方

桂枝一兩十六銖去皮

芍藥

生薑切

甘草炙

麻黃

去節各一兩

大棗四枚

杏仁

二十四枚湯浸去皮尖及雙仁者

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮

取一升八合去滓溫服六合

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不可發汗宜桂枝二越婢一湯

前脉微緩面有熱色身癢以桂麻各半小汗之

者猶未弱也此微而加弱焉則又虛於前證矣雖小汗亦不宜故云不可發汗決詞也然病在太陽表證未罷桂枝發散之藥終不可無但不令汗而已

桂枝二越婢一湯方

傷寒準繩

卷二太陽病

七

脉微弱身不癢桂婢各半湯

桂枝 去皮

芍藥

甘草 各七錢半

生薑 一兩二錢切

大棗 四枚擘

麻黃 去節七錢半

石膏 一兩碎綿裹

右七味咬咀以水五升先煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮取二

升去滓溫服一升本方當裁為越婢湯桂枝湯合飲一升今合為一方桂枝二越婢一

之主脾治水穀為卑藏若婢內經曰脾主為胃行其津液是湯所以謂之越婢者以發越婢氣通行津

液外臺方一名越脾湯即此義 凡仲景稱太陽病者皆表證發熱惡寒頭項強痛也若脈浮大則與

證相應宜發汗今見表證而脈反微不與證應故不可發汗但用一二各半湯等和之可也

若太陽中暍發熱惡寒脈微弱手足逆冷而渴者白虎加人參湯 方論見暑病

太陽病六七日表證仍在脈微而沉反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當硬滿小便不利者下血

乃愈所以然者以太陽隨經瘀血在裏故也抵當湯主之 方論見畜血 太陽病身黃脈沉結少腹硬小便不

利者為無血也小便自利其人如狂者血證諦也亦抵當湯主之 詳畜血 凡仲景稱太陽證脈沉者皆謂

發熱惡寒頭項強痛而脈反沉也其證兼發狂小腹硬者為畜血此條抵當湯是也

兼關節痛小便不利身黃者為濕痺 論見濕

太陽濕痹

太陽瘕證

兼卒口噤反張者為瘕若無汗惡寒名剛瘕宜葛根湯若有汗不惡寒名柔瘕宜瓜蒌桂枝湯 詳雜病瘕門

病發熱頭痛脈反沉若不瘥身體疼痛當救其裏宜四逆湯 少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子

細辛湯主之

〔趙〕竊詳太陽病發熱頭痛法當脈浮今反沉少陰脈沉法當無熱今反熱仲景於此兩證各言反者謂反常也蓋太陽病脈似少陰少陰脈病似太陽所以皆謂之反而治之當異也今究其旨均是脈沉發熱以其有頭痛故爲太陽病陽證當脈浮今反不能浮者以裏虛久寒正氣衰微所致又身體疼痛故宜救裏使正氣內復逼邪出外而乾薑生附子亦能出汗而解假使裏不虛寒則脈當見浮而正屬太陽麻黃證也均是脈沉發熱以其無頭疼故名少陰病陰病當無熱今反熱則寒邪在表未傳於裏但以皮腠鬱閉爲熱而在裏無熱故用麻黃細辛以發表間之熱附子以溫少陰之經假使寒邪入裏則外必無熱當見吐利厥逆等證而正屬少陰四逆湯也由此觀之表邪浮淺發熱之反猶輕正氣衰微脈沉之反爲重此四逆湯不爲不重於麻黃附子細辛湯也又可見熟附配麻黃發中有補生附配乾薑補中有發仲景之旨微矣

麻黃附子細辛湯方

麻黃

二兩
去節

細辛

二兩

附子

一枚炮去
皮破八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫

納藥煮取三升去滓溫服一升日再服

〔成〕內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以辛潤之麻黃之甘以解少陰之寒細辛附子之辛以溫少陰之經

〔趙〕詳仲景發汗湯劑各分輕重不同如麻黃桂枝湯青龍各半越婢等湯各有差等至於少陰發汗二湯雖同用麻黃附子亦有加減輕重之別故以加細辛爲重加甘草爲輕辛散甘緩之義也其第一證以少陰本無熱今發熱故云反也蓋發熱爲邪在表而當汗又兼脈沉屬陰而當溫故以附子溫經麻黃散寒而熱須汗解故加細辛是汗劑之重者第二證既無裏寒之可溫又無裏熱之可下求其所以用麻黃附子之義則是脈亦沉方可名曰少陰病身亦發熱方行發汗藥又得之二三日病尚淺比之前證亦稍輕故不重言脈證而但曰微發汗所以去細辛加甘草是汗劑之輕者 凡仲景稱太陽病不惡寒者皆謂發熱頭項強痛脈浮而反不惡寒也其證兼渴者爲溫病兼汗出者爲柔瘧方論見溫病柔瘧

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者柴胡加桂枝湯主之

〔成〕傷寒六七日邪當傳裏之時也

支散也嘔而心下結者裏證也法當攻裏發熱微惡寒支節煩疼爲外證未去不可攻裏與柴胡桂枝湯以和解之○按支字訓散字未瑩支節支結復不同支節猶云枝節古字通也支結猶云支撐而結當活