

525-6

1000

5571
055

1910



丹溪心法附餘卷之二十

婦人門上

經病九十二

○婦人經水過期血少也四物加參朮有痰加南星半夏陳皮之類 經水不及期而來者血熱也四物加黃

連 過期紫黑有塊亦血熱也必作痛四物加香附黃連 過期淡色來者痰多也二陳加川芎當歸 過期

而來是血虛宜補血用四物加黃芪陳皮升麻 未及期先來乃是氣血俱熱宜涼氣血柴胡黃芩當歸白芍

生芩香附之屬 經不調而血水淡白宜補氣血參芪芎歸香附白芍腹痛加膠珠艾葉玄胡索 經候過而

作痛者乃虛中有熱所以作痰 經水將來作痛者血實也 氣滯四物加桃仁黃連香附 臨行時腰疼腹痛

乃是鬱滯有瘀血宜四物加紅花桃仁義朮玄胡索香附木香發熱加黃芩柴胡 紫色成塊者熱也四物加

黃連柴胡之類 痰多占住血海地位因而下多者目必漸昏肥人如此用南星蒼朮川芎香附作丸子服之

肥人不及數日而多痰多血者虛有熱亦用前丸藥中更加黃連白朮服之 血枯經閉者四物加紅花軀

脂滿經閉者以導痰湯加黃連川芎不可服地黃泥膈故也如用以姜汁炒 肥胖飲食過度之人而經水不

調者乃是溼痰宜蒼朮半夏滑石茯苓白朮香附川芎當歸 臨經來時肚痛者四物湯加陳皮玄胡索牡丹皮

甘草痛甚者豆淋酒痛緩者童便煮附入炒條芩研末為丸 經水去多不能住者以三補丸加香附龜板金

毛狗脊 陰虛經水久不通小便澀身體疼痛四物加蒼朮牛膝陳皮生甘草又用蒼莎丸加蒼耳酒芍藥為

丸就煎煎藥吞下入方 治經水過多

黃芩 炒 白芍 炒 龜板 炙各一兩 黃柏 炒三錢 椿根白皮 半錢 香附子 二錢

右為末酒糊丸空心溫酒或白湯下五十丸 又方 治積痰傷經不行夜則妄語

瓜蒌子 一兩 黃連 半兩 吳茱萸 十粒 桃仁 五十 紅曲 二錢 砂仁 三兩 麻粗木

足本丹溪心法附餘 卷二十 婦人門 一 滄海海左書局印行

右為末生姜汁浸炊餅為丸梧子大每服一百丸空心開水下
又方 治一切瘀血為痛

香附

醋煮

瓦礫子

煮一夜

桃仁

牡丹皮

大黃

蒸熱

當歸

川芎

紅花

右為末蒸餅丸如梧子大空心溫酒下三五十丸

導痰湯

見痰類

三補丸

見補損

蒼莎丸

見咳嗽

附諸方

○月經不調

加減四物湯

治衝任虛損月水不調臍腹疼痛

當歸

川芎

芍藥

熟芩

等分

右以水煎服加減於後

若經候微少漸漸不通手足煩疼漸瘦生潮熱脉微數本方去地黃川芎加澤蘭葉三倍甘草五分 經候

過多本方去熟芩加生芩或只加黃芩白朮 經行身熱脉數頭昏本方加柴胡黃芩 經行數少或脹或

痛四肢疼痛加延胡沒藥白芷與本方等淡醋湯調下末子 經候不調心腹 痛只用芎歸二味名君臣

散 氣冲經脉故月事頻併臍下多痛加芍藥 經欲行臍腹絞痛加玄胡楨榔苦練炒木香減半 經水

澀少加葵花紅花 經水適來適斷或有往來寒熱先宜服小柴胡湯後以四物湯和之 經後過而作痛

血氣俱虛也宜本方對四君子湯服之

大溫經湯 和劑方 治衝任虛損月候不調或來多不已或過期不行或崩中去血過多或經損娠瘀血停留小

腹急痛五心煩熱

阿膠

碎炒

芍藥

當歸

去芦

人參

去芦

肉桂

去皮

甘草

炒

芍藥

牡丹皮

各二

半夏

二兩

吳茱萸

二兩

各湯

麥門冬

去心

五



右吹咀每服五錢水一盞姜五片煎七分空心熱服

南嶽魏夫人濟陰丹 和刺方 治婦人血海虛冷久無孕育及數墮胎一切經候不調崩中漏下積聚諸症

秦光 二兩 京墨 服醋汁 人參 二兩 石斛 去根酒 糯米 炒一 川芎 一兩 熟地黃 酒蒸

法皮 蒼朮 米泔浸去 香附 炒去毛 木香 炮一 藁本 去蘆 當歸 去蘆酒浸 肉桂 去粗皮 山

藥 七錢 澤蘭葉 四兩 川椒 去目炒 細辛 去苗葉 桔梗 炒二 桃仁 去皮炒 大豆黃卷 炒

甘草 炙二 蚕布 燒灰 牡丹皮 半兩 乾薑 炮一

右為末煉蜜為丸每兩作六丸每服一丸細嚼空心溫酒醋湯任下以醋糊為丸如梧桐子大亦可

交加地黃丸 治經水不調血塊氣痞肚腹疼痛

生半 一斤 老生薑 一斤 玄胡索 當歸 川芎 白芍 各二 沒藥 木香 各一 桃仁 去皮

人參 各一 香附子 半斤

右先將地黃生薑各搗汁以生薑汁浸地黃煮地黃汁浸生薑煮皆以汁盡為度次將餘藥為末共作一處

日乾同為末醋糊丸如梧桐子大空心服五十丸姜湯下

內炙散 和刺方 治婦人血氣虛損崩中漏下淋瀝不已或凝積血塊腰腹刺痛凡月水不調血暈頭眩皆治

藿香葉 丁香皮 熟地黃 洗焙 肉桂 去皮各 甘草炙 當歸 洗 白朮 山藥 白芷 各一

茴香 半兩 藁本 去蘆 乾姜 炮 川芎 黃芪 去苗各 木香 一兩 陳皮 去白 白芍藥 一兩

右為末每服三錢水一盞姜五片艾十葉同煎空心熱服溫酒調下亦可如產後下血過多加蒲黃煎惡露

不快加當歸紅花煎嘔吐加藿香生薑煎

活血散 柳藥院方 治衝任經虛經事不調不以多少前後並皆治之

當歸 川芎 白芍 玄胡索 各四 肉桂 去皮

右吹咀每四錢水一煎煎至七分食後溫服

溫經湯 大全良方 治婦人血海虛寒月水不利

當歸 川芎 芍藥 桂心 牡丹皮 莪朮 各半 人參 甘草 牛膝 各一兩

右以咀每服五錢水一盞半煎至八分溫服不拘時

醋煮香附丸

瘧疾方 治婦人經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭暈惡心崩漏帶下便血癥瘕並宜治之

大香附

砂金擦去以米泔醋浸半日用瓦跳慢火煮令醋盡漉出切薄片焙研為末

右用米醋煮糊丸如梧桐子大日乾每服五十九丸淡醋湯下一方香附子一斤艾葉四兩當歸二兩製如前

法治證一同名艾附丸

如聖丹 聖惠方 治婦人經脉不調赤白帶下

枯礬 四兩 蛇床子 二兩

右為末醋糊丸如彈子大用乾胭脂為衣綿裹放陰中用熱極再換

增損四物湯 宣明方 治月水不調心腹疼痛補血藏溫經注顏

川芎 芍藥 當歸 熟地黄 白朮 牡丹皮 各五錢 地骨皮 一兩

右以咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓適口服食前

丹參散 大全良方 治婦人經脉不調或前或後或多或少產前胎不安產後惡血不下並治之兼治冷熱勞腰

脊痛骨節煩疼

丹參 去芦不杓多少

右為末每服二錢酒調下經脉不調食前服冷熱勞不拘時

桃仁散 大全良方 治婦人月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水四肢虛弱不能飲食腹中堅痛不可行

動月水或前或後或月水不來舉體沉重惟欲眠多思酸物

桃仁 甘草 半夏 各一兩 赤芍藥 生地黄 各二兩 澤蘭 牛膝 當歸 桂心 牡丹皮 人參

蒲黃 川芎各一兩

右以咀每服五錢水二盞生姜三片煎至八分空心服

四製醋附子喘竹堂方 治婦人女子經候不調

香附子去毛一斤 作四分 一分好酒浸七日一分小便浸七日一分盞水浸七日一分米醋浸七日各各

右為末醋糊丸如梧桐子大每服七十丸空心食前盞酒送下肥人依方服瘦人加澤蘭葉赤茯苓各一兩

○廣按香附子血中之氣藥也婦人血用事今用香附子開鬱行氣蓋氣行而血亦行矣何病之不瘳哉

當歸地黃丸 治婦人血氣不和月事不勻腰腿疼痛

當歸 川芎 白芍藥 熟各半 牡丹皮 玄胡索各半 人參 黃芪各半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸食前米湯下

○廣按月信趙前為熱宜用涼藥以清熱退後為虛宜用溫藥以補虛已上諸方不及分而為二用者審之

○月經不通

王節齋曰婦人女子經脉不行多有脾胃損傷而致者不可便認作經閉血死輕用通經破血之藥遇有此症便須審其脾胃如何若因飲食勞倦損傷脾胃少食惡食泄瀉疼痛或因誤服汗下攻剋藥傷其中氣以致血少而不行者只宜補養脾胃用白朮為君茯苓芍藥為臣佐以黃芪甘草陳皮麥芽川芎當歸柴胡等藥脾旺則能生血而經自行矣又有飲食積滯致損脾胃者亦宜消積補脾若脾胃無病果有血塊凝結方宜行血通經

紅花當歸散 和劑方 治婦人血臟虛竭經候不調或斷續不來或積瘀塊腰腹刺痛肢體瘦弱

劉寄奴草 五兩 當歸 去各半 牛膝 酒浸各一兩 肉桂 去各半 紅花 白芷各半 甘草 酸各半 赤芍 一兩

紫葳即凌霄花 蘇木各二兩

右為末每服二錢空心熱酒調下如經閉濃煎紅花酒調下

通經丸 濟生方 治婦人室女經候不通臍腹疼痛或成血瘕

川椒 炒去 蓬朮 炒去 乾漆 炒去 當歸 去芦 青皮 去白 乾姜 炒 大黃 炒 桃仁 炒 紅花

桂心 各等分

右為末將一半用米醋熬成膏和餘藥一半成劑白中杵之丸如梧桐子大陰乾每服五十丸醋湯溫酒

心下

千金桃仁煎 簡易方 治婦人血積癥瘕月水不行等症

桃仁 去皮尖 朴硝 大黃 各二 蜚虫 半兩炒

右和勻以酸醋二升半於銀石器中慢火煎取一半却以桃仁大黃蜚虫末入內不住手攪度可圓時却下

朴硝更不住攪良久出丸如梧桐子大五更時溫酒下五丸至日午取下如赤豆汁雞肝蝦蟆等樣以盡度

六合湯 和濟方 治婦人經事不行腹中結塊腰腿重痛

當歸 白芍藥 官桂 去皮 熟地黃 酒洗 川芎 蓬朮 炮各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心服

凌花散 濟藥方 治婦人月水不行發熱腹脹

當歸 酒浸 凌雪花 劉寄奴 官桂 去皮 紅花 酒浸煎前藥一二沸即入 牡丹皮 酒洗 川白芷 赤芍藥

延胡索 各等分

右咬咀每服四錢水一盞酒半盞煎八分再入紅花煎熱服

玉燭散 張子和方 四物湯承氣湯朴硝各等分水煎食前服 四物湯見補損承氣湯見傷寒

三和湯 張子和方 四物湯涼膈散當歸各中停水煎服 涼膈散見溫熱

一方 治室女月經不通 紫葢 一兩 乾漆 炒二錢半 芍藥 蓬朮 當歸 稍各半

右為末每服二錢空心酒調下

一方 療月經不通腹中痛

牛膝 六錢

大黃

細辛

桃仁

去皮尖雙仁五錢炒

川芎

當歸

水蛭

三錢糯米炒

右為末糊蜜丸梧子大每服二十九空心酒下

五員

通經散

聖惠方

治室女月水不通 孫真人海上方以此立名

雄鼠屎一兩燒存性為末空心溫酒調下一錢神效

導經丸

聖惠方

治婦人經病不通臍腹連腰腿疼痛

當歸 川芎

白芍

甘草

炒

官桂

桃仁

炒一兩

大黃 二兩

血竭

二錢半

紅花

少許

地蟾

二十錢

右為末煉蜜丸如梧子大每服三十九空心溫酒下量虛實加減服之

溫經湯

大全良方

若經道不行達臍寒疝痛徹其脉沈緊此由寒氣客於血室血凝不行又為氣所衝新氣與

故血相搏所以作痛宜溫經湯及桂枝桃仁湯

當歸 川芎

芍藥

官桂

牡丹皮

蓬莪朮

各半兩

人參

甘草

牛膝

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去渣食前溫服

桂枝桃仁湯

大全良方

官桂

芍藥

生地黃

各二兩

甘草

一兩

桃仁

去皮尖五十斤

右咬咀每服一兩姜三片棗子七枚水二盞煎至一盞去滓溫服

當歸散

大全良方

治血脈不通

當歸

川山甲

灰焙

蒲黃

炒各五錢

辰砂

一錢

麝香

少許

右為末研勻每服三錢熱酒調下薄荷湯亦可

琥珀散

經驗方

治心膈迷悶腹脹撮痛氣急痞塞月信不通等疾



烏藥 二兩 當歸 蓬莪朮 各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下服後以食壓之大忌生冷油膩等物兼治產後諸疾用炒姜湯調下

萬病丸 拔萃方 治女人月經淋閉月候不來遠臍寒疝痛徹及產血氣不調腹中生瘕結而不散等疾

乾漆 料碎炒令烟盡須 牛膝 去苗酒浸一宿 焙乾各一兩

右為細末生地黄汁一升入二味用銀石器慢火熬候可丸如梧桐子大每服二丸空心米飲或溫酒下

通經散 楊氏方 治衝任不調經脉閉塞久而不通漸成堅瘦服尋常通經藥不效者正宜服之

班貓 去翅 足炒 蜜虫 水蛭 去翅 杜牛膝 半兩 當歸 紅花 錢各三 滑石 半錢

右為細末每服一錢用桃仁七粒研細末溫酒調下食前服

○廣按此方善能通經然月候不通有血滯者有血枯者此方用之於血滯者可矣若用之於血枯者是猶

求千金於乞丐也

瑞金散 大全良方 治婦人血氣損痛月經不行預先嘔吐疼痛

片姜黃 四兩 牡丹皮 蓬莪朮 紅花 當歸 赤芍藥 川芎 延胡索 官桂 各一兩半

右咬咀每服八錢水一盞酒三分煎至八分食前溫服

一方 治經候閉塞亦治乾血氣 班貓 糯米炒 桃仁 炒 大黃 錦紋者 半兩

右為細末酒糊丸如梧子大空心溫酒服五丸甚者十丸 如或血枯經閉者用四物湯送下

血竭膏 治乾血氣 用錦紋大黃酒浸乾四兩為末以好醋一升熬成膏戶如雞子大每服一丸熱酒化開

待溫臨卧服大便利一二經脈自下此方調經水之仙藥也

又方 加香附

千金散 治經不調

扁蓄 瞿麥 各四錢

檳榔 麥蘖 小茴香 各三錢

大黃 錦紋者 六錢

右為細末每服三錢臨卧溫酒調下

○經病疼痛

大烏金丸

治婦人三十六病思慮過度變生多疾孕育不成崩中帶下五心煩熱口苦咽乾飲食無味身瘦

羸瘦面目痿黃手足痠軟經水不勻肚腹脹痛髮黃落喜卧倦起產後惡血上行心腹刺痛敗血不止及

子宮一切惡疾

大艾葉

當歸 醋炒

破故紙 炒

茴香 炒

熟地黃 醋炒

南木香 火不見

吳茱萸

三棱

莪朮

兩

川芎 醋炒

芍藥 醋炒各

香附子 六兩

延胡索 一兩

紫荊皮 醋炒

三棱

莪朮

三錢

右先將艾二兩香附子六兩米醋一升浸一日一夜冬月三晝夜煮乾炒令黑色入後十二味同為末米醋

煮糯米糊為丸如梧桐子大每服七八十九空心鹽酒湯任下日二服如崩中下血不止加棕灰一兩棉灰

五錢蒲黃炒一兩百草霜七錢

玄胡索湯 濟生方

治婦人室女七情所感血氣相併心腹疼痛或連腰脇甚作搐搦但是一切血氣經候不調

皆治有效

當歸 去芦

蒲黃

玄胡索

赤芍藥

片子姜黃

官桂 各半兩

乳香

木香 各三錢

沒藥 三錢

右以咀每服四錢水一盞姜七片煎至七分食前溫服 吐逆加半夏橘紅各半兩

琥珀散 濟生方

治婦人室女月水凝滯腹脇脹痛及血逆攻心眩暈不省並皆治之

劉寄奴 去梗

牡丹皮 去木

熟地黃 酒浸

玄胡索 炒去

烏藥

赤芍藥

蓬莪朮

京三棱

當歸 酒浸

官桂 各一兩

一方有菊花蒲黃 炒各

一兩

烏藥

赤芍藥

蓬莪朮

京三棱

右前五味用烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入後五味同為末每服二錢空心溫

酒送下

三神丸 濟生方 治室女血氣相搏腹中刺痛經水不調

橘紅 二兩 玄胡索 醋煮 去皮 當歸 去芦 酒浸炒 各一兩

右為末酒煮米糊丸如梧桐子大每服一百丸空心米醋湯下

當歸煎丸 大全良方 治婦人久積血氣發作刺痛肌瘦乏力月候不調

當歸 三兩 另研末 檳榔 赤芍藥 牡丹皮 玄胡索 各一兩

右同當歸末米醋熬膏入藥丸如梧桐子大每服二十九溫酒下

姜黃散 大全良方 治血臟久冷月水不調臍腹刺痛

片姜黃 四兩 蓬莪朮 紅花 官桂 川芎 各一兩 玄胡索 牡丹皮 當歸 各二兩

右以每服一兩水二盞酒少許煎至一盞去滓適口服食前

蠲痛散 大全良方 治婦人血氣刺痛

荔枝核 燒存性 五錢 香附子 炒一兩

右為末米飲調二錢食前服鹽湯亦可

牡丹散 拔萃方 治婦人月水不利臍腹疼痛不欲飲食

牡丹皮 川大黃 炒各一兩 赤茯苓 生地黃 桃仁 當歸 官桂 赤芍藥 白朮 石韋 去皮

木香 各半兩

右以咀每服一兩水二盞生姜三片煎至一盞去滓食前適口服

牛膝散 拔萃方 治婦人月水不利臍腹疼痛

牛膝 一兩 官桂 赤芍藥 桃仁 玄胡索 當歸 牡丹皮 川芎 木香 各半兩

右為細末每服三錢溫酒調下食前服

替灸丸 秘方 治婦人久淋赤白帶下肚腹疼痛經脈不通面色痿黃手脚疼痛四肢無力久無子息此藥常服



溫中暖臍調經有子服藥未盡即時有效

茯苓 艾葉各八

香附子 當歸 各四

吳茱萸 炒三兩

川芎

白芍藥 各二兩

右用酸醋五升沙鍋煮藥乾為末醋糊丸如梧桐子大每服五十九空心午前日二服用淡醋湯送下

大延胡索散

宣明方

治婦人經病疼痛并產後腹痛或腹滿喘悶或癰瘕癖塊及一切心腹暴痛平心胃急痛

尤宜服之

玄胡索

當歸

赤芍藥

京三稜

川練子 去核

蓬朮

官桂 去朴

厚朴

木香

川芎

五苓錢

枳梗

黃芩

大黃 各五錢

甘草 一兩

煨榔 二錢

右為末每服三錢

水一盞煎六分去滓熱服食前熱服每日三服如惡物多去大黃官桂加黃藥子染塊子

龍骨各五錢

延胡索散

大全良方

治婦人血氣攻心腹疼痛

延胡索

當歸

川芎

官桂 各半

木香

枳殼

赤芍

桃仁 各五錢

熟地黃 一兩

右以咀每服八錢水一盞生姜三片煎至八分去滓適口食前服

當歸散

大全良方

治婦人久積血氣疔痛小便刺痛四肢無力不能食

當歸

酒浸

赤芍藥

劉寄奴

沒藥

枳壳

玄胡索

右等分為末熟酒二錢不拘時服

失笑散

和劑方

治小腸氣痛婦人血氣痛欲死者

五靈脂

蒲黃

各等分

右為末每服二錢用醋一合熬藥成膏入水一盞煎七分熱服

異方濟陰丹

秘方

治婦人內有血積經水不調腰腹疼痛

香附子

三稜

莪朮

陳皮 去白

青皮

敗姜 各一兩

右用黑豆半升醋五升同煮豆爛取出焙乾留餘醋打糊

官桂 當歸 赤芍 白芍 生地黄 熟地黄 澤瀉 片姜黃 牡丹皮 乾姜 川芎 劉寄奴

澤蘭 人參 蒲黃 炒 木香 白朮 玄胡索

右各一兩焙乾與前藥為末醋糊丸如梧桐子大每服五十九粒炒姜酒下又醋湯亦可空心食前服經水不行酒下心脾疼姜湯下或酒下

經病發熱

逍遙散 和劑方 治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛痰嗽潮熱

甘草 炙半 當歸 炒去芦 茯苓 去皮 芍藥 白朮 柴胡 去苗各

右咬咀每服五錢水一盞煨姜一塊薄荷少許煎至七分溫服

人參 荊芥散 和劑方 治婦人血風發熱身體疼痛頭昏目眩煩渴盜汗或月水不調臍腹疼痛瘰癧癰等症

赤芍藥 五兩 柴胡 去苗七 牡丹皮 五兩 荊芥穗 鱉甲 醋炙去 羚羊角 酸棗仁 枳殼 炒去核

生地黃乾 人參 去芦 白朮 肉桂 去皮各 防風 去芦 當歸 川芎 甘草

右咬咀每服四錢水一盞煎六分不拘時溫服

油煎散 和劑方 治婦人血風發熱喘滿多汗口乾舌澀

五加皮 牡丹皮 赤芍藥 當歸 去芦各

右為末每服一錢水一盞將青銅錢一文蘸油入前藥同煎七分煎不得攪喫不得吹常服此藥能肥婦人

滋血湯 和劑方 治婦人血熱氣虛經候不調血聚四肢或為浮腫肌體發熱疑為勞瘵宜以此藥滋養通利

馬鞭草 四兩 荊芥穗 四兩 牡丹皮 一兩 赤芍藥 枳殼 炒去白 肉桂 去皮 當歸 炒去芦 川芎 各二兩

右咬咀每服四錢水一盞烏梅一個煎服以經調為度

牡丹散 和劑方 治血氣虛損內則月水不行外發潮熱肌體羸困漸成骨蒸並宜服之



桂心 丹皮 芍藥 延胡索炒 沒藥另研 陳皮去白 各 蓮莖 朮 鬼箭各半 紅花 當歸各半

各二 乾漆炒半 蘇木炙錢半 甘草 烏藥各一

右咬咀每服三錢水一盞煎七分不拘時服

加味四物湯 治衝任虛損月水不行肌膚發熱如瘰癧狀

當歸 地黃 芍藥 川芎各一 柴胡半兩 黃芩二錢半

右咬咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服

茯苓補心湯治婦人去血過多虛勞發熱

四物湯一兩半參蘇飲三兩和勻生薑五片煎八分溫服 四物湯見前

參蘇飲見胃案

麥前散聖惠方 治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢心胸煩壅

驚甲醋炙 犬黃碾 常山 赤茯苓 柴胡 白芍 當歸 乾漆炒烟 生地黃 石膏各等

甘草半兩

右咬咀每服一兩水一鍾小麥五十粒煎至半鍾去滓溫服食前有汗加麻黃根一兩治骨蒸熱黃瘦口臭

肌熱盜汗

黃芪散大全良方 治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心燥口乾不欲飲食

人參 黃芩 當歸各七錢半 柴胡一兩 黃芪 地骨皮 赤茯苓 麥門冬 生地黃 赤芍藥各一

甘草二錢

右咬咀每服一兩水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

麥門冬散大全良方 治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不下

麥門冬 前胡 赤茯苓各一 羚羊角 赤芍 桑白皮 黃芪各七錢半 生地黃 甘草各五錢

右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎一鍾適口服

足本丹溪心法附餘

卷二十 婦人門

七 范江海左書局印行



犀角散 拔萃方 治婦人客熱四肢煩悶疼痛飲食不下

犀角屑 赤芍 地骨皮 紅花 甘草 錢各五 柴胡 黃芪 兩各半 麥門冬 人參 枳壳 桑葉苓

錢各七

右以咀每服五錢水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓通口服不拘時候 一方有生地黃七錢半

地骨皮散 大全良方 治婦人血風氣體虛發口渴發寒熱

柴胡 地骨皮 兩各一 桑白皮 枳壳 前胡 黃芪 錢各七 雲茯苓 五加皮 人參 甘草 官桂

白芍藥 各五錢

右以咀每服一兩水二鍾生薑三片煎至一鍾通口服

柴胡散 大全良方 治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

北柴胡 黃芪 赤茯苓 白朮 兩各一 人參 地骨皮 枳壳 梨 生地黃 桔梗 桑白皮

赤芍藥 錢各七 鱉甲 醋炙 二兩 麥門冬 三兩 甘草

右以咀每服一兩水二鍾生薑三片煎至七分溫服

小柴胡湯 大全良方 治婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結故如瘧狀

柴胡 八錢 半夏 二錢 人參 甘草 黃芪 生地黃 各三錢 麥門冬 二錢

右以咀每服八錢水半鍾生薑五片棗二枚煎至八分去滓溫服

柴胡飲子 宣明方 治一切骨蒸積熱口乾煩燥寒熱往來肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病

柴胡 人參 黃芪 甘草 當歸 芍藥 大黃 錢各一 喘嗽者加半夏桔梗五味子 各五

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓溫服食後

柴胡四物湯 治婦人日久虛勞微有寒熱脉沈而芤
川芎 熟地黃 當歸 芍藥 兩各半 柴胡 八錢 人參 黃芪 甘草 半夏 麴 各三錢

右每服一兩水一盞半生姜三片煎八分溫服

○廣按婦人經病有月候不調者有月候不通者然不調之中有兼疼痛者有兼發熱者此分而為四然四者之中若細推之不調之中有趨前者有退後者則趨前為熱退後為虛也不通之中有血滯者有血枯者則血滯者宜破血枯者宜補也疼痛之中有常時作痛者有經前經後作痛者則常時與經前作痛為血積經後為血虛也發熱之中有常時發熱者有經行發熱者則常時為血虛有積經行為血虛有熱也此又分而為八焉大抵婦人經病內因憂思忿怒外因飲冷形寒何則人之氣血周流忽因憂思忿怒所觸則鬱積不行人之經前產後忽遇飲冷形寒則惡露不盡此經候不通作痛發熱之所由也調其氣而破其血開其鬱而補其虛涼其血而清其熱則治之有道也歟抑嘗論之氣行血行氣止血止故治血病以行氣為先香附之類是也熱則流通寒則凝結故治血病以熱藥為佐肉桂之類是也

崩漏九十三

丹溪心法

○血崩東垣有治法但不言熱其主在寒學者宜尋思之急則治其標用白芷湯調百草霜末甚者用棕桐灰後再用四物湯加炒乾姜調理因勞者用參芪帶升補藥因寒者用乾姜因熱者用黃芩崩過多者先用五靈脂末一服當分寒熱蓋五靈脂能行能止紫色成塊者熱也以四物湯加黃連之類婦人血崩用香附白芷丸氣虛血虛者皆以四物湯加參芪漏下乃熱而虛四物湯加黃連崩中白帶用椒目末又用白芷石灰炒去灰為末蕎草少許粥丸服一方用生狗頭骨燒灰存性或酒調服或入藥服一方五靈脂半生半炒為末酒調服經血逆行或血腥或吐血或垂血用韭汁服之夫婦人崩中者由臟腑傷損衝任二脉血氣俱虛故也二脉為經脉之海血氣之行外循經絡內榮臟腑若氣血調適經下依時若勞傷極藏肺俱傷衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中暴下治宜用大補氣血之藥養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣

附諸方

膠艾湯 和劑方 治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝不已及妊娠調攝失宜胎氣不安或因損動漏血傷胎

並宜服之

阿膠 炒

川芎

甘草 炙各一兩

艾葉 炒二兩

熟乾地黄

白芍 各四兩

當歸 去芦炒二兩

右咬咀每服三錢水一盞酒半鍾煎至八分空心熱服

伏龍肝散 和劑方

治氣血勞傷衝任脉虛經血非時注下或如豆汁或成血片或五色相雜臍腹冷痛經久不止

川芎 三兩

肉桂 去皮五錢

當歸 去芦炒

乾姜 炮七錢

赤石脂 一兩

艾葉 炒三兩

熟地黄

甘草 炙半兩

麥門冬 一兩

伏龍肝 炒心土

右咬咀每服四錢水一鍾棗二枚煎七分食前溫服

神仙聚寶丹 和劑方

治婦人血海虛寒外乘風冷搏結不散積聚成塊血氣攻注腹脇疼痛及經候不調崩中

帶下並宜服之

沒藥

琥珀 各一兩

辰砂 一錢

木香 煨末一錢

乳香 錢半

當歸 洗焙取末一兩

射香 另研一兩

右研細合勻滴水為丸每一兩作十五丸每服一丸溫酒送下如一切難產及產後敗血冲心惡露未盡並

入童子小便

艾煎丸 治崩後淋瀝不已小腹滿痛常服益榮調經

吳茱萸 湯洗

當歸 錢半

熟地黄

白芍 各半兩

石菖蒲 炒

川芎

人參

熟艾 調作餅

米飲

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十丸酒飲任下

鎮宮丸 濟生方

治婦人崩漏不止或下五色或如豆汁或狀若豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈目眩

代赭石

紫石英 煨醋

禹餘糧 七次

川芎

陽起石 研炒紅

鹿茸 醋蒸焙

蒲黃 炒

香附子 炙醋

當歸 去芦酒浸各一兩