


圖書集成醫部全錄

第五十二冊

小兒吐瀉
心腹疼痛
腫脹
食癖
二便



博物彙編藝術典第四百五十四卷目錄

醫部彙考四百三十四

小兒吐瀉門一

錢乙小兒直訣 吐瀉兼變證治

劉完素六書 瀉痢

張從政儒門事親 身熱吐瀉 水瀉 久瀉不止

朱震亨幼科全書 嘔吐 西江月 泄瀉 清江引 西江月 吐瀉 西禁忌 吐

魯伯嗣學嬰童百問 嘔噎吐乳證 熱吐 寒冷嘔吐噎逆 霍亂吐瀉 冷瀉 熱瀉 傷食瀉

薛氏保嬰撮要 霍亂吐瀉

徐春甫古今醫統 嘔吐 瀉泄 霍亂吐瀉

博物彙編藝術典第四百五十五卷目錄

醫部彙考四百三十五

小兒吐瀉門二

王肯堂證治準繩 吐瀉 夏秋治裏 冬春治表 身熱瀉黃多瀉為熱宜涼劑 肢冷瀉青不瀉

寒吐 熱吐 瀉 毒氣吐 傷乳吐 冷瀉 熱瀉 傷食瀉 驚瀉 暴瀉 久瀉 殞瀉

小兒衛生總微論方

陳治幼幼近編 吐瀉

博物彙編藝術典第四百五十六卷目錄

醫部彙考四百三十六

小兒吐瀉門三

方 白水圓 藿香湯 五味異功散 益黃散 人參安胃散 七味白朮散 四君子湯 四神湯 八珍湯 十全大補湯 六君子湯 補中益氣湯 香砂助胃膏 人參養胃湯

博物彙編藝術典第四百五十七卷目錄

醫部彙考四百三十七

小兒吐瀉門四

單方

鍼灸

醫案

博物彙編藝術典第四百五十八卷目錄

醫部彙考四百三十八

小兒一便門

張從政儒門事親

大小便不通

海 軍

魯伯嗣學嬰童百

問並大
痔小

便不通
證五

大便不通

小便不通

遺尿

尿白濁

便血臟毒

脫疰

王綸明醫雜著

大小便白

徐春甫古今醫統

遺尿

薛氏保嬰撮要

遺尿

王肯堂證治準繩

大小便不通

大便不通

小便不通

遺尿

尿白便濁

淋

小兒衛生總微論方

地膚子湯

大承氣湯

脫甲散

輕號散

大連龜湯

神芎丸

掩勝法

方地胡湯

分消飲

金砂散

立效散

破故紙散

木通湯

益智散

八正散

單方

柴胡湯

大承氣湯

輕號散

大連龜湯

神芎丸

掩勝法

四順清涼飲

柴胡散

大

鍼灸

醫案

博物彙編藝術典第四百五十九卷目錄

醫部彙考四百三十九

小兒心腹痛門

錢乙小兒直訣

腹痛 蟲痛

萬氏幼科發揮

腸痛

魯伯嗣學嬰童百問

腹痛

盤腸氣痛

蛇蟲痛

薛氏保嬰撮要

盤腸氣痛

王肯堂證治準繩

腹痛

寒痛

外治

熱痛

積痛

蟲痛

鎖肚痛

盤腸釣痛

癰疽痛

疔瘡

徐春甫古今醫統

腹痛

方湯氣丸

消積丸

益黃散

當歸散

沉香降氣湯

釣藤散

保命丸

養脾丸

四順清涼飲

七氣湯

桂枝

指

芍藥湯

大承氣湯

調中丸

扶苓丸

湯氏三稜散

檳榔散

張漢寬中湯

達其木丹

溫胃丹

二聖丸

橋

烏梅散

會氏荷香湯

魏香散

蒜乳丸

聖惠人參散

錢氏和中散

錢氏靈鑒散

芍藥散

金鈴散

安息香丸

黑龍丸

平胃散

單方

單方

安息香丸

魏香散

蒜乳丸

聖惠人參散

錢氏和中散

錢氏靈鑒散

芍藥散

金鈴散

安息香丸

黑龍丸

平胃散

單方

單方

醫案

博物彙編藝術典第四百六十卷目錄
醫部彙考四百四十

小兒腫脹門

錢乙小兒直訣 腹脹

張從政儒門事親 小兒風水 通身浮腫

魯伯嗣學嬰童百問 虛實腫脹

樓英醫學綱目 腫病

徐春甫古今醫統 濕證候 水腫不治證

小兒衛生總微論方 治法 薛氏治法 水腫

陳治幼幼近編 腹脹

方壘氣丸 加減腎氣丸 五苓散 升陽益血湯 厚腸丸 下積丸 五珍丸 紫霜丸 分氣飲 白餅子 五疳保童丸 楊

氏壘氣散 大承氣湯 三脾丸 真珠天麻丸 大柴連丸 下蟲丸 沉香煎 五疳保童丸 楊

又丹 河黎勒丸 張氏補脾散 本事調中丸 麻黃升麻湯 三因肥兒丸 下蟲丸 沉香煎 五疳保童丸 楊

氣飲 三白散 商陸丸 中滿分消丸 消痞丸 中丸 麻黃升麻湯 三因肥兒丸 下蟲丸 沉香煎 五疳保童丸 楊

單方 補脾飲 壘氣丸 參苓散 除濕湯 分氣飲 子南星腹皮散 香陸退腫散 氣方

鍼灸

醫案

博物彙編藝術典第四百六十一卷目錄

醫部彙考四百四十一

小兒食癖門一

錢乙小兒直訣 癖

張從政儒門事親

朱震享平治會萃 食積

魯伯嗣學嬰童百問 腹中有癖 痞結 積痛 積滯 食積冷熱 胃氣不和虛冷

陶華六書 傷食

薛氏保嬰撮要 不乳食

龔信古今醫鑑 瘵疾論

徐春甫古今醫統 積滯

王肯堂證治準繩 脾 脾弱多困 宿食 食積寒熱 食積癰 積病可醫者九 不可醫者六

小兒衛生總微論方 食氣 積滯 食積 脾中積 驚積 虛中積 實積 瘵瘵 痞結

方一 雙紫圓 充悅圓 牛黃圓 芒硝紫圓 八歲湯 十五歲湯 牛黃雙圓 牛黃龍甲圓

通栗圓 肥兒丸 清中解鬱湯 丁香化癖散 驚頭圓 甘草圓 桂心橘皮湯 地黃圓 雄黃解毒丸 聖

養脾丸 肥兒丸 清中解鬱湯 丁香化癖散 驚頭圓 甘草圓 桂心橘皮湯 地黃圓 雄黃解毒丸 聖

惠甘遂破結散 進食丸 消積丸 是齋推氣丸 白木散 小沉香丸 芍藥甘草湯 觀音散 香後丸

銀白散 木香檳榔丸 神芎丸 是齋推氣丸 白木散 小沉香丸 芍藥甘草湯 觀音散 香後丸

五珍丸 木香檳榔丸 神芎丸 是齋推氣丸 白木散 小沉香丸 芍藥甘草湯 觀音散 香後丸

博物彙編藝術典第四百六十二卷目錄

醫部彙考四百四十二

小兒食癖門二

方二 理中清熱湯 人參安胃散 益黃散 錢氏瀉黃散 平胃散 醒脾湯 調中丸 人參散 藿香

寶童散 神木散 聖惠前胡散 健脾飲 香煎三稜散 我水丸 益胃丹 丁香脾積丸 三黃枳木丸

保和丸 梨勒散 朱氏木香丸 七聖丸 沈心散 養珠丸 消堅丸 聖惠三稜散 張漢萬靈丹 五色丸 聖惠

化聖丸 烏犀丸 水晶丹 萬靈丸 聚寶聖餅子 孔氏方 眞珠丸 沈香檳榔丸 集驗蓬丸 聖惠

石九 玉散 張氏方 董良方 妙香孔氏方 眞珠丸 沈香檳榔丸 集驗蓬丸 聖惠

圖書集成醫部全錄 第五十二冊目錄 彙考四百四十一至四百四十二 三

中九 快膈湯 參朮陷胃湯 惠前胡丸 四季肥兒丸 猪肚補脾丸 七味保嬰湯 八反膏 枳實理

氏化癰丸 快膈湯 參朮陷胃湯 惠前胡丸 四季肥兒丸 猪肚補脾丸 七味保嬰湯 八反膏 枳實理

氏化癰丸 快膈湯 參朮陷胃湯 惠前胡丸 四季肥兒丸 猪肚補脾丸 七味保嬰湯 八反膏 枳實理

氏化癰丸 快膈湯 參朮陷胃湯 惠前胡丸 四季肥兒丸 猪肚補脾丸 七味保嬰湯 八反膏 枳實理

氏化癰丸 快膈湯 參朮陷胃湯 惠前胡丸 四季肥兒丸 猪肚補脾丸 七味保嬰湯 八反膏 枳實理

氏化癰丸 快膈湯 參朮陷胃湯 惠前胡丸 四季肥兒丸 猪肚補脾丸 七味保嬰湯 八反膏 枳實理

氏化癰丸 快膈湯 參朮陷胃湯 惠前胡丸 四季肥兒丸 猪肚補脾丸 七味保嬰湯 八反膏 枳實理

氏化癰丸 快膈湯 參朮陷胃湯 惠前胡丸 四季肥兒丸 猪肚補脾丸 七味保嬰湯 八反膏 枳實理

氏化癰丸 快膈湯 參朮陷胃湯 惠前胡丸 四季肥兒丸 猪肚補脾丸 七味保嬰湯 八反膏 枳實理

氏化癰丸 快膈湯 參朮陷胃湯 惠前胡丸 四季肥兒丸 猪肚補脾丸 七味保嬰湯 八反膏 枳實理

氏化癰丸 快膈湯 參朮陷胃湯 惠前胡丸 四季肥兒丸 猪肚補脾丸 七味保嬰湯 八反膏 枳實理

氏化癰丸 快膈湯 參朮陷胃湯 惠前胡丸 四季肥兒丸 猪肚補脾丸 七味保嬰湯 八反膏 枳實理

單方
鍼灸
醫案

此方治一切瘡毒，無論新久，服之即愈。其法：取黃連一斤，洗淨，切細，入酒中浸一宿，次日入水煎，取汁，入蜜，再煎，至稠，服之。此方治一切瘡毒，無論新久，服之即愈。其法：取黃連一斤，洗淨，切細，入酒中浸一宿，次日入水煎，取汁，入蜜，再煎，至稠，服之。

此方治一切瘡毒，無論新久，服之即愈。其法：取黃連一斤，洗淨，切細，入酒中浸一宿，次日入水煎，取汁，入蜜，再煎，至稠，服之。

此方治一切瘡毒，無論新久，服之即愈。其法：取黃連一斤，洗淨，切細，入酒中浸一宿，次日入水煎，取汁，入蜜，再煎，至稠，服之。此方治一切瘡毒，無論新久，服之即愈。其法：取黃連一斤，洗淨，切細，入酒中浸一宿，次日入水煎，取汁，入蜜，再煎，至稠，服之。

此方治一切瘡毒，無論新久，服之即愈。其法：取黃連一斤，洗淨，切細，入酒中浸一宿，次日入水煎，取汁，入蜜，再煎，至稠，服之。此方治一切瘡毒，無論新久，服之即愈。其法：取黃連一斤，洗淨，切細，入酒中浸一宿，次日入水煎，取汁，入蜜，再煎，至稠，服之。

小兒吐瀉門一

宋錢乙小兒直訣

吐瀉兼變證治

五月二十五日以後吐瀉壯熱此臟腑中九分熱也傷熱乳食吐而不消瀉色深黃玉露散主之

六月十五日以後吐瀉身溫臟腑六分冷也嘔吐乳食不消瀉色黃白口乾作渴者食前少服益黃散食後多服玉露散

七月七日以後吐瀉身涼三分熱七分冷也不乳多睡悶亂哽氣出氣睡臥露睛唇白多噦亦用益黃玉露二散主之

八月十五日以後吐瀉身涼不乳乾噦瀉青褐水無陽也當用益黃散吐瀉乳食不化時時下痢肌肉消瘦此脾胃虛寒也用木香丸夏月不可服如有冷證則少服之其身溫壯熱或瀉痢紅黃赤黑此脾胃實熱也用黃連丸冬月不可服如有熱證則少服之

註按前法即內經用寒遠寒用熱遠熱之本旨又云有假者反之雖違其時以從其證蓋胃傷則嘔吐

脾傷則泄瀉脾胃俱傷則吐瀉並作前證若傷辛熱停滯嘔吐或大便下痢者用六君子加黃連吳茱

萸木香若停滯已去泄瀉不已用四君子加肉蔻骨脂若傷生冷腹痛瀉痢青白用六君子加砂仁木

香炮薑若傷魚肉等物用六君子加山楂砂仁若瀉紅黃赤黑諸臟皆熱也先用香連丸後用補中益

氣湯送香連丸若瀉痢青白乳食不化者用人參理中丸若吐瀉昏睡而露睛者用五味異功散睡而

不露睛者用玉露散若吐而手足俱熱或喜冷飲食或睡不露睛者用瀉黃散或手足冷或惡冷飲食

或睡而露睛者用六君子木香然木香黃連二丸雖能攻尅病邪不無傷損脾胃治者審之

若吐乳瀉黃傷熱乳也吐乳瀉青傷冷乳也皆當下之吐瀉昏倦睡不露睛者胃實熱也吐痰涎及綠水

者胃虛冷也

註按前證若兒自受驚或乳母恚怒致兒吐瀉青色者宜用異功散加柴胡若母食厚味而乳熱者用東垣清胃散母飲酒而乳熱者用葛花解酲湯子服一二匙若飲燒酒而乳熱或子母身赤或昏憤服冷米醋三五杯多亦無妨兒服一二匙若母停滯生冷而乳冷者母服養胃湯子服調中丸若母停滯而變熱乳者母服大安丸子服五味異功散若母鬱怒傷肝脾而乳熱者用歸脾湯逍遙散若母脾虛血弱而乳熱者用六君子加芎歸若母氣血虛而乳熱者子母俱服八珍散若母勞役發熱而乳熱者子母俱服補中益氣湯若因母怒動肝火而乳熱者用五味異功散加柴胡山梔其吐痰涎及白綠水者肝木乘脾土之虛寒證也用六君子加柴胡木香大凡吐乳瀉青色者屬驚法當平肝補脾吐瀉青白色者屬寒法當溫補脾土前諸證若手足指熱者屬實手足指冷者屬虛此亦驗法也

初生十日內吐瀉壯熱不乳或乳不消或白色先用白餅子下之後用益黃散和之

初生下吐因穢惡下咽故也用水瓜散主之凡初生急須拭淨口中否則啼聲一發穢物嚥下致生諸病

註按芽兒初生之患多因乳母不慎七情不節厚味傳兒爲病當審其因以調治其母前所用之藥恐臟腑脆嫩不能勝受治者審之

金劉完素六書

瀉痢

五臟皆言熱證無寒冷證亦有謂瀉痢小便青白不澀爲寒水穀不化而色不變吐痢腥穢澄澈清冷青白不澀身涼不渴脈遲細而微者寒證也

穀雖不化而色變非白煩渴小便黃赤而澀者爲熱證世傳小兒吐痢霍亂食乳未及消化而痢尚白便論爲寒證誤矣仲景云熱邪不化穀豈爲寒也

元張從政儒門事親

身熱吐瀉

凡小兒身熱吐瀉腹滿不進飲食可急與牛黃通膈丸下過四五行則自愈矣蓋乳食便屬水甚則成濕

凡小兒水瀉不止可用五苓散與益元散各停用新水調下三二錢頻服不拘時候若暴瀉注下甚者屬火涼膈通聖等散治之用者勿輕非深於造化者未易此語

水瀉

小兒暴注水瀉不止內經曰此名暴瀉注瀉久而不愈者爲涌泄注下此乃火運太過之病也火性暴速故也急宜用新汲水調下甘露飲子五苓散天水散或用井花水煎此藥放冷服之病卽瘥矣不可用御米殼乾薑豆豉聖散子之類縱然瀉止腸胃氣滯不通變爲腹脹此法宜分陰陽利水道乃爲治法之妙也

久瀉不止

凡小兒久瀉不止至八九月間變爲秋深冷痢泄瀉青白時時撮痛乳瓣不化可用養脾丸如黍米大每服二三十丸米飲送下日進三服則愈益黃散亦可用之

凡治小兒之法不可用極寒極熱之藥及峻補峻瀉之劑或誤用巴豆杏仁硫黃膩粉之藥若用此藥反生他病小兒易虛易實腸胃嫩弱不勝其毒若治之宜用分陰陽利水道最爲急用桂苓甘露散之類朱震亨幼科全書

嘔吐

有物無聲曰吐有聲無物曰嘔有聲有物曰嘔吐其證有三有寒有熱有食積傷

凡寒吐者吐時少而出物多此胃家受寒也或用胃苓丸煨薑湯吞或以理中丸治之寒吐食不化不惡食

凡熱吐者吐時多而出物少此胃家有熱也以二陳湯加黃連煨乾薑治之熱吐食化不惡食

凡食積吐者要分三焦明白俱能食如食時卽吐者此積在上焦胃口也宜用淡鹽湯吞下後用鵝翎毛掃口中令其吐盡舊積以二陳湯加煨乾薑神麴炒麥芽炒杏仁治之

如食下一二時而吐者此積在中焦胃下口過小腸上口處也先以丁香脾積丸通去舊積後以二陳湯加消導藥治之

如早食晚吐晚食早吐者此食在下焦小腸口下過大腸口上處也先以丁香脾積丸下之後以二陳湯加消導藥治之消導藥如神麴麥芽砂仁香附之類如嘔吐久而諸藥不納者此胃口伏火關格之病用理中湯加童便猪膽汁全炒煎服即止神效妙不可言

如嘔吐由蛔蟲者以理中湯加烏梅一箇附子一小片黃蘗川椒一服即止

如嘔吐後而瘦弱者只以集聖丸調之

如諸吐不納藥者此陰盛拒陽也必加童便猪膽者蓋童便味酸鹹性寒膽汁味苦性寒以和理中湯服則陰體漸消陽性乃發此內經所云伏其所主先其所因也非吾子孫不示

凡吐不止目上眦頭後仰者不治

西江月

嘔吐飲食不納任從湯藥難嘗此爲陰盛隔孤陽到是時醫魔障參朮煨薑熟附烏梅童便尤良猪膽全入慢精詳此法應如影響

一等虵蟲吐出此爲虵厥多陰烏梅丸子效如神一服虵安吐定又有咳而嘔者化痰順氣須明如常吐嘔只胃苓湯用煨薑作引

泄瀉

凡泄瀉皆屬濕其證有五治法以分利升提爲主不可一例混施如泄瀉青白或乳食不化腸痛四肢冷面晃白不作渴者此寒濕也其證多得於冬以五苓散作引吞化理中丸即止如寒甚不止者理中湯加附子一片即效

如泄瀉黃稠腹痛作熱面紅口渴此熱濕也其證多得於夏以五苓散加滑石甘草木通治之甚者以玉露散理中湯即效

如泄瀉不住成黃水者或渴或不渴此風濕也其證多得於夏以五苓散加防風蒼朮羌活治之

吞下七味肉苁蓉丸亦效

如泄瀉酸臭腹痛面黃帶熱不喜飲食者此食積也先以丁香脾積丸推去其積後以集聖丸調之

如泄瀉久作渴不止者只以白朮散多煎服之未有不效者

如泄瀉久目無神口略張四肢冷好睡以四君子湯調之多服有效甚者加熟附子一小片煨乾薑服之

如泄瀉久身熱不退者只以調元湯治之此虛熱也不可妄用寒涼之藥甚者加煨乾薑即效

凡泄瀉後人事黃弱者只用集聖散服之

祖傳治泄瀉不問寒熱只用胃苓丸兼一粒金丹以車前子全炒米湯治之

凡治久泄不止精神美好面赤脣紅者不治變成白痢者不治脈沉細遍身皮冷不乳食作渴不止者不治又成驚搐者不治大孔如竹筒不收閉者不治滑泄不止者不治大肉消瘦者不治

凡治泄瀉不問輕重只要乳食如常不生他證者則易愈

清江引

泄瀉五虛真莫測六脈細欲絕腸滑魄戶開脾寒大皮折禁口飲食不下咽少氣醫得此疾真妙手參芪木羌附甘草石菖蒲訶皮鴛子粟若還見效都無妨蚘蚘補假如服藥全無效金液神丹妙附子與硫黃法製家傳奧起死回生滅些兒堪救療

西江月

夏月人多泄瀉腹痛煩渴相攻猪苓澤瀉茯苓全甘草乾薑多用白朮黃連滑石人參砂藿溫中升麻提氣妙無窮更把烏梅煎送

夏月雨多傷濕宜利小便爲先猪苓澤瀉與黃連梔子茵陳解散羌活青皮枳實茯苓赤者相參木瓜蒼

白朮同煎黃蘗加些靈驗

泄瀉祕傳治法等閒不語時人如今傳授與兒孫勝似良田萬頃初次且行淡滲溫中以次施行三升四

塞救孩嬰此法古今永定

泄瀉緣何發作只因水穀無分所以淡滲法先行小便長而泄定滑石車前赤茯苓人參白朮猪苓甘草澤

瀉與砂仁薑棗煎時作引

淡滲行而還泄須防穀氣中虛溫中丸散不須拘但要一時泄住白朮人參砂朮薑炙草依書烏梅熟附澤苓猪引用棗薑作主

溫中若猶不效中氣下陷須提人參白朮與黃芪甘草乾薑炙取澤瀉猪苓赤茯苓升麻熟附烏梅柴胡白芍與當歸薑棗引兒休棄

以次升提未止此時腸滑難收塞因通用更何憂擊其情歸可救參朮炙薑炙草烏梅栗殼相扶升麻訶子芍歸求薑棗同煎溫服

法盡泄還仍舊其間吉少凶多假饒父母沒奈何要爾醫人休錯參朮扶陳薑草砂仁芫薹粟訶乾蟾蘆蒼木香和赤石酢丸調可

泄瀉時常作渴白朮散子如仙人參白朮木香兼乾薑藿香葉片甘草茯苓七味烏梅加上同煎臨時更帶伏龍肝此法千金不換

泄瀉如常法治不須別用心機只將丸藥胃苓醫三服自然停息如此不能取效依前數法支持吾將心法教人知纔顯明醫三世

五六月間泄瀉其間寒少熱多理中丸子救沉疴玉露散調服可不效四苓作引用吞理中調和自然泄止不蹉跎活得多人念我

吐瀉

吐瀉之證有三有寒有熱有積治法略與泄門相似觀者詳之

凡吐瀉兩腮紅足脛熱好飲水身上熱此熱證也治法以胃苓丸一粒金丹全車前草燈心湯送下

凡吐瀉面晃白足脛冷不作渴如有熱者此寒證也治法先以理中湯即止不止便以益黃散治之或胃苓丸肉荳蔻丸治之

凡吐瀉惡食或不乳心腹痛吐瀉所出之物皆酸臭此食積也先去食積以感應丸推之後以胃苓丸調

凡吐瀉日久漸漸瘦弱作渴作熱久不治必成壞證用加減補中湯治之

西江月

大凡男女吐瀉陰陽順逆當明男逢泄盛下無陰女子吐多不應出物多而數少此爲寒食相侵如逢物少數頻頻火盛細加體認

吐瀉若然同見此名霍亂陰陽只消一貼理中湯上吐下瀉了當服藥若還不效再加熟附煨薑烏梅作引是良方莫與俗人誇獎

吐瀉時時作渴諸般湯藥無靈飲湯飲水腹腫膨束手待觀死定急飲茯苓飲子時時與兒調停須臾吐止火邪甯纔與理中對證

明魯伯嗣學嬰童百問

嘔證吐乳證

仲陽云初生下拭掠小兒口中穢惡不盡嚥入喉中故嘔吐及多生諸病嘔者有聲也吐者吐出乳也凡小兒乳哺不宜過飽若滿則溢故令嘔吐胃中納乳如器之盛物杯棬之小不可容巨椀之物雨驟則溢溢酒暴則卮翻理之必然乳母無知但欲速得乳兒長大更無特度或兒睡著而更嚙乳豈有厭足受病之源自此漸至日深導其胃氣之虛慢驚自此而得可不慎乎此候但令節乳爲上甚者宜令斷乳先此乳母可服調氣之劑兒服消食丸化乳壯胃爲上議曰吐乳嘔乳此證有數般有冷有熱當自辨認若吐自口角出此是乳多消化不及滿而則溢此非病也常服消乳丸異功散當令乳母節乳爲上冷吐可服觀音散香朴散快脾等藥熱吐則頭額溫有黃涎而渴小便赤少此是熱吐多是傷暑熱者有此證乳母同服香薷散五苓散又有風痰吐乃是傷風不解吐乳夾痰若經久必然生風仍宜下疏風化痰藥竹茹湯去桂五苓散青州白丸子溫膽湯又當留心調治紫霜丸亦可服

熱吐

小兒秋夏伏暑多有熱吐何以別之或有黃涎頭額溫五心熱小便赤而少或脣乾而煩渴先令乳母服香薷散五苓散兒服竹茹湯五苓散熱甚者大柴胡湯去大黃服或小柴胡湯亦可熱極者可服大承氣

湯其效如神玉露散亦可服

寒冷嘔吐噦逆

小兒感受風冷或食生冷瓜果過多胃口停寒以致吐食吐乳並用理中湯主之或釀乳法消乳丸異功散香朴散茯苓半夏湯二陳湯人參散磨沉散俱可服

霍亂吐瀉

小兒吐瀉有身溫者有身熱者有身涼者有吐瀉成驚風者有夏月傷暑吐瀉者有初生三日內吐瀉者仲景云小兒初生三日內吐瀉壯熱不思乳食大便青白乳食不消或白色是傷當下之後和胃仍用白餅子和胃用益黃散主之三日以後至十日吐瀉身溫涼不思乳食大便青白乳食不消此上實下虛也用益黃散加減治之又傷風吐瀉身溫乍涼乍熱多氣兼大便黃白色嘔吐乳食不消時時咳嗽更有五臟兼見證當服入臟君臣藥先大青膏後益黃散主之又吐瀉身熱多睡能食乳飲水不止吐痰大便黃水皆爲胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其渴止後用發散藥止渴多服白朮散發散大青膏釣藤飲主之又吐瀉身涼吐沫瀉青白色悶亂不渴噎氣長出氣睡露睛此傷風荏苒輕怯因成吐瀉當補脾後發散補脾益黃散發散大青膏釣藤飲夏至後吐瀉身壯熱熱證也或因傷熱乳食嘔吐不消瀉深黃色玉露散主之五苓散亦佳香薷散車前子散可選而用之若面色青黃知風熱在脾髮直怕人眼不合是心中有毒涎更胃逆風搖可服定命丹

冷瀉

湯氏云此乃脾虛受冷致令水穀不化泄瀉注下仲陽云小兒不能食乳瀉渴水身冷無陽也當治脾益黃散主之古今不同當依加減法用之始爲穩當冷積瀉沒石子丸極效人參散理中湯加減服尤佳更加肉荳蔻則止來復丹不換金正氣散皆可觀音散銀白散加減調治乃平和之劑也

熱瀉

湯氏曰小兒熱瀉者大便黃而赤或有沫乃臟中有積或因乳母好飲酒或嗜熱物或生下傷溫蘊熱醫

證當以赤少口乾煩躁爲驗治法當用錢氏白朮散去木香用之五苓散去桂亦可服其熱甚者四逆散大柴胡湯去大黃服之殊驗也更用黃連丸等劑亦佳調中湯去大黃加黃連枳殼如夾熱而瀉太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯嘔者加半夏也又有挾熱瀉利而小便祕澀赤甚者四順清涼飲主之

傷食瀉

湯氏云凡此瀉不宜便補先用消食藥或用紫霜丸取其積盡然後可補經云食瀉重當取疳虛用補虛治食瀉與香橘餅子加減觀音散調中湯散以意加減凡傷食瀉不可卽止宜節飲食當用進食丸取下食積令盡次以錢氏加減益黃散只一服可止此乃切要治法然後異功散四君子湯調理必取全安有腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之如冷積瀉瀉用香朮散止之白朮散以和氣調胃調中散保安丸能止傷食瀉感應丸沉香煎三稜煎皆可服

驚瀉

仲陽云慢驚病後或吐瀉胃虛或氣弱因驚眼白如淡墨下糞青黃此瀉合溫補至聖保命丹釣藤飲主之或乳隨糞下消乳丸進食丸主之或微渴心脾喘躁狂熱此瀉尤難治辰砂五苓散主之冷者定命飲子主之後與溫驚朱君散睡驚太乙丹薛氏保嬰撮要

霍亂吐瀉

錢仲陽云吐瀉壯熱不食或乳不消是傷乳也宜白餅子下之後用益黃散和胃若吐瀉身溫不乳大便青白此上實下虛也用益黃散加減治之大凡吐瀉身溫乍涼乍熱氣粗大便黃自吐乳不消此傷風熱也先服大青膏發散後服益黃散和胃若吐瀉身熱多睡能乳吐痰大便黃水胃虛也先用白朮散生津止渴後用大青膏釣藤飲發散風邪若夏至後吐瀉身熱或吐乳瀉黃此傷熱乳也用玉露散之類凡瀉乳腹痛按之而哭者食積痛也用白餅子下之按之不哭者脾胃氣虛也用五味異功散補之手足指冷者脾胃氣虛寒也用異功散加木香傷風吐瀉者風木尅脾土也亦用前藥若飲熱乳而瀉黃者濕熱壅滯

也用四苓散如不愈或反甚者元氣復傷也用白朮散瀉而腹中重墜者脾氣下陷也用補中益氣湯若服尅滯之劑而腹中窄狹者脾氣虛痞也用六君子湯若面黃瀉青脾虛而肝乘之也用六君柴胡升麻木香若多噫瀉黃心脾氣虛也用六君炮薑升麻生下半年旬日內吐者止宜調治其母恐嬰兒臟腑脆弱不勝藥餌故也

徐春甫古今醫統

嘔吐

嘔者有聲也吐者吐出乳食也凡小兒乳哺不宜過飽若滿則溢故令嘔吐乳母無知但欲速得兒長更無時度或兒睡著而強乳自此受病之源漸至日深遂成嘔吐甚者宜漸斷乳先令乳母服調氣之劑兒服消食丸化乳壯胃爲上蓋吐乳嘔乳證有數般有冷吐有熱吐當審辨之若吐自口角出此是乳多不能消化滿而則溢此非病也常服消乳丸熱吐則頭額溫或有黃涎五心熱小便赤少或脣乾而煩渴多是暑月傷暑或致此證乳母服香薷散五苓散兒服香薷湯五苓散冷吐則清涎夾乳吐出小便清而多由乳母當風取涼解脫致令風冷之氣入乳令乳變敗兒飲之則冷氣入胃故嘔吐也乳母宜捏去舊宿乳服理中湯快氣助胃之劑次用釀乳法茯苓半夏湯加減觀音散快胃之藥又有風痰吐者乃是傷風不解吐乳夾痰久必生風宜服青州白丸子半夏散疏風化痰之劑

瀉泄

瀉泄乃脾胃顛病凡飲食寒熱三者不調此爲內因必致瀉泄又經所論春傷風夏飧泄夏傷暑秋傷濕皆爲外因亦致泄瀉醫者當於各類求之母徒用一止瀉之方而云藥可施治此則誤兒豈淺云耳若不治本則瀉雖暫止而復瀉耽誤既久脾胃益虛變生他證良醫莫救

霍亂吐瀉

脾爲中州胃爲水穀之海乳哺入胃脾能尅化然後水穀分其清濁傳變得宜則無吐瀉之患凡小兒上吐不止下瀉不住皆因內外傷侵兼以調護失常乳食不節遂使脾胃虛弱清濁相干蘊作而成有先瀉

而後吐者乃里急後重也