

醫學後象 卷七八

醫學從衆錄卷七

閩吳航陳念祖修圖甫者

次男元犀靈石衆訂

心典叢叢

孫男心蘭之亨全校字

泄瀉

泄瀉之症有五而總不離於濕初起只以平胃散加猪苓澤瀉治之他方皆不逮也又有五更天將明時必洞瀉一二次名曰脾腎泄難治蓋以腎旺於亥子今腎大

虛閉藏失職故五更之時而特甚也亦謂之脾者以泄瀉之時一定不移五行之土猶五常之信也四神丸加味主之大抵初瀉與瀉之未甚宜利水次補脾久瀉大瀉宜補腎以胃關煎入味丸之類爲主兼服補中益氣湯以升其下陷之氣蓋以腎爲胃閉二便開闢皆腎所主也

脉息

宜沉細

忌浮大

加味平胃散

苦木

一錢

炙甘

陳皮

各一錢

猪苓

厚朴

一錢  
橘汁

澤鴻

各一錢  
五分

生薑

三片

水煎服

如頭痛發熱惡寒者外感風寒也加紫蘇二錢用青  
防風各一錢

如傷食飽悶脹痛等症加山楂麥芽之類太醉之後  
更加乾葛二錢

如腹痛不休脉細手足冷中寒也加乾薑二錢肉桂  
吳萸各一錢

如脉洪數有力口中熱舌紅腹痛時作時止小便短澁火瀉痛也加木通一錢乾葛一錢五分若兼腸垢裏急後重再加黃連一錢白芍三錢

如暑月水瀉口渴小便不利加滑石三錢研末

如瀉而腹痛不止爲土傷本賊加酒白芍三錢防風一錢

如服前藥不能效者是脾腎虛寒宜加補骨脂炒局豆白朮各二錢吳萸八分乾葛一錢以溫之如滑脫不止必加荳子肉豆蔻一錢五分鴛粟殼一錢以固

四神丸

方見增補方

鄉前輩林公諱祖成加白朮八兩鷺粟穀二兩肉桂一兩醋調炒米粉爲丸名六神丸治同再加杜仲四兩蒺藜四兩名曰腎啟脾丸白註云久服此丸健脾元足而營衛通斯分消之力旺腎元足而開闢神斯固攝之權行也

溫補肝腎元義主方

林公傳

杜仲

錢二

人參

朮

各一錢五分

蒺藜

肉豆蔻去油各

錢一

補骨脂

砂仁

各五分

五味子

二分

水煎空心午前服

小腹隱痛加肉桂五分

小便不利加澤瀉一錢

胃鬱前

治大瀉將脫久瀉不止

熟地三四五錢 白朮二三錢

錢炒

松蘆一二錢炒

吳萸五七分

錢炒各二

炙草一錢

扁豆炒研

山藥錢

炒各二

水煎服

按已上爲治瀉之恒法又有變通活法不可不知如

久瀉服溫補及固虛之藥不止或愈而復作或旣愈  
次年又應期而作俱是銅鈎未除宜通因通用之法  
本事溫脾湯主之又有感秋金燥氣始則咳嗽久則  
往來寒熱泄瀉無度服溫補藥更甚或完穀不化有  
似虛寒而不知肺中之熱無處可宣急奔大腸食入  
則不待導化而直出食不入則腸中之垢亦隨氣奔  
而出是以瀉利無休也宜以黃芩地骨皮甘草杏仁  
阿膠潤肺之藥兼潤其腸則源流俱清寒熱咳嗽泄  
瀉一齊俱止矣又有瀉久亡陰過服香燥之品發熱

口渴微喘汗出煩燥陰氣虛盡陽氣不能久留宜急  
養其陰以阿膠地黃門冬等類熬膏三四觔口服十  
餘次半月藥盡遂效另製補脾藥未善後全愈此喻  
嘉言之驗案也

溫脾湯

本事方  
兒時方

主治錮冷在腸胃間泄瀉腹痛宜先取去然後調治  
不可謂虛以養病也

子金溫脾湯

方見演  
在易

治積久熱痢亦白

生薑瀉心湯

治心下痞鞕乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

甘草瀉心湯

下後痞益甚日利數十行穀不化此非熱結但以胃中虛客氣上逆故便鞕也

半夏瀉心湯

嘔而發熱心下滿而不痛

荅苓湯

太陽少陽合病自利者

若嘔者加生薑一錢五分半夏一錢名生薑加半夏

生薑湯

黃連湯

胸中熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔者○即半夏瀉心  
湯去黃芩加桂枝以和表裏

乾薑黃連黃芩人參湯

下利醫復吐下之食入口卽吐

此方治嘔家夾熱不利於香港橘子各服此如神今

張石頤曰先生借治脾胃虛寒陽有積熱之泄症效  
厚朴生薑甘草半夏人參湯

此仲景治汗後腹脹滿之方也今石頤借治渴後腹  
脹滿甚效

石頤治總戎陳孟庸渴利腹脹作痛服黃芩白芍之類  
脹急愈甚其脉洪盛而數按之則濡此渴熱傷脾胃之  
氣也與厚朴生薑甘草半夏人參湯二劑渴止而飲食  
不思與半夏瀉心湯二劑而安

葛根黃芩黃連湯言見  
傷寒

此湯冲景治桂枝症醫反下之利遂不正脈促喘而  
汗出之症今借治表邪未解腸胃俱熱之瀉甚效  
按君氣質輕清之葛根以解肌而上利佐苦寒清虛  
之芩連以止汗而除喘又加甘草以和中先煮葛根  
後納諸藥解肌之六綬清中之氣銳又無補中逐邪  
者殊法矣

鍋杷蓮肉糖散

治老幼肺渴久不愈神方

飯鍋杷四兩

淨末

蓮肉四兩

心去水

白糖四兩

右共和匀每服三五匙一日三次食遠服

丹礬蠟榴丸

治一切久瀉諸藥不效宜服此丸

黃丹

枯礬

黃蠟各兩

石榴皮八錢  
炒研

將蠟溶化小銅杓內再以丹礬榴皮三味細末乘熱爲丸如豆大空心服五丸兼治紅痢用清茶下白痢

用薑湯下

鈎杷松花散

治白瀉不止神效方

飯鍋耙

二兩

松花

二兩  
炒

臘肉骨頭

五錢  
烘臘

共爲末砂糖調不拘時服

火腿紅麵散

各見種福堂

治脾泄

陳火腿骨

研末  
烟有性

紅麵

松花

右三味各等分爲細末砂糖調陳酒送下

風痺瘻

風痺瘻三症不同近世不能爲辨而混同施治誤人不淺茲持分別之

風者肢節走痛也內經謂之賊風後人謂之痛風又謂之白虎歷節風其中表裏寒熱虛實宜因脈辨症而藥之至久痛必大絡如木通刺蒺藜紅花金銀花鈎藤之類最能通絡可隨宜加入久痛必挾鬱鬱而成熱熱盛則生瘍如南星半夏括樓根黃柏鬱金川貝竹瀝蠶汁之類俱能解鬱清熱化瘍可隨宜加入多用桑枝桑寄生者蓋以桑爲箕星之精也多用虎骨者以風從虎亦以骨治骨之義也用烏附辛桂之藥而不效者宜用威蕤麥冬桑葉升麻生芪菊花蒺藜阿膠甘草之類爲膏

滋養陽明亦是柔潤熄肝風之類

痺者閉也風寒濕雜至合而爲痺與痛風相似但風則  
陽受之痺則陰受之雖行痺屬風痛亦屬寒着痺屬濕  
而三氣之合自當以寒濕爲主蓋以風爲陽邪寒濕爲  
陰邪陰主閉閉則重着而沉痛是痺症不外寒濕而寒  
濕亦必挾風寒曰風寒濕曰風濕此三氣雜合之說也  
內經云在陽命曰風在陰命曰痺以此分別則兩症白  
不混治矣至於治法不外三痺湯及景岳三氣飲之類  
爲主如黃芪五物湯黃芪防己湯桂枝芍藥知母湯烏