

吳氏醫方彙編

目錄

天寶	損傷	臍瘡	鶴膝風	痔漏	小腹瘡	臍中疽
	疔毒	足跟瘡	便毒	鶴口疽	腎俞發	疳疽
	多骨疽	腳跟發	下疳	上下馬瘡	肺瘡	脇疽
	癰風	脫疽	囊瘡	臀風	腸瘡	胃脘瘡
	血風瘡	疔贅	懸瘡	下注瘡	臟毒	腹瘡
	瘡癰	破傷風	脫肛	踝疽	纏腰火丹	臍瘡
	浸淫	類破傷風	腎臟風瘡	附骨疽		

臈中疽

生於心窩兩乳間即臈中穴屬任脉蓋臈中為氣海能分布陰陽若氣血不和七情不平便生此疽宜活命飲加清解之劑治此不可少緩恐七惡並見潰串皮膚無能為矣搃之患此者十之八九難以獲功

疔疽

發于腹之第四行三行高阜處屬脾經兼胃經之虛所致色赤者易色青者難須用解毒托裡之劑如形似谷實底寒熱交作者不治

脇疽

生於腋上脇間乃肝火鬱怒氣相併而作初起宜活命飲加柴胡形色不足者用人參養榮湯或六君子湯加減不可輕投攻伐之劑如腋下至

腰膝間腫痛色赤如霞名曰內發丹令人嘔噦昏迷腹脹便閉色赤者急砭去惡血用防風通聖去白朮甘草或服汗劑得汗則生如變至青紫色者不治

人參養榮湯

白芍

錢半

人參

陳皮

炙芪

桂心

當歸

白朮

炙艸

各一錢

熟地

五味

炒打

茯苓

各七卜五斤

遠志

五斤

姜枣為引水煎服

六君子湯

人參

白朮

茯苓

各二錢

甘草

一錢

陳皮

半夏

姜枣為引

防風通聖散

麻黃

防風

芒硝

荊芥

川軍

滑石

枝子 薄荷 石羔 桔梗 黃芩 連翹 白朮

甘草 當歸 白芍 川芎 共為末每服三錢生姜煎服

本方去大黃芒硝名雙解散虛弱加參芪

胃腕癰

聖濟總錄云胃腕癰由寒氣隔陽熱聚胃口寒熱不調故血肉腐壞以氣逆于胃故胃脈沉細以陽氣不得上升故人迎熱甚令人寒熱如瘡身皮甲錯或咳嗽或嘔膿吐血若脈洪數膿成也急排之脈遲緊瘀血也急下之否則毒內攻腐爛腸胃矣

丹溪先生云內疽者因飲食之毒七情之火相鬱而發用射干湯主之愚常以薏苡仁湯牡丹皮散太乙膏選用之不效若吐膿血飲食少思助

胃壯氣為主而佐以前法不可專治其瘡

射干湯 治胃癰吐膿血 射干 去毛 山枝仁 赤茯苓 升麻 各一錢 赤芍 錢半

白朮 五下 水煎服

牡丹皮散 治腸癰腹濡而作痛時下膿

粉丹皮 人參 天麻 白茯苓 黃芪 炙 薏米

桃仁 去皮尖 白芷 當歸 川芎 各一錢 官桂 炙 升麻 各五下

木香 三下 水煎服

腹癰

腹癰生於臍下或左或右皮裡膜外乃膏粱厚味七情鬱火所致若漫腫堅硬肉色不變脉遲緊者未成膿也四君加芎歸白芷枳壳或

托裏散腫軟而色赤脉洪數者已成膿也托裡消毒散膿成而不外潰者氣血虛也先用透膿散不應則以卧針刺之腫焮作痛者邪氣實也先用仙方活命飲隔蒜灸法以殺其毒後用托裏以補其氣若初起欲其內消當助胃壯氣使根本堅固而以行經活血之藥佐之若用剋伐之劑欲其消散則腫不能潰者不能斂少壯者多為難治老弱者十九見危二有食積疝氣類此者須當斟酌

四君子湯

人參

白朮

茯苓

各二錢

甘草

一錢

川芎

當歸

白芷

枳壳

姜枣為引

托裏散

治瘡瘍飲食少思或不腐不斂

人參

黃芪

鹽炒

當歸

川芎

白朮

土炒

茯苓

腹癰 臍癰

四

白芍 各一錢 厚朴 白芷 甘草 水煎服

托裏消毒散 人參 川芎 白芍 黃芪 當歸 白朮

茯苓 忍冬 各一錢 白芷 甘草 皂刺 各五下

水煎服 脾弱者去白芷倍人參

透膿散 黃芪 四錢 山甲 一錢 炒 川芎 三錢 當歸 二錢 皂刺 錢半

水煎服

臍癰

臍中生瘡由心經續積熱流入手太陽陽明二經治宜清熱內托之劑
加何首烏等壯者下之勿使成膿為妙

小腹癰

生於臍下一寸五分氣海穴再下二寸丹田穴再下三寸關元穴三穴俱為腹
癌皆屬任脈俱由七情不和而發未潰宜活命飲膿成尤宜速潰遲則
內串參苓無功潰後更當雙補須防久而不斂

腎俞發

生於脊骨第十四節腎俞穴由房勞過度致令腎水有虧小兒亦有此症乃
先天不足治宜滋陰養榮兼能保養往得生禁用灸法

肺癌

肺短而濇者順浮而大者逆

肺為五臟之華蓋外司皮毛由勞傷氣血外邪所乘而成或入房過度腎
水虧損金受火剋或貪饕炙煇辛辣厚味薰蒸於肺皆足致此其候口中
辟、燥胸中隱、痛身皮甲錯甚者鼻流清涕咳出膿血初宜桔梗湯

加味治之潰後宜排膿散愈後須補中六味等湯加川貝五味子收功
始終宜飲食知味面色全白膿稠無味者吉若膿血腥臭惡寒身熱額
紅氣喘胸脇脹滿音啞多汗者難療

患此者終身忌食鱉魚石首魚甲魚鴨蛋紅蘿蔔食則復發不能治矣
排膿散 治肺癰吐膿後服之

人參 黃芪 鹽炒 白芷 五味 各等 川貝

右為細末每服三錢蜜水調服

桔梗湯 桔梗 貝母 當歸 姜仁 黃芪 枳殼 甘州節

桑白皮 防己 百合 薏米 各半 五味 甜葶藶 隔紙炒

地骨皮 知母 杏仁 生姜為引咳甚加百合熱加柴胡黃

李大便不利加蜜炙大黃小便澀滯加灯心木通煩燥加茅根痛甚
加人參白芷神效

寧肺湯 甘桔湯加薏米月敗醬五錢量加百合桔萎水煎服之

肺癰 元參三月麥冬三月生甘五錢銀花十

肝癰 白芍三月當歸三月炒枝三錢生甘三錢銀花十

腸癰 凡小腸癰則左足縮大腸癰則右足縮

夫腸癰者濕熱瘀血流入小腸而成初起惡寒發熱小腹隱隱作痛有似脹
滿喘急異常大便不通飲食不進甚者臍突轉側水聲或繞臍生瘡潰
下膿血其脉必數如緊數者膿未成也去緊但數膿已成也初覺宜用苡仁
湯托之或活血散瘀之劑下之瘀血已盡其症自安如膿血不透者用排膿散

以助之後用大補之劑以復其原內經云腸瘕為病不可驚則腸斷而死故
患是者其坐卧轉側理宜徐緩時日少食薄粥及八珍固其元氣靜養調
理庶可保全

薏苡仁湯

薏仁 三錢

瓜蒌 三錢

丹皮 二錢

桃仁 去皮尖 二錢

白芍 一錢 炒

水煎服

犀黃丸

治肺腸瘕瘰癧等症

乳香

沒藥 各一兩

麝香 錢半

牛黃 三下

共為細末用黃米飯一兩搗爛入末為丸桐子大每服三錢干黃酒

送下

治大小腸瘕方

凡小腸瘕則左足縮大腸瘕則右足縮是也

用地榆一斤水十碗煎三碗再用生甘廿二金銀花一斤再煎一碗空心
溫服一服即消久不須兩服也但忌房事要緊

腸癌

當歸三地榆一苡仁五錢

臟毒

其症由醇酒厚味勤勞辛苦蘊流注毒于肛門初則突腫二便不利痛
痒有時甚者肛門肉泛如麵糞帶鮮血須防內蝕串爛經絡污水流出殊
屬難療初見此症宜用結陰丹或四物湯加地榆銀花服之

結陰丹

枳壳

威靈仙

生黃芪

陳皮

椿根白皮

何首烏

荊芥穗

共為細末酒糊丸如桐子大每服五七十九米飲入醋少許

微煎俟溫送下

臟毒 纏腰火丹 痔漏

四物湯

當歸

熟地

各三錢涼血用生地

白芍

二錢酒炒

川芎

錢半

水煎服

纏腰火丹

此症繞腰生瘡累累如珠由心腎不交肝火內熾流入膀胱環於帶脉形如束

帶俗呼蛇蛋瘡須急用化斑解毒湯遲則毒由臍入膨脹不食

化斑解毒湯

治三焦風熱致生火丹遍身痒痛兼治漆瘡

元參

知母

石膏

人中黃

黃連

升麻

連翹

牛子

各一錢

甘草

五片

沒竹葉

廿片

水煎服

痔漏

經云因而飽食腸癖為痔以此多見亦有竭力遠行或酒色過度起居不慎以致濁凝于大腸衝發肛門而成初起形如鼠乳未破者為痔腫痛便

難當用六味槐角丸外用涼水洗之醫通云欲斷其根須用枯藥欲實其壳必戒房勞用藥不可離蕩滌瘀血清熱之劑若久而不瘥則內結成管因而外潰變為漏症甚則穿臀穿陰穿腸種不一又當用潰管丸後以養元補陰為主斷不可妄用寒涼以傷榮衛慎之

黑玉丹

治新久腸風痔漏着床疼痛不可忍者

服此藥不過三四次便見功效初得此疾發痒或痛穀道週回多生硬核此是痔如破是漏只下血是腸風皆酒色氣風食五事過度即成此疾人多以外醫塗治病在腸自有虫若不去根本其病不除此藥真有奇效

刺蝟皮

槐角

各三月

猪鬃懸蹄甲

四十九个

牛角腮

剉

亂髮

皂角水洗

敗棕

各二月上六味俱裝鍋內燒存性

苦練皮

一升二錢五下

芝蔴

生用

雷丸

各一升

乳香

五錢

痔漏

麝香一錢

右為末酒煮麪糊丸如桐子大每服八粒先嚼胡桃一枚

以溫酒吞下或海藻煎湯酒吞下空心食前日三服切忌別藥不遇

三五日即除根矣

內消散

小童龜

一丁將四足托住酒醉死泥封燒灰存性

川山甲

揀極小片一歲一片蛤粉炒

當歸

甘草

川芎

姜蚕

黃連

只壳

各五錢

黃芩

象牙

炒研

蒼朮

各一兩

黃芪

二兩

槐花

炒黃色

右為細末煉蜜為丸如桐子大

每付三錢白水送下須服完一料要勿間斷患自內消永不復發

補漏丸

地骨皮

五錢

瓦松

五錢

銀花

五錢

槐花

六錢

蜜炙蝟皮

酒浸連刺炒

黃色二錢

共為細末蒸飯為丸如桐子大每服三錢米湯送下忌發物外再

用雀子卧單草煎湯薰洗屢驗如好飲者加黃連

吳黃水炒三錢

壯盛者