


濟阴綱目



濟陰綱目卷之四

吳興 金德生聞風父輯著 白嶽 曹啟祚長亂父訂正
西陵 汪淇瞻滴子箋釋 天都 查望于周父叅閱

虛勞

○論婦虛勞與男子不同。

補中益氣是治勞倦內傷之劑乃初治法非久病勞瘵骨蒸所宜

準繩云勞倦所傷用補中益氣湯調治乃暴病也失治而有發熱潮熱盜汗欬嗽諸證出焉謂之虛勞又復失治而有皮聚毛落飲食不爲用虧骨髓中熱經閉不行諸證出焉謂之瘵骨蒸熱至於傳尸之疾別自一種其源不起於勞卻其流或至於滅門余於雜病首冊則旣條分而備列矣然男以精爲主女以血爲主其致病

精血雖殊而虛勞形症不宜與雜症參遠治亦不異

既殊其施治亦異故應別著方法而陳氏良方分勞瘵骨蒸勞血

看

按血風勞者

肝血虛而風

熱成勞也風

勞冷勞因虛

乘衰日久變

成勞熱氣虛

者氣不足熱

至骨蒸勞瘵

大都難治矣

風勞氣虛勞風勞冷勞熱勞客熱等門未免惑亂後人靡所適從今釐正如左醫者更參雜病虛勞傳戶勞二門而用之則無遺少之患矣

○論初病大法

保命集云治婦人虛勞局方中謂首尾六合如大聖散熟地黃丸是治無熱虛勞也中道藥牡丹煎丸空心食前人參荆芥散臨臥食後是治有熱虛也

戴氏曰有病後血虛者有本体血虛者其人往來寒熱或五心發熱言語無力面色痿黃頭目昏暈生諸疾芎歸湯加羊肉少許或十全大補湯四物湯養榮湯服之血虛而氣旺者宜抑氣湯御

無熟虛勞

陽虛症其病

自上而下損

之脉也法宜

溫補惟東垣

元禮立齋先

生獨得其治

宜宗之氣虛

易補宜早爲

妙不比有熱

虛勞之難療

理也

有熱無熱可

以占氣血虛

實矣立齋証

治方法可補

前論不足

○論無熟虛勞

大全云婦人冷勞屬血氣不足臟腑虛寒以致臍下冷痛手足時寒月經失常飲食不消或時嘔吐惡寒發熱骨節痠疼肌膚羸瘦面色痿黃也

薛氏曰前證有內外真寒有內外真熱有內真熱而外假寒有內真寒而外假熱者若飲食難化大便不實腸鳴腹痛飲食畏寒手足逆冷面黃嘔吐畏見風寒此內外真寒之證也宜用附子理中

湯以回陽八味地黃丸以壯火若飲食如常大便堅實胸腹痞脹飲食喜冷手足煩熱面赤嘔吐不畏風寒此內外真熱之證也宜用黃連解毒湯以消陽六味丸以壯水若飲食如常大便堅實胸腹痞脹飲食喜寒手足逆冷面黃嘔吐畏見風寒此內外真熱而外

假寒也。亦用解毒湯六味丸。若飲食少思大便不實。吞酸嘔氣。胸腹痞滿。手足逆冷。面赤嘔吐。畏見風寒。此內真寒而外假熱也。有用附子理中湯與八味丸當求其屬而治之。經曰。益火之源以消陰翳。壯水之主以制陽光。使不知真水火之不足。泛以寒熱藥治之。則舊疾未去。新病復生矣。夫所謂屬者猶主也。謂心腎也。求其屬者。言水火不足而求之於心腎也。火之源者陽氣之根。卽心是也。水之主者陰氣之根。卽腎是也。非謂火爲心源。爲肝木爲腎主爲肺也。

以內外俱寒

而不用附子
理中何也
以內外真熱

不用三黃解
毒而以二味

一婦食少作嘔。口吐痰涎。面黃腹痛。月經不調。手足逆冷。此內外俱寒之證。以六君加香附木香治之而愈。

一婦忽嘔吐酸水。內熱作渴。飲食不進。惟喜冷水。面色青赤。投之

黃連者瀉火
之源也其餘

加白朮等藥

者抑恐苦寒

傷胃耳

有熱渴便秘

二症故雖近

冷亦是假寒

狀亦有可下

者后用六味

丸求其屬也

然須以脉有

力無力分虛

實

以藥大口卽吐此內外真熱之證積十餘日以黃連一味煎湯飲之徐加白朮茯苓仍加陳皮當歸炙甘草至月餘始進米飲稍粥調理而愈

一婦內熱作渴大便秘結畏惡風寒手足逆冷此內真熱而外假寒先用黃連解毒湯後用六味丸而愈

一婦初患痰喘熱渴醫以降火散氣治之肌日削而氣日索延至甲辰木旺痰盛身熱口腐腹脹神昏絕食幾死此虛熱無火投以壯火生土之劑隨服隨效越數歲夏初坐則頭墜不能起視臥則

背冷覺風透體煩熱暈眩咳嗽痰湧手足麻冷此內真寒外假熱此得熱因寒用之法從之

之證也遂以大補薑附之劑投之不三四服而大勢已平仍以前藥加減而愈

此案係重出
然不刪去者
存之以備遺
亡也

虛明是上實下
得熱因寒用

韓懋治其嫂年三十餘十八胎九殯八天會家難作驚憂過甚遂昏昏不省人事口唇舌皆瘡或至封喉下部虛脫白帶如注如此四十餘日或時少甦至欲自縊悲不能堪醫或投涼劑解其上則下部疾愈甚或投熱劑及以湯藥熏蒸其下則熱量欲絕此亡陽證也急以鹽煮大附子九錢爲君制以薄荷防風佐以芎歸葛桂之屬水煎入井冰冷與之未盡劑剝睡通宵覺卽能識人或曰此何謂也曰方書有之假對假真對真爾上乃假熱故以假冷之藥從之下乃真冷故以真熱之藥從之斯上下和而病解矣繼以女金丹錯綜以三二方不但去其疾且調治元氣無何連生二子爾不可不察也

論有熱虛勞。此屬陰虛火自下而上至肺之病也。宜以丹溪立
先無形而后有形也。且滋陰之劑有害脾胃。脾傷則氣損。氣損
則血無以生。氣盛則火有所助。誠難調治。惟審胃氣有無。以決
治則此爲良法耳。

大全云。婦人熱勞由心肺壅熱傷於氣血。以致心神煩躁。頭
疼。眼澀。唇乾。口舌生瘡。神思昏倦。四肢壯熱。飲食無味。肢體瘦疼。
心忪盜汗。肌膚曰瘦。或寒熱往來。當審其所因。調補氣血。其病自
愈矣。

壯火食氣是
言實火非同
勞熱之火可
補

薛氏曰。熱勞乃壯火食氣虛火煎熬真陰之所致也。王太僕云。如
大寒而甚熱之不熱。是無火也。熱來復去。晝見夜伏。夜發晝止。是
無火也。當治其心。如大熱而甚寒之不寒。是無水也。熱動復止。終
根有生中來。故當求屬以忽往來時動時止。是無水也。當助其腎。心盛則生熱。腎甚則生寒。

衰之

竊謂以下諸

症或肝或脾

或肺而心賢

者甚少總以

分氣分血主

治却與求屬

之意不同

此下十二節

分經症虛實

定方確有見

解

腎虛則寒動於中心虛則熱收於內竊謂前證若肝脾血虛用四物參术。肝脾鬱怒小柴胡合四物湯。脾胃氣虛補中益氣湯。肺脾血虛加味道遙散。肝經風熱加味小柴胡湯。心經血虛天王補心丹肺經氣虛人參補肺湯。肝經血虛加味四物湯大抵午前熱屬氣分用清心蓮子飲。方見雜病赤白濁午後熱屬血分用四物湯參术牡丹皮熱從左邊起。肝火也實則四物湯龍膽山梔虛則四物參术

黃耆熟從膀下起陰火也。四物參术黃檗知母酒拌炒黑五味子麥門冬肉桂如不應急用加減八味九不時而熱或無定處或從腳心起此無根虛火也用加減八味九及十全大補湯加麥門五味主之。

一婦經行不調飲食少思日晡熱甚此肝脾氣血俱虛用十全大

補加山茱萸山藥牡丹皮麥門五味而愈。次年秋寒熱如瘧，仍用前藥而愈。一婦生育多胎，經月不調，兩足發熱，半餘其身亦熱，則足痠痛，又年許唇腫裂痛，又半年唇裂見血，形體瘦倦，飲食無味，月水不行。此氣血俱衰之證。彼誤用通經丸等藥，復傷氣血，遂致不起。

○論瘵骨蒸熱

準繩云：五勞六極七傷諸證治已見雜病虛勞門，茲不贅。候婦人致此多因經行胎產或飲食起居七情重傷肝脾之所致。又或失於調攝或過於攻伐而成與男子治法稍有不同，故彙集古禁方，專治婦人者於此。若欲窮其源流，更當稽之彼籍。

良方云：骨蒸勞者，由積熱附於骨而然也。亦曰傳尸，殮殮，復連無鬼，亦必是也。若果有瘵，究爲祟藥石，從之葛氏鈴方，有禁煉法，有以癸亥夜半跪拜北斗者，皆名瘵法。

常察故瘵，予從之葛氏鈴方，有禁煉法，有以癸亥夜半跪拜北斗者，皆名瘵法。

良方云：骨蒸勞者，由積熱附於骨而然也。亦曰傳尸，殮殮，復連無鬼，亦必是也。若果有瘵，究爲祟藥石，從之葛氏鈴方，有禁煉法，有以癸亥夜半跪拜北斗者，皆名瘵法。

云何

此至脉之病
也夫腎主骨

骨至于蒸黃

陰竭矣陽何

以依而傳

無卒皆是擊

免爲祟

肝熱生風故

病名血風目

勞者病人血

虛月候不行

而一熱不止

此是肝腎之

陰不足實從

至脈主治

幸其名不一此病皆由脾胃虧損所致其形羸瘦腹脹泄痢敗
無方傳於腎則盜汗不止腰膝冷痛要鬼交侵小便赤黃傳於
心則心神忪忪喜怒不時頰唇赤色乍熱乍寒傳於肺則胸滿短氣
咳嗽吐痰皮膚甲錯傳於肝則兩目昏暗脇下妨痛閉戶忿怒五
臟既病則難治療

○論血風勞

太全云婦人血風勞證因氣血素虛經候不調或外傷風邪內挾
宿冷致使陰陽不和經絡痞滯腹中堅痛四肢痠疼月水或斷或
來面白色痿黃羸瘦又有因產後未滿百日不謹將護臟腑虛腫百
脉枯竭遂致勞損久不瘥則變寒熱休作有時飲食減少肌膚瘦
瘁遇經水當至卽頭目昏眩胸背拘急四肢疼痛身體煩熱足重

面浮或經水不通故謂之血勞氣也。

薛氏曰東垣云喜怒不節起居不時有所勞傷皆損其氣氣火旺火旺則乘其脾土脾主四肢故因熱懶言動作喘滿者汗心煩不安當病之時宜安心靜坐存養其氣以甘寒瀉火以酸味收其散氣以甘溫補其中氣經言勞者溫之損者溫之略云平人脉大爲勞以黃耆建中湯治之

一婦人勞則足跟熱痛此足三陰血虛用聖愈湯而痊後遍身癰瘍誤服風藥發熱抽搐肝脉洪數此肝木血虛火盛而生風以天竺黃膽星爲丸用四物麥門五味芩連炙甘草山梔柴胡煎送而

此所謂風勞也當從損脈治

此下諸方於虛損初病者

一婦素清苦勤於女工因感風邪自用表散之劑反朝寒暮熱自

宜酌用之

夫血病治血

氣病治氣人

所易知而血

病補氣氣病

補血人未盡

知故四物復

有增損之法

益以地黃滯

氣而損脾非

四肢怠惰之

力少氣者所

宜故當損而

人參甘草所

以益肺也故

增若炮薑既

能溫中又能

引血以歸氣

此增損之妙

汗盜汗形氣虛甚其脉或浮洪或微細其面或青白或痿黃此去而氣血愈虛也用十全大補湯三十餘劑漸瘳又用加味逍遙散兼治半載而痊。

○治虛勞平補諸方

增損四物湯 治婦人氣血不足四肢怠惰乏力少氣兼治產後下血過多榮衛虛損陰陽不和乍寒乍熱

當歸

川芎

白芍藥 人參

乾薑 炮甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去滓熱服

六神湯 治脾氣不和榮衛不足怠惰困倦不嗜飲食服之補養真氣進美飲食充澤肌膚

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

黃耆

地骨皮

各等分

按充肌澤膚者衛氣也氣不可熱此方

以黃芪益衛氣而又以地骨皮清衛熱則無壯火食

聖愈湯 治血虛心煩睡臥不寧或五心煩熱
黃耆 當歸一錢 酒洗各
生地黃酒洗各五分

熟地黃酒洗



北京中医药大学图书馆版权所有

氣之虛又以氣之虛又以

四物引衛氣

以歸四臟而生血則又有少火生氣之用如是則榮

衛足而困倦去矣其曰脾不和不嗜食亦爲氣不足之病氣足則愈也宜知之

芍藥二兩當歸

川芎

黃蓍

肉桂各一

白朮

甘草錢五分

右爲末每服二錢加薑棗水煎服食前

宮歸建中湯 治婦人一切血氣不足虛損羸乏

聖愈湯重在
血虛心煩而

字然去白芍
而用生地者
所以涼心生
血也川芎之

用豈爲火鬱
宜散歟不若

以麥門冬易

之
按上三方一
用參薑以溫
中一用黃芩
地骨以益衛

當歸四兩 白芍藥炒六兩 肉桂去皮甘草炙各二兩

右咬咀每服三錢加生薑三片棗一枚水煎空心服此方以歸芍爲主而業知配合之妙則知古人之心

雙和散

治一切大病之後虛勞乏力補血益氣

黃蓍

熟地黃

當歸

川芎

白芍藥炒各

甘草炙各五分

右咬咀每服四錢加生薑三片棗一枚水煎服

補中益氣湯 治形神勞倦或飲食失節以致脾胃虛損清氣下清熱以參芪並用而中外地骨以益衛

陷發熱頭痛四肢倦怠心煩肌瘦日漸羸弱

黃蓍

人參有數各一錢

甘草炙王各一分

當歸

陳皮各七分

建中又重在氣也然桂之

升麻

柴胡各三分

血桂之氣味
可以通榮

故本經以之
可以通衛氣

通血脉又同

芪术甘草薑

棗等則建中

之功尤大矣

以其兼中上
也雙和者專

和柴衛而非

建中意也然

而大建中湯

以白朮易熟

地而分兩亦

殊知古人

不執方泥

法讀之令人

有言外之意

右作一服水煎食遠稍熱服

八珍湯 治脾胃虧損氣血俱傷蓋人之生以脾胃為主。脾胃一

虛諸臟失所百病生焉

卽四君子合四物湯加薑棗煎服

歸脾湯 治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不能攝血妄

行或健忘怔忡驚悸或心脾傷痛怠惰嗜臥飲食不思不寧適

方見血崩門 劍傷條

黃耆散 治勞氣食後身疼倦夜間盜汗此因失血營衛損也

黃耆一兩 防風 单歸 白芍藥 乾地黃 各七錢

甘草

炙半

人參

桂枝

白朮

白芍藥

白芍藥

白芍藥

白芍藥

白芍藥

白芍藥

白芍藥

白芍藥

白芍藥

右每服五錢薑三片棗一枚水煎食前溫服



南京中医药大学图书馆版权所有

夫形勞者氣
傷於外神勞

者氣傷於內

飲食不節者

中氣受傷傷

則水穀衰少

後天氣病而

上下二焦亦

無所養故以

甘溫之劑以

益上中之氣

而又妙在升

榮以舉下培

之陽使榮衛

和而氣自益

也氣益則何

病之有故東

垣先生一生

得力處在于

桔梗引子 治心不足解勞倦益血

黃蓍

人參

麥門冬

去桔梗

甘草

炙各二兩

青皮

各二兩

右爲末每服三錢水一盞煎七分溫服

桔梗飲食氣不足也故以參蓍甘草爲君加麥

門首所以通心而清火桔梗載諸藥以益上焦之氣青皮利膈氣以制諸藥之壅所謂血生於氣

劫勞散

治心腎俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱熱過卽冷時

有溢汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減少夜臥恍惚神氣不寧睡

多異夢此藥能治微嗽有唾唾中有紅線名曰肺痿失治便成

羸劣之疾

白芍藥

六兩

黃蓍

蜜炙

人參

去

白茯苓

半夏

湯炮七次

桔梗

甘草

甘草

炙

當歸

去蘆

五味子

阿膠

炒

熟地黃

洗淨焙乾各二兩

石咬咀

每服三錢生薑七片棗三枚水煎溫服日三

右咬咀每服三錢生薑七片棗三枚水煎溫服日三

得力處在于

人

卷四