

名方類證醫書大全卷之六

痰氣

附

諸飲

人身之痰如長流水貴乎順行又賴土為之堤防偶為風所逆或為物所壅滯則使有聲可以過類故痰之為疾或由脾土虛弱不能攝養金肺或為四氣七情所干氣壅痰聚發而為喘為咳又有水飲停滯胃膈亦能為喘為咳為嘔為泄為眩暈心嘈怔忡為寒熱為痰痛為腫滿壅塞為癰閉痞脹皆痰所致古方所載四飲生六證懸飲者飲水流在脇下咳嗽引痛溢飲者飲水流於四肢當汗而不汗身軀疼痛重支飲者飲逆倚息短氣不得卧其形如腫痰飲者其人素盛今瘦腸間漚漚有聲留飲者背寒如手大或短氣而渴四肢歷節疼痛脇下滿引飲益飲

轉甚伏飲者腸滿喘咳恒吐發則寒熱腰背引痛眼淚流出其
人振振惡寒其脉皆弦微沉滑治法懸飲當下之溢飲當發其
汗支飲則隨證汗下痰飲則用溫藥從小便利之此固定法而
藏氏獨以痰飲之疾皆氣不順而致之當順氣為先分道決之
氣順則津液流通痰飲自下亦至當之論亦有腎氣虛寒不能
攝養腎水使邪水溢上多吐痰唾又當溫利之八味丸最得其
宜或因酒後停飲而嘔者二陳湯丁香藿香散主之或脾胃為病
所傷而停積痰飲五苓散破飲圓主之臨病之際更宜詳審

風

治風痰壅甚頭疼目眩咽膈不利涕唾

稠粘并治酒過停飲嘔逆惡心胃脇引痛腹內有聲

半夏湯洗三兩

白朮

白茯苓

去皮

白礬生

人參

滑石

貝母各一兩

天南星

生用

白附子

生用二兩

右為末麝香圓如梧桐子每服三十圓食後薑湯下

二 治風痰壅滯胸膈喘滿惡心涎唾不利

陳皮 去白

新羅揀參

半夏

洗七次今每

枳實

苦梗

大南星

洗七次今每

右咬咀每服三升水一盞姜十片同煎食後服

三

治風壅痰盛

方見風門

寒

治風壅痰盛

方見風門

理中焦痞滿逐痰飲止腹痛

四

治風壅痰盛

方見風門

治溢飲倚息喘滿不得卧者

熱

治風壅痰盛

方見風門

治溢飲倚息喘滿不得卧者

赤茯苓 各半

紫蘇子

人參

前胡

木香 半兩 各

半夏 湯洗七次

枳殼 麸炒 甘草 炙

陳皮

右咬咀每服三錢水一盞生姜十片煎至七分熱服

六

治風壅痰盛

方見風門

治化痰墜涎止嗽定喘諸痰不可不試

茯苓 去皮 人參

大南星

薄荷葉

各半兩 乾生姜

白礬生

寒水石

各一斤

蛤粉

二兩

藿香葉

一分

右為末麩糊丸如小豆大生薑湯下二三十九食後溫水亦得一法加黃連酢黃藥水丸取効愈妙治酒病調和臟腑

除痰宿飲

半夏

人參

桔梗

細切薑汁製

白茯苓

各二兩

前胡

半斤

白朮

二兩

枳實

甘草

各半兩

香附子

一兩

右為末用半夏姜汁黃糊園如梧桐子每服四十園姜湯下

八

除熱痰下氣寬中利膈清上治痞滿

枳殼

半夏

黃芩

桔梗

各一兩

甘草

五錢

右劉每服四錢姜三片紫白皮五寸烏梅一枚煎溫服如若未効更加甜葶麻馬兜苓防已薄荷同煎立効熱痰黃色者是也



【冷】九 治胃虛去虛痰利冷飲

硫黃 研

白礬 枯炒

丁香

茴香 炒

木香 各一兩半夏二兩姜汁炒

右為末姜汁煮糊丸如梧桐子每服二十九空心米飲下

【十】 治元氣虛弱痰氣上攻風痰癱瘓嘔吐

靈砂

青州白圓子末 各一兩各研

右和勻以生薑自然汁打秫米糊丸如梧桐子每服三十丸

空心人參湯或棗湯下

【十一】 治脾胃宿冷胃腸傷痰嘔吐惡心吞酸噯

氣腹脹不思飲食

肉豆蔻

木香

丁香

人參 去芦

陳皮 法鉅 藿香葉 半兩半夏 湯瀉七次姜製三兩

右為末以生薑汁煮糊丸如小豆大每服二十圓薑湯下

十一 治胃脘虛寒痰飲留滯痞塞不通氣不升降

高良姜 乾姜 陳皮 青皮 各一兩 半夏 湯去滑二兩

右為末用生姜自然汁煮麴糊圓如梧桐子每服三十圓生

姜湯下 二法 煎藥並不炮製

十二 治脾胃虛寒宿飲留滯以致嘔吐涎沫或

有酸水不思飲食

木香 丁香 各一兩 乾姜 炮兩半 附子 炮去皮脂

半夏 洗七次 陳皮 去白 肉桂 去皮各一兩 縮砂 半兩

右以咀每服四錢水二盞薑七片棗一枚煎七分不拘時服

十四 治脾虛不得射制胃水多吐痰唾而不咳者

附子 炮去皮脂 桂心 各二兩 山茱萸 去核 山藥 各四兩

澤瀉 茯苓 牡丹皮 各三兩 熟地黃 八兩

右為末蜜圓如梧桐子每服五十圓空心鹽湯送下



十五 治胃脘脹滿痰涎不利頭目昏眩

天南星 半夏各生用 生硫黃別研各一兩

玄精石 盆硝各半兩 附子一个六分重者生用去皮屑

右爲末入麪三兩令与藥停水和作餅於沸湯內煮令浮漉

出爲圓如梧桐子每服三十圓生姜湯食後下

十六 治氣虛痰盛不得睡卧氣中痰厥尤宜服之

南星 川烏 附子各半兩 木香二分半

右以咀母三錢水一盞姜十片煎熱服

十七 治停痰留飲胃脘痞悶

目暈咳嗽涎或飲酒過飽嘔吐惡心

十八 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎

川當歸 甘草炙 前胡去苦 厚朴去皮姜製各二兩

肉桂去皮 陳皮法炮各 紫蘇子 半夏各五兩

右吹咀每服三錢水一盞姜三片棗一枚煎服不拘時

九 治痰氣壅塞上盛下虛心火炎熾腎水枯竭應

虛之證及婦人血海久冷無子赤白帶下並宜服之

肉桂半兩 沉香 附子炮去 胡苦芭酒浸炒

破故紙 茴香醋炒 肉豆蔻麩炒 陽起石研細水飛

金鈴子皮蒸核去 木香各一兩 硫黃 黑錫去滓秤各二兩

右用黑盞或新鐵鉚內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火

毒研令極細餘藥並杵羅為末一處和勻自朝至暮以研至

黑光色為度酒糊圓如梧桐子大陰乾入布袋內擦令光瑩

每服四十粒空心鹽姜湯或棗湯下女人艾棗湯下

治上盛下虛痰涎壅塞此藥最能鎮墜升降陰

安和五臟扶助元氣

水銀一斤 硫黃四兩



右用新鐵銚炒成砂有烟即以醋洒候研細入水火鼎醃調
赤石脂封口鐵線扎縛曬乾鹽泥固濟用炭二十斤煨如鼎
裂筆蘸赤石脂頻抹火尽爲度經宿取出研爲末糯米糊爲
圓如麻子大每服二十粒空心棗湯米飲人參湯任下

(二十一)

治上盛下虛痰氣壅盛或喘或滿咽乾

不利并治脚氣上攻煩渴引飲

前胡

五加皮 姜炙 黃耆

厚朴

去皮姜浸一先治半又

當歸

去芦 半夏 麴

紫蘇子

桔梗

半兩

甘草

陳皮

去白 肉桂

各一兩 乾姜

附子

炮去皮

人參 去芦

右以咀咀每服三錢水盞半紫蘇三葉薑三片棗一枚煎服

腎痛

治中脘留伏痰飲

腎寒手足不得者

半夏

二兩 茯苓

一兩

枳殼

去穢炒半兩

風化朴硝

二兩

右爲末姜汁起糊圓如梧桐子每服三十丸姜湯下

酒毒 治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂腎臟痞

寒手足戰慄飲食減少小便不利 三十三

縮砂仁 半兩 葛花 半兩 木香 半兩 白豆蔻仁 半兩

橘皮 半兩 白朮 二兩 乾生姜 二兩 蓮花青皮 去穢三分

白茯苓 半兩 猪苓 祛皮一 澤瀉 一兩 神麴 二兩 人參 壹兩 一兩

右為細末秤和勻每服三錢匕白湯調下得微汗酒病去矣

七情 治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或如梅核在

咽喉之間咯不出嚥不下并治中脘痞滿痰涎壅盛上氣喘急

紫蘇葉 二兩 厚朴 三兩 茯苓 四兩 半夏 五兩

右以咀每服四升水一盞薑七片棗一個煎八分不拘時服

若因思慮過度心氣不足小便白濁用此藥下青州白圓子

最効 用半夏五兩入參官桂甘草各一兩生薑煎服

亦名七氣湯大治七氣并心腹絞痛 三十四



通治 順陰陽消痞滿消酒化痰 三十五

半夏姜製 橘紅去白 桔梗去白 枳實去穢炒半兩

右為吹咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去滓半

飢半飽熟服

二十六 辰砂別研各 治風化痰安神定志利咽腸清頭目

白礬別研 辰砂別研各 天南星炮 半夏洗七次姜汁

右以白礬半夏同南星為末和合勻用生薑汁煮麵糊圓如

梧桐子別用辰砂為衣每服二十圓食後姜湯下

二十七 治胃脇脹滿短氣痰逆或吐涎沫

桔梗炒 半夏湯洗姜製 陳皮去白各 枳實炒赤

右吹咀每服三錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

二十八 消飲化痰壯脾順氣

右用大半夏以湯洗一遍去臍焙乾再洗如此七遍用糯米

泔浸一日夜取出控乾每半夏一兩用白礬一兩半研細溫
水化浸半夏上留水兩指許頻攪冬月於暖處頻放浸五日
夜取出焙乾用鉛白霜一錢溫水化又浸一日夜通七日盡
取出再用漿水於慢火內煮勿令滾候漿水極熱取出焙乾
於銀石或磁器內收貯每服一兩粒食後細嚼溫生薑湯下
又一法依前製成半夏每一兩用龍腦半兩研極細同飛過
朱砂於半夏上再為衣却鋪上灯草一重約厚一指單排半
夏其上又排灯草蓋約厚一指以炒豆焙之候乾取出於器
內收貯每服一兩粒細嚼食後溫水或冷水送下

(二十九)

治停痰留飲胃膈滿悶嘔逆惡心吐痰水

茯苓 去皮三兩 半夏 湯泡七次五兩

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎七分空心服
苓用陳皮半夏各七兩名橘皮半夏湯

三十 二陳湯治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中脘

不快或因食生冷飲酒過度脾胃不和並宜服之

半夏湯洗七次橘紅各五兩白茯苓三兩甘草炙一兩半

右改咀每服四升水一盞姜七片烏梅一箇同煎至六分熱

服不拘時二加丁香

三十一 續命湯治一切停痰留飲

青皮並洗川姜炮京三稜炮搥碎

草薢麩炒煙蓬木炮搥碎良姜溫經各一兩半夏湯洗七次三兩

右為末水煮麩糊丸如梧桐子陰乾每服五十丸姜湯下

三十二 治痰癆咳嗽久不已者常服養液潤燥解

肌熱止嗽

橘皮去白半兩半夏湯洗七次二升半

右為末分作二服每水一盞半入生姜十片同煎七分溫服



三十二 治痰飲上氣不思飲食小便不利頭目昏眩

吳茱萸湯泡白茯苓各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子每服三十丸熱水溫酒任下

三十四 治中脘氣滯胃膈煩滿痰涎不利頭目不清

南星生去皮半夏湯泡七次二味各五兩為末用生薑自然

汁和不可太軟但手捏得聚為度攤在篩中用褚葉蓋之

令發黃色曬乾收之須是五六月內做如舊黃法

香附子暑炒於磚上磨去毛五兩

右用南星半夏麴二兩淨香附子一兩同為細末水蒸餅

圓如梧桐子每服四十丸食後姜湯下

三十三 治一切痰涎壅盛或胃膈留飲痞塞不通

半夏湯洗七次四兩天南星炮去皮枳實去穢炒

赤茯苓去皮橘紅湯去白各一兩甘草炙半兩



右呖咀每服四升水一盞姜十片煎至八分食後溫服

三十六

治痰實食後膈滿遠年痰飲

薄橘紅四兩

甘草一兩

為末沸湯調下其功甚効

三十七

常服消食化痰養生之家不可缺

枳殼炒

肉桂各一兩

桔梗

半夏湯洗各二兩

為末姜汁糊丸梧子大每服二十九食後姜湯下

三十八

治胃中虛損及痰吐者

半夏麴

及半

白朮一兩

枳即

二兩

木香

炙甘草

各一

茯苓

二兩

炙甘草

各一

右為末每服二錢生姜湯調下食前服

三十九

逐飲消痰導滯清膈

枳實

去穢炒

半夏湯洗

陳皮

二兩

黑牽牛

半斤

碎

三

兩

炙甘草

各一

右為末水煮麴糊為丸桐子大每五十九生姜湯下食後

四十

諸飲

治腹下有悸停飲癰眩吐涎沫

中四溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後傷寒飲冷過多故

有此疾

四十一

旋覆花

人參

陳皮

枳實

白朮

茯苓

厚朴

半夏

澤瀉

猪苓

前胡

桂心

芍藥

甘草

各等分

右剉每兩分四服水二錢生姜十片同煎至七分取滓溫服

不拘時候忌食肉生冷滋味等物因酒有飲加葛根葛花縮砂仁

四十二

白朮

治五飲酒癖一曰留飲停水在心二曰癖飲水

癖在兩脇三曰痰飲水在胃中四曰溢飲水溢在膈五曰流飲

水在腸間漚漚有声並皆治之

乾姜

肉桂 去皮各半斤

白朮 一斤

右為末煉蜜圓如梧桐子每服三十圓空心米飲送下

四十三

治五飲停蓄胃膈呼吸之間痛引兩脇氣促

葶撥

丁香

胡椒

縮砂仁

蝎梢

青皮

巴豆

去皮

木香

烏梅肉

各等分

右以青皮同巴豆漿水浸一宿次日漉出同炒青皮焦去巴豆將所浸水淹烏梅肉炊一熟飯久細研為膏圓如黍豆大每服十五圓津液送下

四十四

治飲水流在脅下咳嗽引痛經年不愈者

芫花

甘遂

大戟

右等分為末以棗十枚水一錢半煎至八分去棗調藥不壯人一多贏人半錢平旦溫服不下者次日更加半多下後稀粥自養下後止藥

四十五

加防已煎治證同上 方見暑門