

132
醫節菴傷寒全生集目錄卷之三

辨傷寒哕逆例第一

瀉心湯

小柴胡湯

橘皮半夏生姜湯

羌活附子湯

丁附理中湯

橘皮乾姜湯

乳香硫黃散

丁香柿蒂散

灸期門法

辨傷寒胸脇滿例第二

辨傷寒結胸例第三



大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

加味柴胡桂枝湯

柴胡桂枝湯

柴胡枳桔湯

枳實理中湯

三物白散

茯苓半夏湯

加味二陳湯

加味犀角地黄湯

辨傷寒心下痞例第四

半夏瀉心湯

甘草瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

五苓散

十棗湯

柴胡枳桔湯

旋覆代赭湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

枳實理中湯

木香理中湯

辨傷寒自利例第五

葛根黃芩黃連湯

黃芩湯

小柴胡湯

猪苓湯

防風芍藥湯

白頭翁湯

理中湯

人參白朮散

附子湯

真武湯

通脉四逆湯

四逆散

白通湯

大承氣湯

八桂散

三黃熟艾湯

辨傷寒便膿例第六

黃連湯

四物阿膠湯

黃連阿膠湯

鷄子黃連湯

大黃酒

三黃補血湯

黃連胃風湯

阿膠湯

加減芍藥湯

桃花湯

當歸附子湯

桂枝六合湯

辨傷寒譫語例第七

辨傷寒鄭穀例第八

辨傷寒懊懣例第九

梔子豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾姜湯

辨傷寒發斑例第十

升麻葛根湯

加味羌活散

人參化斑湯

加味小柴胡湯

消毒犀角湯

大青升麻湯

犀角玄參湯

玄參升麻湯

梔子杏仁湯

黃連一物湯

黃連解毒湯

加減三黃石膏湯

通脈四逆湯

調中湯

大建中湯

人參三白湯

青黛一物湯

苦酒雞子湯

辨傷寒發黃例第十二

茵陳湯

梔子升麻湯

龍膽湯

得効方

茵陳犀角湯

茵陳五苓散

一方

瓜蒂散

茵陳四逆湯

茵陳茱萸湯

茵陳理中湯

擦黃法

辨傷寒發狂例第十二

陽毒升麻湯

升麻湯

升麻六物湯

加味升麻湯

梔子升麻湯

玄參升麻湯

梔子仁湯

三黃石膏湯

猪苓散吐法

奪命丹

辨傷寒心下滿例第十三

辨傷寒咳嗽例第十四

人參杏仁湯

三物湯

辨傷寒喘例第十五

麻黃石膏湯

葛根黃芩湯

五味湯

加減五味湯

陶節菴傷寒全生集卷之三

會稽

付朱映璧

訂正

吳江

醫官何

燾

重校

紹蘇

醫生戈如璧

同泰

辨傷寒呃逆例第一

夫呃逆者俗謂呃忒是也。纔發聲於咽喉則遽止。軋軋然連續數聲其聲短促不長。古謂之噦非也。噦與乾嘔無異但其聲濁惡而長。比之呃忒大有徑庭矣。若將呃逆紊爲噦與咳同。悞人尤多。然呃逆有因胃

中實熱失下而作。有因胃中痰飲而作。有因服寒涼之藥過多。胃中虛冷而作。且其氣皆從胃中起。至胸噎之間。而爲呃忒矣。胃熱失下。大便秘不通者。承氣湯下之。便軟者。以瀉心湯主之。有潮熱。小柴胡湯。胃虛有熱者。橘皮竹茹湯主之。有痰飲者。橘皮半夏姜湯主之。加茯苓枳實陳皮桔梗。若胃冷者。橘皮乾姜湯主之。甚者。丁附理中湯。加吳茱萸主之。若過服寒涼藥。多胃寒呃忒者。丁附理中湯。加吳茱萸木香姜汁。

主之。凡其氣自臍下直上熱呃忒者。此陰症。

死也。其病不在胃矣。其病下虛內伏陰火。或誤服
寒藥。遂至冷極於下。迫其
火上升。卒集於胸中。而
爲呃。或亦欲盡也。病人煩燥。自覺熱甚。他人以手按
其肌膚。則冷。此爲無根失守之火。散亂爲熱。非實熱
也。乃水極反似火。陰症類似陽也。若不識此。誤用涼
藥下咽。卽死。當用羌活附子湯。加宮桂人參木香陳
皮半夏砂仁。急溫其下。令其陽回。陰火降。呃忒乃止
也。若陰症及因胃寒。呃忒不止者。外用乳香硫黃散
。法內用丁香柿蒂散服之。則止。再灸期門中脘氣

壽關元。此良方也。但手足溫煖。脉重者。為有生矣。又
有瘀血而疔。瘀有形物也。壅塞其間。雖柿蒂亦不應。
瀉心湯

治胃熱呃逆而便軟者。

半夏

下

黃芩

中

乾姜

下

人參

下

黃連

上

甘草

下

加茯苓

陳皮

水姜煎服

加味小柴胡湯

本方行
加減

湯

治陽虛口苦。脈沉。沉於胸膈間。或潮熱呃忒者。

軟柴胡 黃芩

中

半夏

炙甘草

人參

調下

心下痞。加枳實黃連。○渴加天花粉知母。○

心煩加姜汁黃連。○水姜煎溫服。

橘皮半夏生姜湯

本方自有
加減法

治伏痰飲呃忒者。

陳皮

半夏

生姜

加茯苓

枳實

桔梗

砂仁

心煩加姜汁黃連。○水姜煎加姜汁服。

全生集
卷之三
三
下六
羌活附子湯

本方自有
加減法

治陰症寒極嘔逆呃忒者。

羌活

上

附子

上

茴香

中

丁香

中

乾姜

下

甚者加吳茱萸官桂砂仁人參陳皮○寒氣
逆上加沉香○腹中痛加良姜○水姜煎磨
木香姜汁溫服之。

丁附理中湯

本方自有
加減法

寒呃

治胃寒呃逆及治服寒涼藥過多傷胃呃忒者。

丁香

附子中

乾姜中

人參

白朮中

甘草

加吳茱萸

腹

官桂

中

砂仁

中

陳皮

中

甚者加良姜

○冷氣逆止者

加沉香

○水姜

煎磨木香姜汁溫服

橘皮乾姜湯

治胃中虛寒呃逆者

橘皮

乾姜

加半夏

白朮

砂仁

人參

寒重不止。用前丁附理中湯甚良。

乳香硫黃散

治陰寒呃忒不止者。用此切法。

乳香

硫黃

艾

各二錢

爲細末。用好酒一鍾煎數沸。乘熱氣使病人鼻嗅之外。用搗生姜擦胸前。最效。

丁香柿蒂散

治陰症呃逆。及胸中痞逆不止者。

丁香

柿蒂

各一錢五分

茴香

乾姜

良姜

陳皮

各爲細末用生姜湯

未止宜再服。

灸期門法

婦人屈乳頭向下盡處骨間動脈是穴男女乳
小者以手一指爲率陷中動脈是穴男左女右
灸三五壯