

仲景傷寒補亡論卷第九

河南郭雍撰次

汗後四十四條

不可吐五條

可吐十條

汗後四十四條

仲景曰二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不
徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證不
罷者不可下下之爲逆如此可小發汗設面色緣緣
正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不



足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人煩躁不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脈濇故知之常氏云可柴胡桂枝湯龐氏云用麻黃湯

又曰未持脈時叉手冒心師因教試令欬而不欬者此兩耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此常氏云可小柴胡湯雍曰先宜小建中湯

又曰發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘常氏云治

喘可麻黃杏子石膏湯雍曰傷水者五苓散

鈞厓曰宜小青

龍湯

又曰發汗後水藥不得入口爲逆若更發汗必吐下不止常氏云可小半夏加橘皮湯雍曰可類要四味

橘皮湯

又曰陽明病本自汗出醫更重發汗病已差尙微煩不了了者此必大便鞭故也以亡津液胃中乾燥故令大便鞭當問其小便日幾行若本小便日三四行今日再行故知大便不久出今爲小便數少以津液

當還入胃中故知不久必大便也常氏云可小柴胡湯雍曰小便少者津液還入胃則不須服藥也

又曰發汗多若重發汗者亡其陽讖語脈短者死脈自和者不死常氏云可小柴胡湯

又曰傷寒發汗已身目爲黃所以然者以寒濕在裏不解故也以爲不可下也於寒濕中求之常氏云可五苓散雍曰黃芪加茵陳湯

又曰病人有寒復發汗胃中冷必吐衄常氏云可理中丸烏梅丸



又曰太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者屬桂枝加附子湯龐氏曰小便難爲有津液可作汗若小便數不可誤認爲桂枝證也

又曰服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法

謂刺風池風府若形似瘧一日再三發者汗出必解屬桂枝

二麻黃一湯

又曰服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脈洪大者屬

白虎加人參湯

又曰傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急

反與桂枝湯欲攻其表此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之其脚卽伸若胃氣不和讞語者少與調胃承氣湯

又曰若重發汗復加燒鍼者與四逆湯雍曰此證首尾都無四逆證恐是字誤今詳重發汗復加燒鍼恐是火劫亡陽驚狂者則當與桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯若止是火逆因燒鍼煩躁則當與桂枝甘草龍骨牡蠣湯亦救逆也故恐四逆本是救逆

湯字校正日誤書入四逆一方也

又曰傷寒發汗已解半日許復煩脈浮數與桂枝湯
又曰發汗後身疼痛脈沈遲者屬桂枝加芍藥生薑
各一兩人參三兩新加湯

又曰發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者
可與麻黃杏子甘草石膏湯

又曰發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者
屬桂枝甘草湯

又曰發汗後其人臍下悸者欲作奔豚屬茯苓桂枝

甘草大棗湯

又曰發汗後腹脹滿者屬厚朴生薑半夏甘草人參湯

又曰發汗後病不解反惡寒者虛故也屬芍藥甘草附子湯

又曰發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣屬調胃承氣湯脈經作小承氣湯仍二證通爲一

又曰太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲

得飲水者少少與飲之令胃中和自愈若脈浮小便不利微熱消渴者屬五苓散

又曰發汗已脈浮數煩渴者屬五苓散

又曰傷寒汗出而渴者宜五苓散不渴者屬茯苓甘

草湯

又曰太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地屬真武湯

又曰傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者屬生薑瀉心湯



又曰傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而下利者屬大柴胡湯

又曰陽明病自汗出若發汗後小便自利者此爲津液內竭雖鞭不可攻之須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根大豬膽汁皆可爲導

又曰太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也宜調胃承氣湯

又曰大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者屬四逆湯也



又曰發汗後不解腹滿痛者急下之宜大承氣湯
又曰發汗多亡陽譫語者不可下與柴胡桂枝湯和
其榮衛以通津液後自愈

問曰古所謂陰陽交者何也素問三十三篇曰有病
溫者汗出輒復熱而脈躁疾不爲汗衰狂言不能食
病名陰陽交交者死也岐伯曰人所以汗出者皆生
於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪
却而精勝也精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣
也汗出者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不

能食者精無俾也汗而熱留者其壽可立而傾也

問曰素問言汗出而脈尙躁盛者死何也雍曰此則陰陽交也靈樞二十三篇曰熱病已得汗而脈尙躁盛此陰脈之極也死其得汗而脈靜者生熱病脈盛躁而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁得汗靜者生

又問曰何以謂之交也雍曰陰極則交陽陽極則交陰交則爭而亂矣故不可極也有生者何如曰靜則生交則死也陰脈脈靜陽脈人靜皆生之證也



問曰何以謂之盛躁雍曰靈樞九篇所謂人迎一盛
二盛三盛脈口一盛二盛三盛者此之謂盛也一盛
而躁二盛而躁三盛而躁此之謂躁也極者何也人
迎脈口四盛皆爲極矣人迎四盛名曰溢陽爲外格
脈口四盛名曰溢陰爲內關內關外格死不治卽陰
陽交也人迎不爲衰陽交也脈口不爲衰陰交也脈
口卽氣口也

問曰有躁而不盛者何如雍曰靈樞二十三篇曰熱
病已得汗出而脈尙躁喘且復熱勿膚刺喘甚者死

是也此雖不盛而喘亦非其宜故喘甚則死也

問曰有煩滿不爲汗解者何也雍曰素問三十三篇
曰有熱病身熱汗出煩滿不爲汗解岐伯曰汗出而
身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥
巨陽主氣故先受邪少陰與其爲表裏也得熱則上
從之從之則厥也治之者表裏刺之飲之湯劑雍曰
仲景言傷寒感異氣變爲壞病如風溫溫毒之類則
此風厥亦其類也宜刺太谿崑崙服茯苓桂枝甘草
大棗湯

問曰汗後脈洪者何也雍曰洪大者非不爲汗衰衰而未得盡去非若躁盛全不爲汗衰也故仲景以爲可治之疾然洪大亦有輕重如一盛二盛之說若洪大而無他證者刺風池風府却與桂枝湯是也洪大而大煩渴不解者白虎加人參湯除其裏熱也其餘逐證不同者皆依仲景之法治之

問曰汗後飲水多者必喘而治熱病飲之寒水何也雍曰素問三十二篇曰諸治熱病以飲之寒水乃刺之必寒衣之居止寒處身寒而止也此謂治五藏熱

病各刺手足諸經證治與傷寒有異詳刺熱終篇可見故傷寒不可多飲水

問曰素問言熱病已愈時有所遺何也雍曰此謂勞復非汗後證勞復本證詳之

問曰汗後之證或治或不治何也雍曰汗後之證多矣動於脈者重見於證者輕如汗後脈盛躁是邪之曾不退也脈洪大者刺之如汗後尚發熱心下痞喘滿吐利小便或利或不利之類皆正病已衰餘毒未退依仲景隨證治之則愈



千金翼曰發汗後身熱又重發其汗胃中虛冷必反吐也雍曰宜小建中湯四味橘皮湯

又曰發汗後重發其汗亡陽譏語其脈反和者不死服桂枝湯汗出大煩渴不解若脈洪大者與白虎湯不可吐五條

仲景曰太陽病當惡寒發熱今自汗出反不惡寒發熱關上脈細數者以醫吐之過也若得病一二日吐之腹中飢口不能食三四日吐之者不喜糜粥欲飲冷食朝食暮吐以醫吐之所致也此爲小逆常氏云

