

亥23

7-2412



少陰篇方

麻黃附子細辛湯

麻黃

二兩
去節

細辛

二兩

附子

一枚炮去
皮破八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸

藥煮取三升去滓溫服一升日三服

王晉三曰少陰得太陽之熱而病者用麻黃發太
陽之表汗細辛散少陰之浮熱相須爲用欲其引
麻黃入於少陰以出太陽陷入之邪尤藉熟附合

表裏以溫經、外護太陽之剛氣、內固少陰之腎根、
則津液內守、而微陽不致外亡、此從裏達表、由陰
出陽之劑也、

余按仲景用麻黃、先煮一二沸、去上沫者、取其發
表迅速也、先者減水二升者、殺其輕揚之性、欲其
徐緩與諸藥和合同行也、此方細辛附子皆少陰
裏藥、欲使麻黃和合、由裏祛邪出表、故麻黃先煮、
減水二升、則與前之葛根湯先煮麻葛同一義也、

王晉三言先煮爲先發汗，後煮爲後固表。夫開泄腠理，方能發汗；固表則汗不能出矣。藥之氣味和合爲一行，則同行；止則同止。豈有先能發汗，後能固表之理？而一方中既欲其發，又欲其止，則自相牽制，反使營衛之氣逆亂。仲景安有如是之法？豈非穿鑿以惑後學哉？無論藥之氣味，卽一切食物久煮，則氣味俱減，其功力自緩矣。若麻黃久煮，功力旣緩，豈反能先發其汗乎？必無此理，更可見也。

麻黃附子甘艸湯

麻黃

二兩去節

附子

一枚炮去皮破八片甘艸二兩炙

右三味以水七升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

王晉三曰少陰無裏證而欲發汗者當以熟附固腎不使麻黃深入腎經劫液爲汗更妙在甘艸緩麻黃之中焦取水穀之津爲汗則內不傷陰邪從表散必無過汗亡陽之慮矣

余按前方細辛發散少陰裏邪故久煮麻黃欲其

緩行同細辛祛邪出表此方甘艸守中合附子則

固其陽氣故煮麻黃一二沸欲其迅速開泄則附

子助少陰之陽而寒邪外出若麻黃久煮又有甘

艸緩之其力不足以出邪矣於此更可見仲景用

麻黃之法也夫肺爲華蓋而朝百脈故各臟腑之

精氣皆由脈而注於肺然後敷布周身輸於皮毛

王晉三言附子甘艸固腎安中勿使麻黃入腎經

劫液於中焦取水穀之津爲汗者爲因汗由精氣
所化出於各臟腑故也非是麻黃能入腎劫液入
胃取津者讀者勿以辭害義也

附子湯

附子 二枚去
皮生用

茯苓 三兩
去皮

白芍 三兩

人參 二兩

白朮 四兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三
服

王晉三曰附子湯少陰固本禦邪之劑功在倍用
生附力肩少陰之重任故以名方其佐以太
藥者扶少陰之陽而不調太厥之開闔則少陰之
樞紐終不得和故用白朮以佐太陰之開白芍以
收厥陰之闔茯苓以利少陰之樞獨是少陰之邪
從陰內注於骨苟非生附焉能直入少陰注於骨
間散寒救陽尤必人參佐生附方能下鼓水中之
元陽上資君火之熱化全賴元陽一起而少陰之

病霍然矣。再論藥品與真武相同，唯生熟分兩各異。其補陽鎮陰之分歧，只在一味轉旋。學者所當深心體究。

余按此方與真武湯相類，而有表裏之分。此以人參佐生附以助元陽，祛寒出表；彼用熟附合白朮芍藥固脾腎之陰陽，以生薑辛溫通胃陽，佐茯苓泄水氣，是崇土制水之法，故名真武。此助陽以祛少陰之寒，故重用生附以名湯也。

四逆湯

甘草 二兩

干薑 一兩半

附子 一枚 去皮 生用

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服
強人可用大附子一枚干薑二兩

王晉三曰四逆者四肢逆冷因證以名方也凡三
陰一陽證中有厥者皆用之故少陰用以救元海
之陽太陰用以溫臟中之寒厥陰薄厥陽欲立亡
非此不救至於太陽誤汗亡陽亦用之者以太少

爲水火之主，非交通中土之氣，不能內復真陽，故以生附子生干薑，徹上徹下，開闢羣陰，迎陽歸舍，交接於十二經，反複以炙甘草監之者，亡陽不至於大汗，則陽未必盡亡，故可緩制留中而爲外召陽氣之良法。

余按厥陰爲陰陽交接之地，少陽相火寓於中，所以厥後發熱，熱後又厥，陰陽相爭，寒熱錯雜，與少陰太陰之寒厥迥殊，故凡用四逆湯各條，非厥陰

本證、歷來未曾分清、余於本論已辨其義、摘出歸

於太少兩篇、以其陽陷則厥、陽伸則熱、故仲景言

熱深則厥深、謂其陽氣隨邪熱而陷深、故厥深不

同太陰少陰之寒勝亡陽而厥、可用四逆湯回陽

故仲景止用灸法、從表引其內陷之陽、不用薑附

四逆湯、恐其反助熱邪以焚木也、況內經所云薄

厥者、由大怒動火、陰不勝陽、陽亢氣逆而厥、豈可

更用辛熱以涸陰乎、此毫釐千里之謬、歷來迷誤、

不可不辨以王晉三之高明猶謬引薄厥之證豈
非迷誤者哉

白通湯

葱白

四莖

干薑

一兩

附子

一枚去皮
生用

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

王晉三曰白通者薑附性燥腎之所苦須藉葱白
之潤以通於腎故名若夫金匱云面赤者加葱白
則是葱白通上焦之陽下交於腎附子啓下焦之

陽上承於心，干薑溫中土之陽，以通上下，上下交，水火濟，利自止矣。按脈之生，原下起於腎，由腎而中歸於胃，由胃而上出於心，由心而大會於肺，外出於經脈，三者能變通於上下，亦由是也。

白通加豬膽汁湯

人尿 五合

豬膽汁 一合

葱白 四莖

干薑 一兩

附子 一枚，去皮，生用

右以水三升，先煮三味，取一升，去滓，內膽汁、人尿。

和令相得分溫再服若無膽亦可用

王晉三日白通湯陽藥也少陰下利寒氣太甚內
有格拒陽氣逆亂當用監制之法人尿之鹹勝膽
汁之苦猪膽之苦勝薑葱附之辛辛受制於鹹苦
則鹹苦爲之向導便能下入少陰俾冷性消而熱
性發其功乃成

余按陰陽之氣互相爲根故可互相爲用此方卽
內經反佐之法也以其下利脈微先與白通湯辛

熱助陽以辟寒邪而利不止反厥逆無脈干嘔而
煩者其本身陽微欲絕寒邪格拒故辛熱之藥不
能入而反佐鹹苦陰寒爲引導然後熱藥得入以
回垂絕之陽故又曰脈暴出者死微續者生以脈
微續則陽氣漸回脈暴出陽卽外脫也蓋寒熱之
藥同煎則氣味相和化爲溫平此方熱藥煎好然
後和入寒藥則各行其性導引陽藥入陰使陰陽
交通而無格拒之患此陰陽互相爲用由其互相

爲根故也。可知仲景之法，皆本陰陽氣味，裁制權宜而配合者，義理精微，有難言喻。王晉三多舉內經制勝之理以解之，亦足以啓發後學也。

通脈四逆湯

甘草 三兩炙

附子 大者一枚，去皮生用 干薑 三兩，強人可用四兩

右三味以水三升，煮取一升二合，去滓，分溫再服。其脈卽出者愈。後有加減法，已列證治條下。

余按前方白通加人尿猪膽汁以治陰盛格陽之

