

中焦篇以白虎承
氣瀉心三方為其時
仍不能脫出傷寒
論圈子

傷寒言剛濕病寒
柔下法有增液黃
龍等法甚妙惟白
虎症之較輕者何
不用鮮石斛以代
鮮生地等味以代
石膏乎瀉心湯之
黃連或不可代也
于清宣湯中少加
黃芩而不用矣
總之白虎瀉心承
氣三方極其太剛
濟以柔則得之矣

溫病條辨中焦篇

汪瑟菴先生叅訂

吳 瑭鞠通氏著

徵以園先生同參

慈溪葉氏澐吾樓重鐫

朱武曹先生點評

梅橋阮志銳校字

風溫 溫熱 溫疫 溫毒 冬溫

①而目俱赤語聲重濁呼吸俱粗大便閉小便濇

舌苔老黃甚則黑有芒刺但惡熱不惡寒日晡益

甚者傳至中焦陽明溫病也脉浮洪躁甚者白虎

湯主之脉沉數有力甚則脉體反小而實者大承

湯主之脉沉數有力甚則脉體反小而實者大承

卷二 中焦篇



石羔稟秋金燥烈
之性故其氣剛悍
不中稟秋金之令
平甚多如桑白皮
等類用以平其燥
氣較勝于石羔乎
也此席笑而風生
乎而異性則柔矣

心陽

氣湯主之暑溫濕溫瘧不在此外

陽明之脈榮於面傷寒論謂陽明病面緣緣正

赤火盛必克金故目白睛亦赤也語聲重濁金

受火刑而音不清也呼吸俱粗謂鼻息來去俱

粗其粗也平等方是實證若來粗去不粗去粗

來不粗或竟不粗則非陽明實證當細辨之粗

則喘之漸也大便秘陽明實也小便濇火腑不

通而陰氣不化也口燥渴火燥津也舌苔老黃

肺受胃濁氣不化津也按靈樞論諸臟溫病獨

肺溫病有舌苔之明文

餘則無有。可見舌苔乃胃中濁。甚則黑者。黑水
氣薰蒸肺臟。肺氣不化而然。色也。火極而似水也。又水勝火。大凡五行之極
盛。必兼勝已之形。芒刺苔久不化。熱極而起堅
硬之刺也。倘刺軟者。非實證也。不惡寒。但惡熱
者。傳至中焦。已無肺證。陽明者。兩陽合明也。溫
邪之熱。與陽明之熱相搏。故但惡熱也。或用白
虎。或用承氣者。證同而脉異也。浮洪躁甚。邪氣
近表。脉浮者。不可下。凡逐邪者。隨其所在。就近
而逐之。脉浮則出表為順。故以白虎之金。應以

退煩熱若沉小有力病純在裏則非下奪不可
矣故主以大承氣按吳又可溫疫論中云舌苔
邊白但見中微黃者卽加大黃甚不可從雖云
傷寒重在誤下溫病重在誤下卽誤下不似傷
寒之逆之甚究竟承氣非可輕嘗之品故云舌
苔老黃甚則黑有芒刺脈體沉實的係燥結痞
滿方可用之

或問子言溫病以手經主治力關用足經藥之
非今亦云陽明證者何陽明特非足經乎曰陽

明如市。胃爲十二經之海。土者萬物之所歸也。諸病未有不過此者。前人云。傷寒傳足不傳手。誤也。一人不能分爲兩截。總之傷寒由毛竅而谿谿。肉之分理之小者。由谿而谷。谷肉之分理之大者。由谷而孫絡。孫絡。絡之至細者。由孫絡而大絡。由大絡而經。此經卽太陽經也。始太陽終厥陰。傷寒以足經爲主。未始不關手經也。溫病由口鼻而入。鼻氣通於肺。口氣通於胃。肺病逆傳則爲心包。上焦病不治則傳中焦。胃與脾

着

了

也中焦病不治即傳下焦肝與腎也始上焦終
下焦溫病以手經為主未始不開足經也但初
受之時斷不可以辛溫發其陽耳蓋傷寒傷人
身之陽故喜辛溫甘溫苦熱以救其陽溫病傷
人身之陰故喜辛涼甘寒甘鹹以救其陰彼此
對勘自可瞭然於心目中矣

白虎湯

方見上焦篇第十三頁

大承氣湯方

大黃

六錢

芒硝

三錢

厚朴

三錢

枳實 三錢

先煮枳朴去水半
入大黃二升去水半生
渣入芒硝並一沸

其並注亦有妙義用
水半煮枳朴取五升去
滓內大黃再煮取二升
內芒硝何哉蓋生者
氣銳而先行熟者氣
純而和緩仲至理使芒
硝先化枳朴去其健固
地道而後枳朴除其滯
滿順其氣以正其邪也
也仲景立法精者其
妙不可思議矣

的解

水八杯。先煮枳朴。後納大黃芒硝。煮取三杯。先服
一杯。約二時許。得利止。後服。不知。再服一杯。再不
知。再服。

方論此苦辛通降。鹹以入陰。法承氣者。承胃氣
也。蓋胃之為腑。體陽而用陰。若在無病時。本係
自然下降。今為邪氣蟠踞於中。阻其下降之氣。
胃雖自欲下降。而不能。非藥力助之不可。故承
氣湯通胃結。救胃陰。仍係承胃腑本來下降之

穢物主不去由桂系
三不順也故攻積三劑
必用藥分三葉以然亦
為君硝黃為臣也名之
曰大味多性烈制大其
服法其大壯下也此件
至氏有下三重傷其
陰云大戒後有下三
急救其陰之活法
用此湯者須細心俾
膚不可盡浪所耗神
而陰之存乎其入矣

氣非有一毫私智穿鑿於其間也。故湯名承氣。

學者若真能透徹此義。則施用承氣。自無弊竇。

大黃蕩滌熱結。芒硝入陰軟堅。枳實開幽門之

不通。厚朴瀉中宮之實滿。厚朴分量不似傷寒論中重用者。治溫與

治寒不同。曰大承氣者。合四藥而觀之。可謂無

畏其燥也。堅不破。無微不入。故曰大也。非真正實熱蔽痼。

氣血俱結者。不可用也。若去入陰之芒硝。則云

小矣。去枳朴之攻氣結。加甘草以和中。則云調

胃矣。



香港大學醫學院圖書館藏

②陽明溫病脉浮而促者。減味竹葉石膏湯主之。
脉促。謂數而時止。如趨者過急。忽一蹶然。其勢
甚急。故以辛涼透表重劑。逐邪外出則愈。

減味竹葉石膏湯方

辛涼合甘寒法

竹葉

五錢

石膏

八錢

麥冬

六錢

甘草

三錢

水八杯。煮取三杯。一時服一杯。約三時令盡。

③陽明溫病。諸證悉有而微。脉不浮者。小承氣湯

微和之。

以陽明溫病發端者指首條所列陽明證而喜也。後凡言陽明溫病者倣此。諸證悉有。以非下不可。微則未至十分亢害。但以小承氣通和胃氣則愈。無庸芒硝之軟堅也。

④陽明溫病。汗多譫語。舌苔老黃而乾者。宜小承氣湯。

汗多。津液散而大便結。苔見乾黃譫語。因結糞而然。故宜承氣。

⑤陽明溫病。無汗。小便不利。譫語者。先與牛黃丸。

不大便再與調胃承氣湯

無汗而小便不利。則大便未定。成鞭。譫語之不

因燥屎可知。不因燥屎而譫語者。猶係心包絡

證也。故先與牛黃丸。以開內竅。服牛黃丸內竅

開。大便當下。蓋牛黃丸亦有下大便之功能。其

仍然不下者。無汗則外不通。大小便俱閉。則內

不通。邪之深結於陰可知。故取芒硝之鹹寒。大

黃甘草之甘苦寒。不取枳朴之辛燥也。傷寒之

譫語。舍燥屎無他證。一則寒邪不兼穢濁。二則

由太陽而陽明溫病。嚴語有因燥尿有因邪陷。心包一則溫多兼穢。二則自上焦心肺而來。學者常須察識。不可歧路亡羊也。

⑥陽明溫病。面目俱赤。肢厥甚則通體皆厥。不瘧。癡但神昏不大便。七八日以外。小便赤。脉沉伏。或並脉亦厥。胸腹滿堅甚。則拒按。喜涼飲者。大承氣湯主之。

此一條須細辨其的是火極似水。熱極而厥之證。方可用之。全在目赤。小便赤。腹滿堅。喜涼飲。

定之。

大承氣湯

方法見前第四頁

⑦陽明溫病。純利稀水無糞者。謂之熱結旁流。調胃承氣湯主之。

熱結旁流。非氣之不通。不用枳朴。獨取芒硝入陰以解熱結。反以甘草緩芒硝急趨之性。使之留中解結。不然結不下而水獨行。徒使藥性傷人也。吳又可用大承氣湯者非是。

⑧陽明溫病實熱壅塞為噤者下之。連聲噤者中

此亦作篇

焦聲斷續時微時甚者屬下焦。

金匱謂噦而腹滿。視其前後。知何部不利。利之即愈。陽明實熱之噦。下之裏氣得通則止。但其兼證之輕重。難以預料。故但云下之而不定方。以俟臨證者自爲採取耳。再按中焦實證之噦。噦必連聲緊促者。胃氣大實。逼迫肺氣不得下降。兩相攻擊而然。若或斷或續。乃下焦衝虛之噦。其噦之來路也遠。故其聲斷續也。治屬下焦。

九陽明溫病。下利。讞語。陽明脈實。或滑疾者。小承



中國醫藥大學圖書館藏

氣湯主之。脉不實者。牛黃丸主之。紫雪丹亦主之。

下利譫語。柯氏謂腸虛胃實。故取大黃之濡胃。

無庸芒硝之潤腸。本論有脉實。脉滑疾。脉不實。

之辨。恐心包絡之譫語。而誤以承氣下之也。仍

主芳香開竅法。

小承氣湯方

苦辛通法重劑

大黃

五錢

厚朴

二錢

枳實

一錢

水八杯。煮取三杯。先服一杯。得宿糞止。後服。不知

再服

溫邪惡燥枳
朴減原方分
數極見斟酌

調胃承氣湯

熱滯於內治以鹹寒佐以甘苦法

大黃

三錢

芒硝

五錢

生甘草

二錢

牛黃丸

方論並見上焦篇第二十四頁

紫雪丹

方論並見上焦篇第二十五頁

⑩溫病三焦俱急。大熱大渴。舌燥。脉不浮而躁甚。舌色金黃。痰涎壅甚。不可單行承氣者。承氣合小陷胸湯主之。

三焦俱急。謂上焦未清。已入中焦陽明。大熱大渴。脉躁苔焦。陽土燥烈。煎熬腎水。不下則陰液



立見消亡。下則引上焦餘邪陷入恐成結胸之證。故以小陷胸合承氣湯。滌三焦之邪。一齊俱出。此因病急。故方亦急也。然非審定是證。不可用是方也。

承氣合小陷胸湯方

苦辛寒法

生大黃

五錢

厚朴

二錢

枳實

二錢

半夏

三錢

桔蘐

三錢

黃連

二錢

水八杯。煮取三杯。先服一杯。不下。再服一杯。得快利。止後服。不便再服。

