

赤水玄珠第七卷目錄

咳嗽門

喘門

氣短 氣促 少氣 產後喘

哮門

善悲 肺痿 肺癰

赤水玄珠第七卷

新安生生子孫一奎著輯

咳嗽門

臟腑皆有欬

黃帝問曰肺之令人咳何也岐伯對曰五臟六腑皆令人

欬非獨肺也帝曰願聞其狀岐伯曰皮毛者肺之合也

皮毛先受邪氣邪氣以從其合也此邪從外受之王注云邪謂寒氣其

寒飲食入胃從肺脉上至於肺則肺寒寒邪從外受也肺寒則

外內合邪因而客之則為肺欬所謂肺先受邪也五臟各以其

時受病王注云時謂正月也非其時各傳以與之人與天地相參

故五藏各以治時感於寒則受病微則為欬甚則為泄

赤水玄珠

為痛乘秋則肺先受邪乘春則肝先受之乘夏則心先

受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之帝曰何以

異之岐伯曰肺欬之狀欬而喘息有音甚則吐血取大淵穴

也心欬之狀狀則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫喉痺

取太陵穴也肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以轉轉則

兩胛下滿取太衝穴也脾欬之狀欬則右脇下痛陰陰引肩

背甚則不可以動動則欬劇取太白穴也腎欬之狀欬則腰

背相引而痛甚則欬涎取太溪穴也帝曰六腑之欬奈何安

所受病岐伯曰五臟之久欬乃移於府脾欬不已則胃

受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長蟲出取三里穴也肝欬不

已則膽受之膽欬之狀欬嘔膽汁取陽陵泉穴也肺欬不已則

大腸受之大腸欬狀欬而遺失取巨虛上廉也心欬不已則小

腸受之小腸欬狀欬而失氣氣與欬俱失取巨虛下廉也腎欬

不已則膀胱受之膀胱欬狀欬而遺溺取委中穴也久欬不

已則三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚

於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也取支溝穴帝曰

治之奈何岐伯曰治臟者治其俞治府者治其合浮腫

者治其經見欬論

按素問曰咳嗽煩寃者是腎氣之逆也示從容篇一陽發病少

氣善欬善泄 夏脉不及則令人上見咳唾下為氣泄

凡咳嗽面赤胸腹脇常熱惟於足乍有涼時其脉洪者熱

痰在胸膈也宜小陷胸湯礞石丸之類清膈降痰甚而

不已者宜吐下其痰熱也面白悲噎或脇急脹痛或脉
沉絃細遲而咳者寒飲在胸腹也宜辛熱去之

脉治

脉經曰關上脉微爲欬

脉緊者肺寒雙弦

者寒

欬而脉弦濇爲少血

浮緊者虛寒

脉細傷濕

脉浮而緩傷風

數則爲熱沉數者裏熱

脉弦爲水偏弦爲飲

洪滑多痰

脉沉爲留飲

肺脉微急爲欬而唾血

欬脉浮直者生浮軟者生

欬證死脉

欬而脉緊者

瘦而羸瘦脉形堅大者

肌瘦下脫形熱不去

欬而脫形發熱脉小堅急者

咳而嘔腹脹且泄其脉弦急者皆死不治

仲景曰人嗽十年其脉弱者可治實大數者死其脉虛者

必苦冒其人本有支飲在胃中故也治屬飲家 上氣

面浮腫肩息其脉浮大不治又加利尤甚 脉浮短者

其人肺傷諸氣微少不過一年死法當嗽也 欬嗽羸

瘦脉形堅大者死 欬而脫形身熱脉小堅急以疾是

逆也不過十五日死全文見診

論欬與嗽本一證

子和云內經陰陽應象論云秋傷於濕冬生欬嗽五臟生
成篇云欬嗽上氣診要經終篇云春刺秋分環爲欬嗽
示從容篇云欬嗽煩寃者腎氣之逆也此四篇中連言
咳嗽其餘篇中止言欬而不言嗽如生氣通天論云秋
傷於濕上逆而咳與大象論文義同而無嗽字乃知咳
卽嗽明矣

謹按欬與嗽本兩字義內經已作一證連言之愚詳大抵
欬者氣動也陽也嗽者兼血也陰也況是證其本雖殊
其標則一故世俗不以爲疑唯潔古發內經微旨其義
見下

病幾幾要云欬謂無痰而有聲市氣傷而不青也欬胃無

聲而有痰脾濕動而爲痰也咳嗽謂有聲有痰也因傷肺氣動於脾濕而然也夏月嗽而發熱者謂之熱嗽小柴胡四兩加石膏一兩知母半兩冬月嗽而發寒熱謂之寒嗽小青龍加杏仁服之蜜煎生姜湯蜜煎橘皮湯燒生姜胡桃皆治無痰而嗽者此乃大例更當隨時隨證加減之痰而能食者大承氣微下之痰而不能食者厚朴湯主之

論嗽分六氣無熱無寒

子和因素問言皮毛者肺之合也邪因而客之則爲肺欬後人見是斷嗽然可以辯其六者之狀風乘肺者日夜無度汗出頭痛痰涎不利

熱乘肺者急喘而嗽面赤潮熱手足寒乳子亦每多有之

火乘肺者咳喘上壅涕唾出血甚者七竅血溢

燥乘肺者氣壅不利百節病痛頭面汗出寒熱往來皮

膚乾燥細瘡燥痒大便秘澁涕唾稠粘

寒乘肺者或因形寒飲冷冬月卧濕地或冒冷風寒秋
冬水冷中感之嗽急而喘此非六氣之云乎

論濕痰主嗽

潔古曰嗽者秋傷于濕積於脾經曰秋傷於濕冬必欬嗽
大抵素秋之氣宜清而肅反動之則氣必上衝而爲欬
嗽甚則動于濕而爲痰也是知脾無留濕雖傷肺氣不

爲痰也有痰者寒少熱多名隨五臟而治之但今清在
肝經謂之風痰也濕在心經謂之熱痰濕在脾經謂之
濕痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰宜隨證
而治之欬而無痰者以辛甘潤其肺欬而嗽者治痰爲
先故以南星半夏勝其痰而嗽自愈枳殼陳皮利其氣
而痰自下

劉宗厚曰按此論欬因濕在於經致痰爲欬五臟亦皆有
之可謂發內經之秘矣然至氣鬱津液不降或停水飲
所致或腎氣虛弱火炎水涸津液湧而爲痰涎於上此
氣飲及真臟爲病非諸經留濕致病也故易老云半夏
止能洩痰之標而不能治痰之本是矣

丹溪曰咳嗽有風寒有火有痰有勞有肺脹風寒者鼻塞
聲重惡寒是也宜發散行痰又有聲啞及喘嗽遇冬則
發皆爲寒包熱也解表則熱自除感冷則嗽膈上有痰
也宜解表豁痰火者有聲痰少面赤是也勞者盜汗出
兼痰多吐紅作寒熱是也宜補陰清金痰者嗽動便有
痰出痰出嗽止是也主豁痰肺脹者動則喘滿氣急聲
重者是也宜收斂此因火傷極遂成抑遏脹滿肺脹抑
遏不得眠者難治

飲水一二口而暫止者熱嗽也呷熱湯而暫停者冷嗽也
熱嗽以小柴胡湯冷嗽理中湯並加五味子

又有先因傷濕傷寒解利不盡病雖退然飲食減少不生

肌肉身倦無力稍勞則體熱痠痛狀如勞症但不吐血
不發潮熱經二三年此是餘毒伏在經絡其脉弦再發
則愈

又有咳而不思食飲此皆痰聚於胃關於肺令人多涕唾
而面浮腫此氣逆也謂氣上逆肺壅而不下治以異功
白朮散

治嗽最要分肺虛實新嗽挾虛者可用人參風寒邪盛及
久嗽熱鬱者切不可用五味子亦然

凡飲酒後嗽甚者熱嗽也飲酒後嗽減者寒嗽也涎稠黃
者爲熱青白者爲寒

凡嗽春是春升之氣或外感夏是火炎上最重秋是濕熱

赤水玄珠 卷六
傷肺冬是風寒外束也

丹溪曰上半日嗽多屬胃中有火用貝母石膏降胃火午
後嗽多屬陰虛必用四物湯加知母炒柏先降其火黃
昏嗽多此火氣浮於肺不宜用涼藥宜五味子五倍子
歛而降之

治嗽藥大槩多用生姜以其辛散也 咳逆非蛤粉青黛

瓜萋貝母不除 有痰者加痰藥 用藥發散之後必

以半夏逐其痰庶不再來 治嗽多用栗壳不必疑但

要先去病根此收後藥也

夫咳之爲病有一咳則出痰者脾勝濕而痰滑也有連欬

十數聲不出痰者肺燥勝痰燥也骨者宜南星半夏皂

角風之屬燥其脾若和氣之齊所當忌也滋者宜杜
紫蘇杏仁之屬利其肺若燥肺之劑所當忌也

咳嗽口燥咽乾有痰不用半夏用瓜蒌貝母 飲水者不
用瓜蒌恐滯膈不快

乾咳嗽

乾咳嗽者無痰出而欬咳連聲者是也此本於氣澁澁之
微者欬十數聲方有痰出澁之甚者雖咳十數聲亦無
痰出

丹溪云乾咳嗽極難治此係火鬱之症痰鬱火邪在申以
苦桔梗開之下用補陰藥不已卽成勞倒倉法好此不
得志者有之宜用補陰方四物湯加竹瀝炒柏之類

陰虛欬四物湯加竹瀝姜汁主之 陰分嗽者多屬陰

虛治用知母勿用生姜以其辛散故也 肺虛嗽此好

色腎虛者有之人參膏以陳皮生姜佐之

治咳嗽疎表之劑

仲景厚朴麻黃湯 欬而脉浮者

厚朴五兩 麻黃四兩 石膏二兩 杏仁半升 半夏半升

乾姜二兩 細辛二兩 小麥一升 五味子半升

右以水一斗三升先煮小麥熟去渣納諸藥煮取三

升溫服一升一日三服

三拗湯 治欬嗽感冒風寒鼻塞聲重 方在傷風門

敗毒散 治痰嗽身熱鼻塞 方在瘟疫門

葶藶散 治感寒而嗽胸滿聲重

蘇子 陳皮 赤茯苓 桑白皮 麻黃各一兩

炙甘草五錢 每服八錢入姜水煎服

橘蘇散 治傷風欬嗽身熱有汗

陳皮 蘇葉 杏仁 五味子 半夏 桑白皮炒

貝母 白木各錢半 甘草六分 姜二片水煎

神木散 治四時瘟疫發熱惡寒及傷寒咳嗽

蒼朮五兩 白芷 細辛 羌活 川芎 炙甘草各一兩

每服五錢姜三片葱白三寸水煎服

若傷風鼻塞可為末以葱茶調下

金佛草散 治感寒咳嗽發熱惡寒無汗

赤水玄珠

荆芥兩四

麻黃去節

前胡各三錢

炙甘草

赤芍藥

半夏

各一錢

旋覆花

三錢

分二服每姜三片水煎服

橘皮湯

治冷嗽

陳皮

紫苑

麻黃

當歸

杏仁

炙甘草

黃芩

各二錢

分二服水煎服

治暑嗽之劑

白朮湯

治欬而脉細

白朮

白茯苓

半夏

各等分每服一兩水一鍾半

姜三片煎調神麴末二錢一方加黃芩

白朮木香散

喘嗽腫滿欲變水氣者

白朮

猪苓

甘草

澤瀉

木香

檳榔

各三兩