

杏苑生春

卷之五



發刻醫家必究

五卷下

○諸血

血上出口鼻皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣升越出上竅又因憂思勞傷于脾肺喜怒傷于肝心過飽負重酒醉房勞傷于胃氣皆有吐衄之患蓋鼻通于腦血上溢於腦又行清道一以從鼻而出則爲衄血五臟有傷血入濁道留聚膈間流入胃脘則爲吐血治此二者當補陰抑陽調攝五臟使氣降則血歸經矣吐衄太甚卒不能止防其血瘕用茅根放在炭火中以醋洒於鼻邊嗅之以遏其勢或驀然以水噴其面使載驚則止非特衄血五竅出血亦宜此法以水沃澡驚則血止有心肺脉破氣血妄行勢若湧泉口鼻俱出須臾不救咯血乃肺燥血竭嗽血乃肺熱咳出唾中紅絲乃是肺痿此三者是火刑金候最難調

治舌上血出。謂之舌衄。血從毛孔中出。謂之肌衄。齒縫血出。謂之齒斷宣露。及撲跌肺癰。傷寒欲解。俱有吐衄。各當以類求治。諸見血。身熱脉大而數。難治。是火邪勝也。身涼脉靜者。易治。是正氣復也。故脉得沉細。身寒則生。洪數身熱則死。學者詳之。

○脉症先容

內經曰。脉來如懸鉤。為衄血。脉至而搏。血衄。身熱者。十無二治。癰下膿血。脉數則死。沉小則生。

脉經曰。諸澁濡弱為亡血。脉孔為失血。瀆為少血。

凡咯血吐血。脉滑小弱者。生。實者死。

夫血者。神氣也。持之則存。失之則亡。是以血盛則形盛。血衰則形衰。神靜則陰生。形沒則陽亢。陽亢則陰虧矣。故凡血上出者。滋陰降火為本。下行者。提氣涼血為先。降火不越重。

便非汙涼血不外生地黃連大法以四物湯爲主加減
山梔最能清胃脘之血。

川芎乃血中之氣藥通肝經性味辛散能行血滯於氣

地黃乃血中之血藥也通腎經性味甘寒生損陰之不足

當歸乃血中之王藥分三治頭止血身養血稍行血性味辛溫

通肝經全用能使氣血各歸其所故以當歸名焉

芍藥陰分血藥也通脾經性味酸寒能和血治虛腹痛血滯者

宜桃仁紅花蘇木血竭牡丹皮之類加減於合四物湯血

崩者宜蒲黃阿膠地榆百草霜棕櫚灰之類加減於合四

物湯

血痛者宜乳香沒藥五靈脂凌霄花之類加減合四物湯

血虛者宜當歸熟地萸蓉瑣陽牛膝枸杞益母草夏枯草龜板

之類。加減合四物湯。

血燥者。宜乳酪白蜜酥油之類。加減合四物湯。

血寒者。宜乾薑之類。加減合四物湯。

血熱者。宜生地苦參之類。加減合四物湯。

凡諸血症。皆是陽盛陰虛。君相二火亢甚。煎迫其血。出於諸竅。宜以四物湯加知母。黃柏。補陰降火爲主。

如衄血。咳血。吐痰帶血絲出者。皆從肺出來。本方加酒岑。茅花。以瀉肺。

如衄血。吐血。從胃中來。本方加石膏。知母。以瀉胃火。如唾血。咯血。及潮熱。咳血。從腎中來。本方加梔子。黃柏。少加肉桂。以瀉腎中火。

如小便血。於溺孔中出。頻數作淋。作痛。或溲尿而出者。乃從膀



膀胱中來。本方加梔子。瞿麥。牛膝。滑石之類。瀉膀胱火。

如大便未糞而血先來者。謂之近血。乃從大腸中來。本方加檳榔。枳實。槐花。條芩之類。以瀉大腸經火。

如先大便而後血來者。謂之遠血。乃自小腸中來。本方加木通。茱萸。炒黃連之類。以瀉小腸經火。是也。

如血出口鼻者。本方加犀角。芩黃之類。以清之。或加茅花。棕櫚灰之類。以止之。或加童便。韭汁。山茶花。牡丹皮之類。以降之。

凡下血之症。不可純用寒涼之藥。必於寒涼藥中。加辛味爲佐。如久不愈。則用溫劑。必兼升降藥。加天酒煮。如酒煮黃連。丸之類。乃寒因熱用是也。

腸風臟毒。乃胃與大腸主之。蓋由坐臥風濕。或醉飽房勞。或食

生於停寒或因酒積熱以致榮衛失運滲入腸中此腸風
臟毒所由作也如挾熱下血褐而色黯腹內微痛為臟毒
如挾寒下血清而色鮮腸甚痛為腸風法宜先散解腸胃
風邪挾熱則用敗毒散挾冷則用不換金正氣散俱加用
芎藭歸其敗毒散宜加茯苓槐花不換金加茯苓木香雖
然精血皆生於谷氣故此症多以脾胃藥收功宜四君子
湯參苓白朮散枳殼散小烏沉湯皆有大効蓋胃氣一回
其氣血自循經矣

治上膈極熱而衄以黃芩茅花之類。

方黃芩茅花湯

黃芩

茅花

各二錢

白芍藥

一錢五分

甘草

一錢

右咬咀用水濃煎常服

病氣逆衝上血隨妄行而吐衄以四物湯加紫蘇子橘紅木香
童便或茅根煎湯磨沉香送下。方見三卷內

衄血吐血太過頭暈欲倒以十全大補湯主之。方見三卷內

上膈熱壅吐血以四物湯。方見三卷內加荊芥阿膠不止加大

黃滑石山梔子仁酒傷吐血以四君子湯加乾葛川芎山

梔子仁。蓋山梔能清胃口。方見四卷內。

吐衄氣升以蘇子降氣湯去桂加阿膠人參沉香煎調琥珀末
主之。

方蘇子降氣湯

當歸

甘草炙

前胡

厚朴各

錢

肉桂五分

橘紅一錢五分

半夏

紫蘇子

各二錢五分

右咬咀生薑五片。棗子二枚水煎不拘時服。

治乍感風寒痰吐血絲或吐鮮血以金沸草散去麻黃加桔梗

枇杷葉桑白皮主之方見三卷內

下虛上盛衄血吐血不止以四物湯加茅花煎入沉香汁主之

若不止以生蘿蔔汁滴入鼻孔中方見三卷內

吐血咳血衄血以必勝散主之吐甚加白茅根搗爛同煎

方必勝散

小蘗一錢五分 人參 蒲黃炒黑 當歸 熟地黃

川芎各一錢 烏梅一枚

石咬咀水煎熟食遠溫服

心肺為外邪所傷咳嗽吐血衄血以茯苓補心湯主之方見本卷內

暑毒攻心嘔吐鮮血以枇杷葉散去丁香加黃連主之方見三卷內

暑氣熱毒逼血妄行吐衄以茅花煎濃調五苓散治之方見三卷內



時毒身熱吐膿血者以陽毒升麻湯治之。方見三卷內。

病清道閉塞流入胃脘吐出清血或衄血不盡瘀積停留致面

目痿黃大便黑色以犀角地黄湯治之。方見三卷內。

吐血衄血服藥不止者以十灰散主之。方見本卷內。

病飲啖辛熱傷於肺經吐血名曰肺疽以大薊等之類。

大薊散

大薊草 犀角 升麻 桑白皮 杏仁

蒲黃 各七分 甘草 炙五分 桔梗 六分

右咬咀用生薑三片水煎食遠溫服。

諸見血不止自汗身熱以三黃補血之劑。

三黃補血湯

熟地黃 一升 生地黃 黃芪 當歸 各八分

柴胡 五分

升麻

牡丹皮

川芎 各五

白芍藥 六分

右咬咀水二鍾煎一鍾食前溫服。

肺勞傷肺經吐內有血咽痰不利。以鷄蘇散治之。

方鷄一散

薄荷 一錢

黃芪 一錢二分

生地黃

阿膠

貝母 各八分

白茅根 一錢五分 桔梗

麥門冬

蒲黃 各七分 微炒

甘草 炙五分

右咬咀用生薑三片水煎溫服。

病瘀血蓄胃。心下脹滿。食入即吐。名曰血逆。以赤芍藥湯治之。

方赤芍藥湯

赤芍藥

半夏

梔

各等分



右咬咀。用生薑七片。水煎。食遠濕服。

治氣促氣弱。精神短少。衄血吐血。以麥門冬飲子主之。

方見卷前

病衄血吐血。久而不已。以清肺之劑。

方清肺飲子

五味子

黃芪 各二錢

當歸身

麥門冬

生地黃

人參 各一錢五分

右咬咀。水二鍾。煎一鍾。食遠溫服。

病血氣妄行。勢若湧泉。口鼻俱出。須臾不救。以參栢散主之。如

無煎藥。用荊芥穗。燒存性。為末。米飲調下。三錢。亦無荊芥。

以釜底煤。另研細。米飲調下。二錢。立止。

方參栢飲

人參

側栢葉 各一兩

右為細末飲服二錢飛羅麴二錢和勻用新淚水調如稀麴糊服之。

病咯血乃血在咽下咯不出甚咯則有之。此津乏血乾以滋血潤喉湯主之。兼治喉間血腥氣。

方滋血潤喉湯

天門冬

生地黄 各一錢

麥門冬

當歸

各八分

知母

八分

青黛

五分

山梔仁

炒

牛膝

各五分

片黃芩

七分

貝母

六分

桔梗

六分

右咬咀。入生薑汁。同童便水煎。○如氣喘加杏仁六分。食遠溫服。

治鼻血不止。用龍骨為末。以煨熟葱白蘸塞鼻中。或百草霜亦能取効。

治吐血不止。用藕節搗汁。磨好京墨飲下。衄血亦妙。或白茅根

洗去土。搗汁常呷。

治腸風下血。用防風、荊芥、散腸、臍之風毒、當歸、川芎、調血、地榆

生地、槐花、條芩。涼下焦大腸之血熱。枳殼以利大腸氣。側

柏葉以止血。烏梅肉收大腸血熱。甘草瀉火和藥性。

方加減四物湯

防風 二錢 荊芥 八分 當歸 二錢 川芎 七分

地榆 一錢 生地 一錢 槐花 五錢 條芩 一錢

枳殼 八分 側柏葉 一錢 烏梅 一枚 生甘草 七分

右咬咀。水煎熟。空心服。

咯血。以天門冬丸。兼治吐血。方見本卷前。

咯血。用側柏葉、沙參各一兩。焙研為末。入飛麵二錢。水調如稀



糊啜服。或用生地黃。藕節搗汁。磨京墨。徐徐呷下。或用生薑片。蘸百草霜含嚥。

病大腸經氣鬱成濕熱。下痢膿血是也。

治法宜散鬱氣。除濕熱可也。經云辛可以散鬱。苦可以勝濕。是以用苦辛。苦寒以治之。

方枳殼湯

枳殼 去穢炒黃色五錢

黃連 一兩用槐花四兩酒炒拌去槐花不用

石咬咀水二鍾煎一鍾。食前溫服。

勞瘵咯血以七疳散加阿膠當歸主之。

方七疳散

人參

石菖蒲

生地黃

川芎

各一兩

防風

細辛 二錢 防風

辰砂 另研各五錢

右件修合爲末。每服一錢。滾湯調服。

病久嗽傷肺。及熱壅傷肺。俱成嗽血。以金沸草散。加阿膠。當歸。

生地黃。主之。有汗。去麻黃。見血。去生薑。半夏。方見三卷內

病虛勞嗽血。以黃芪補肺湯。加阿膠。如氣急。加杏仁。桑白皮。

方黃芪補肺湯

黃芪 一錢五分 五味子 人參 各一錢 麥門冬 八分

桑白皮 五分 枸杞子 六分 熟地黃 七分

右咬咀。水煎熟。不拘時服。

治肺損嗽血。以薏苡仁五兩。水三升。煎一升。入酒少許。分三服。

病舌衄。外用槐花爲末。搽上。內用麥門冬煎湯。調下妙香散土。

之。

方妙香散

麝香 二錢另研 人參 五錢 木香 煨二錢五分 茯苓 去皮

茯神 去木 黃芪 各一兩 桔梗 去蘆 山藥 薑汁皮

甘草 炙 遠志 各一兩 辰砂 二錢另研極細

右件依法修合為細末每服二錢不拘時溫酒調下

病肌衄血從毛孔中而出者以男胎髮燒灰食之

病肺虛客熱咳嗽咽乾多吐涎沫或有鮮血勞傷肺胃吐血嘔

血以大阿膠丸主之

方大阿膠丸

麥門冬 茯神 栢子仁 百部 杜仲 丹參

貝母 防風 五味子 山藥 熟地黃 阿膠

茯苓 各一兩 遠志 人參 各二錢五分

