

橙治鍼經

卷一

序

每怪今之談醫者曰。某書宜讀也。某家宜宗也。此不知醫之言也。夫學必有淵源。業必有傳習。德成藝成。固無不然。若同一所學。而家數派別。判若疆域。則唯詩文書畫之家。乃可分道揚鑣。並足不朽。為其得失。工拙之數。已自受之。而於人固無與也。然謬種流傳。明者訶之。則亦不可不慎擇於其間矣。若夫醫為司命。一己之得失。工拙。而千百人之安危。死生。係之。是

故病萬變。藥亦萬變。活法。非可言傳。至當。唯在恰好。倘惟沾沾焉。執一人之說。守一家之學。傳者已偏。而不舉習者。復膠而不化。尚涼瀉。則虛寒者。蒙禍。憤溫補。則寔熱者。罹殃。即不然。而或矯枉者。過正。執中者。無權。過猶不及。則淺近固非。而高深亦左。易觀相笑。則彼固已失。而此亦未得其不至。盛盛虛虛。而遺人夭殃者。幾希矣。况乎醫之為道。非可懸揣虛擬而得也。講習久。則會悟始生。閱歷多。則識解漸確。讀書臨。

證合則兩濟。離則兩疎。以故明。遂晦。生信。從疑。得非。
自壯至老。造堂。濟。哉。備嘗。此中。甘苦。則童而習之。白。
首茫然者。何限。如是。而猶。呶呶然。號於人曰。予讀某。
書。宗某家者也。可乎。不可乎。夫由博反約。學道固爾。
唯醫亦然。然約自博出。不博則所約何物。茲予證治。
鍼經之輯。固甚約也。而以視一人之說。一家之學。則。
已博矣。顧此中甘苦之故。予口能言之。而身不能踐。
之。則予之所惡焉。內愧者也。抑閱之柯韻伯先生曰。

讀書無目。遂至病人。無命痛哉。斯言於今人口耳之
學。誠為切中膏肓。願覽予是編者。先具慧眼。博觀而
約取。變通以盡利。融會貫通。左宜右有。渾然無偏持
一說之迹。則技也而進於道矣。是予所厚望也。夫
道光三年癸未仲春月海昌郭誠勲雲臺甫識

齊音劉
嘗也

歟音饒
謹聲也

慙音恨
慙也

例言

一傷寒以仲景先師為斗極。後賢作述相繼。誠不無離合。泰半。狀古今異宜。五方殊質。又虛人老弱。及三時感冒之證。定有不可局守一法者。况葯石唯求已疾。苟如其法。而足以中病。即皆仲景之功臣也。又何離合之有。故繼傷寒復讀。而復著心法之。一篇云。

一襍症要旨總賦一篇。第就案頭目所檢閱之書。而

撮其精要。故隨摘隨編。都無倫次。且多罅漏。以各
證自有分門。故不復多及。

一古今醫籍充棟。儘多名論。而涼瀉溫補兩家。率皆
出主入奴。夫病變不齊。人命至重。非如行文者可
不論何題。而但以我法馭之也。近惟吳門葉天士
先生。天人並到。歟步一時。岫雲華氏所輯臨證指
南一書。隨症施治。中正不偏。而其中精理名言。寔
能發前人所未發。每症案後諸家附論。亦復源源

本本縷析條分。且多約句成章。簡捷可誦。因遂據以為本。潛加融貫。後復博採諸名家案論以足之。但求發明。曲盡不嫌。先後錯陳。

一每引葉氏指南案論畢。後下註云。倣者。或倣其辭。或仿其意。而變通其文。以諧聲偶也。云約者。以原文或錯落不齊。不便仍襲。第約其大旨。而煅煉成章也。其附論姓氏。不備註。以本無掠美之意。不必斤斤詳列也。

一前明周慎思遺書及

國朝吳克軒名醫類案續編。並未有刻本。又孔以立
醫門普度。論溫疫痢疾二證。極有發明。雖有刻本。
而書肆罕覯。皆偶從借讀得之。向曾節鈔其要畧。
茲復摘入是編。以廣多識。

一通天地人之為儒。醫固儒者所當知也。然非專門
名家。而僅涉獵數種醫書。一知半解。食而不化。偶
遇骨肉。或戚友間。抱疴危險。未悉病情。真諦而率

爾代庖。或從旁掣肘。皆足誤事。是集脈因證治。更互發明。補瀉寒溫。唯變所適。不獨可破。柴門膠柱之辭。亦足懲旁觀越俎之愆。

一醫學之宜多讀書也。墨守一編。則見聞不廣。博覽衆籍。則悉記為難。欲其搜採畧該。而又櫟括簡要。則是集固已兼之。而且口誦。既免於聲牙心。惟復便於默證。諒識者自不塵土視之也。惟是草創簡率。所述諸書。大半未及詳疏。好學深思者。必能博

考原文。而且溯流尋源。上窺靈素甲乙金匱玉函
之秘。則是編直弁髦也。夫。

聲

音徹
石所也

隱

音犹
長木也

證治鍼經卷一目録

序

傷寒心法二篇

雜證要旨賦一篇

眩暈

不寐

便血

痰飲痰色辨附

例言

傷寒摘要八條

中風

虛癆

吐血

遺精

舌病

目錄

內傷外感辨補

肝風木乘土合

汗

衄血

淋濁

證治鍼經卷一

海昌郭誠勲雲臺輯

傷寒心法

仲景先師傷寒論。愚既著便讀矣。顧後賢輩出。各有發明。亦未可例之自檜以下也。爰撮其要旨。輯為駢辭。既便省覽。亦備遺忘。鄙瑣之誦。所不敢辭。猶前志云爾。癸未李春誌。

上篇

陰病厥逆
亦有神昏
者見羅謙
甫治傷寒
脈結心悸
症醫案

傷寒大要莫如救陰三陽皆有頭疼太陰亦能發渴
戴氏曰不可陽明不甚傷寒輒反陽明脈伏禁用寒涼
大渴者不可陽明不甚傷寒輒反陽明脈伏禁用寒涼
宜升陰病逆神清不同熱厥熱傷厥必神昏太陽亦有
散升陰病逆神清不同熱厥熱傷厥必神昏太陽亦有
譫語由汗多而神昏少陰間或頭疼必足寒而氣逆
疲氣不得轉陽證陰脈兮胸悶腹脹者疏利無妨鬱
而痛不轉陽證陰脈兮胸悶腹脹者疏利無妨鬱
陳枳蘇子山查之脈數右空兮契甚中滿者寒涼亦
屬陳枳蘇子山查之脈數右空兮契甚中滿者寒涼亦
得三黃湯加滑石熱邪失下勢如焚發散誤於初起
熱毒發散引邪濕土之邪初起張砭頑案脈細如蛛舌
藥用發散引邪濕土之邪初起張砭頑案脈細如蛛舌

焦黑陰欲竭地連佐以將軍姓地黃連湯去苓黃加

搗汁生地和服一兩酒浸證似少陽須辨病由伏氣陽萎自出

故耳聾脅痛當用白神昏解同上下後脈而浮去數在

柴葛桂枝以致汗多神昏解同上下後脈而浮去數在

應知邪獨留於營衛于大便六七日不行陸養愚案必

下症具而吐葯喜食飲蘇葉藿香薄荷先與三嫩者俱

搗汁下和井水陸與飲而吐止尺脈動而不眠頭痛晚發

黃連鷄子湯如神游少胸腹滿而黃路金勿疑是疸

胃脈浮虛不可下用北小訣筋湯肉潤須辨多因汗太過

下或或由素稟有血熱或有準繩吳氏脈伏不屬陰寒驗之身

熱入陽明神昏脈伏肌熱灼肢冷半多熱厥別在

頭疼此發斑之候有粒太陰手勿升陽甘草桔梗防風

薄荷蟬蛻鼻蛆發斑陽明忌涼血越用黃芩則斑不得

葛根紫草及甘草陳坡材李表未透則邪伏心胞絡

必昏冒而獨語傷寒口既乾斯熱歸胃府亟清解以

存津熱甚者傷寒加參連躁不得眠有虛煩或下後

亦有寔熱必錯大語乾嘔法饑不能食屬厥陰亦屬陽

明柯氏論傷風濕中濕方二便之秘風通可別陰厥

陽厥方冷水之欲惡堪憑且夫大渴非無寒症凝

藏母治秦血亦有格陽景岳傷便澹世甫止脈偏沉

緩攻自可雖多表未解再汗何妨飲蚊迹

莫認為發斑更有無根虛火鄭聲不同於獨語還聞

挾血如狂難性壞症之例惟三汗下溫清并格腹痛

之因有四寒熱血積為殃飲無熱狂言五苓散可以

探吐合目即汗煖清胆湯槩胡蘄皮甘韞應是良